第1章 六脉神剑出江湖 三角函数秒杀路

专题1 三角函数图像与性质

◀◀ 达标训练

1. A 【解析】因为 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点, 所以 $T = 2\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \pi = \frac{2\pi}{\omega}$ 所以 $\omega = 2$, 故选 A.

2. A 【解析】 $f(x) = \sin|x|$ 不是周期函数, 可排除 D 选项; $f(x) = \cos|x|$ 的周期为 2π , 可排除 C 选项; $f(x) = |\sin 2x|$ 在 $\frac{\pi}{4}$ 处取得最大值, 不可能在区间 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增, 可排除 B. 故选 A.

3. D 【解析】当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, $\omega x + \frac{\pi}{5} \in \left[-\frac{\pi}{5}, 2\pi\omega + \frac{\pi}{5}\right]$, 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点, 所以 $5\pi \leq 2\pi\omega + \frac{\pi}{5} < 6\pi$, 所以 $\frac{12}{5} \leq \omega < \frac{29}{10}$, 故④正确, 因此由选项可知只需判断③是否正确即可得到答案, 下面判断③是否正确, 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{10}\right)$ 时, $\omega x + \frac{\pi}{5} \in \left[\frac{\pi}{5}, \frac{(\omega+2)\pi}{10}\right]$, 若 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{10}\right)$ 单调递增, 则 $\frac{(\omega+2)\pi}{10} < \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega < 3$, 因为 $\frac{12}{5} \leq \omega < \frac{29}{10}$, 故③正确. 故选 D.

4. C 5. B 6. C 7. C 8. D 9. A 10. B
11. B 12. D 13. B 14. A 15. A 16. D
17. D 18. A 19. A 20. A 21. B 22. A
23. B 24. C 25. A

26. 【解析】因为 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{3\pi}{2}\right) - 3\cos x =$

$-\cos 2x - 3\cos x = -2\cos^2 x - 3\cos x + 1$, 令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 因为 $f(t) = -2t^2 - 3t + 1$ 的开口向上, 对称轴 $t = -\frac{3}{4}$, 在 $[-1, 1]$ 上先增后减, 故当 $t = 1$ 即 $\cos x = 1$ 时, 函数有最小值 -4 . 故答案为 -4 .

27. 1 28. $\frac{3}{2}$ 29. $\sqrt{3}$ 30. $\sqrt{3}$ 31. $(-\infty, 2]$

32. 【解析】(1) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\frac{2\pi}{3} + \sin^2\frac{\pi}{3} - 4\cos\frac{\pi}{3} = -1 + \frac{3}{4} - 2 = -\frac{9}{4}$; (2) $f(x) = 2(2\cos^2 x - 1) + (1 - \cos^2 x) - 4\cos x = 3\cos^2 x - 4\cos x - 1 = 3\left(\cos x - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{7}{3}$, $x \in \mathbf{R}$, 因为 $\cos x \in [-1, 1]$, 所以当 $\cos x = -1$ 时, $f(x)$ 取最大值 6; 当 $\cos x = \frac{2}{3}$ 时, 取最小值 $-\frac{7}{3}$.

33. 【解析】 $y = 7 - 4\sin x \cos x + 4\cos^2 x - 4\cos^4 x = 7 - 2\sin 2x + 4\cos^2 x(1 - \cos^2 x) = 7 - 2\sin 2x + 4\cos^2 x \sin^2 x = 7 - 2\sin 2x + \sin^2 2x = (1 - \sin 2x)^2 + 6$. 由于函数 $z = (u - 1)^2 + 6$ 在 $[-1, 1]$ 中的最大值为 $z_{\max} = (-1 - 1)^2 + 6 = 10$, 最小值为 $z_{\min} = (1 - 1)^2 + 6 = 6$, 故当 $\sin 2x = -1$ 时 y 取得最大值 10, 当 $\sin 2x = 1$ 时 y 取得最小值 6.

专题2 两角和与差的正弦、余弦和正切

◀◀ 达标训练

1. B 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A
8. A

9. $-\frac{1}{2}$ 10. $\frac{3}{2}$ 11. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ 12. $\frac{7}{5}$ 13. $\sqrt{2}, 1$

14. ± 3 15. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 16. $-\frac{4}{3}$ 17. $\pi, \frac{3-\sqrt{2}}{2}$

18. 3

19. 【解析】(1) 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x =$

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}, f(x)$$

的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$; (2) 若 $f(x)$ 在区间

$\left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$, 可得 $2x - \frac{\pi}{6} \in$

$\left[-\frac{5\pi}{6}, 2m - \frac{\pi}{6}\right]$, 即有 $2m - \frac{\pi}{6} \geq \frac{\pi}{2}$, 解得

$m \geq \frac{\pi}{3}$, 则 m 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

20. 【解析】(1) 因为角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴非负半轴重合, 终边过点

$P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. 所以 $x = -\frac{3}{5}$, $y = -\frac{4}{5}$,

$r = |OP| = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = 1$, 所以

$\sin(\alpha + \pi) = -\sin\alpha = -\frac{y}{r} = \frac{4}{5}$; (2) 由 $x =$

$-\frac{3}{5}$, $y = -\frac{4}{5}$, $r = |OP| = 1$, 得 $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$,

$\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, 又由 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{13}$, 得 $\cos(\alpha +$

$\beta) = \pm \sqrt{1 - \sin^2(\alpha + \beta)} = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} =$

$\pm \frac{12}{13}$, 则 $\cos\beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta) \cdot$

$\cos\alpha + \sin(\alpha + \beta)\sin\alpha = \frac{12}{13} \times \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{5}{13} \times$

$\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{56}{65}$, 或 $\cos\beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] =$

$\cos(\alpha + \beta)\cos\alpha + \sin(\alpha + \beta)\sin\alpha = -\frac{12}{13} \times$

$\left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{5}{13} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{16}{65}$. 所以 $\cos\beta$ 的值为

$-\frac{56}{65}$ 或 $\frac{16}{65}$.

21. 【解析】(1) $f(x) = \sqrt{3}\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2\sin x \cos x =$

$\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x\right) - \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x +$

$\frac{1}{2}\sin 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$, 所以 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 所以

$f(x)$ 的最小正周期为 π ;

(2) 因为 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以 $2x + \frac{\pi}{3} \in$

$\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 所以 $-\frac{1}{2} \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$,

所以 $f(x) \geq -\frac{1}{2}$.

22. 【解析】(1) 函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\sin x -$

$\sqrt{3}\cos^2 x = \cos x \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}(1 + \cos 2x) = \frac{1}{2}\sin 2x -$

$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故函数的周

期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 最大值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$,

故当 $0 \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 即 $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 时,

$f(x)$ 为增函数; 当 $\frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \pi$ 时, 即 $x \in$

$\left[\frac{5\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $f(x)$ 为减函数.

23. 【解析】(1) 因为函数 $f(x) = 2\cos x(\sin x + \cos x) =$

$\sin 2x + 1 + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 所以

$f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\sin\left(\frac{5\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + 1 = \sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} + 1 =$

$\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 2$;

(2) 因为函数 $f(x) = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 故它

的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$. 令 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x + \frac{\pi}{4}$

$\leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$, 求得 $k\pi - \frac{3\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{8}$,

故函数的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}\right]$,

$k \in \mathbf{Z}$.

24. 【解析】(1) 由 $f(x) = \sin x$, 得 $f(x + \theta) = \sin(x +$

$\theta)$, 因为 $f(x + \theta)$ 为偶函数, 所以 $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$

($k \in \mathbf{Z}$), 因为 $\theta \in [0, 2\pi)$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta =$

$\frac{3\pi}{2}$;

(2) $y = \left[f\left(x + \frac{\pi}{12}\right)\right]^2 + \left[f\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right]^2 =$

$\sin^2\left(x + \frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 - \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)}{2} +$

$$\frac{1 - \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)}{2} = 1 - \frac{1}{2} \left(\cos 2x \cos \frac{\pi}{6} - \sin 2x \sin \frac{\pi}{6} - \sin 2x \right) = \frac{3}{4} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x + 1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 1, \text{ 因为 } x \in \mathbf{R}, \text{ 所以 } \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \in [-1, 1], \text{ 所以 } y = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 1 \in \left[1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right].$$

专题3 正切恒等式

达标训练

1. B 2. C 3. A 4. C 5. A 6. B 7. A

8. $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ 9. $\frac{\pi}{6}$ 10. $\sqrt{3}$ 11. 12

12. $\left[\frac{3}{4}, 1\right)$ 13. 3 14. $\frac{2\pi}{3}$ 15. $\frac{\pi}{4}$

16. 【解析】(1) $a=8$ 时, $x^2 - 8x + 4 = 0$, 所以 $\tan A + \tan B = 8$, $\tan A \tan B = 4$; 所以 $\tan C = \tan[\pi - (A+B)] = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \tan B - 1} = \frac{8}{3}$. 可以用正切恒等式直接秒杀, 不过要写证明过程; (2) 由题意, $\Delta = a^2 - 16 \geq 0$, 解得 $a \geq 4$ 或 $a \leq -4$; 又 $\tan A \tan B = 4 > 0$, 所以 $\begin{cases} \tan A > 0 \\ \tan B > 0 \end{cases}$, 所以 $\tan A + \tan B = -a > 0$, 所以 $a < 0$, 即 $a \leq -4$; 所以 $\tan C = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \tan B - 1} = \frac{-a}{3} \geq \frac{4}{3}$, 所以 $\tan C$ 的最小值是 $\frac{4}{3}$, 此时对应的 $\tan A = \tan B = 2$.

17. 【解析】(1) 因为 $b = \frac{a}{2} \sin C$, 所以 $2 \sin B = \sin A \sin C$, 所以 $\frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan C} = \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{\sin C \cos A + \cos C \sin A}{\sin A \sin C} = \frac{\sin(A+C)}{\sin A \sin C} = \frac{\sin B}{\sin A \sin C} = \frac{\sin B}{2 \sin B} = \frac{1}{2}$; (2) 因为由(1)可得 $2 \sin B = \sin A \sin C = \sin A \sin(A+B) = \sin A (\sin A \cos B + \cos A \sin B)$, $= \sin^2 A \cos B + \sin A \cos A \sin B$, 所以 $2 \tan B = \sin^2 A + \sin A \cos A \tan B$, 所以 $\tan B = \frac{\sin^2 A}{2 - \sin A \cos A} = \frac{\sin^2 A}{2 \sin^2 A + 2 \cos^2 A - \sin A \cos A} =$

$$\frac{\tan^2 A}{2 \tan^2 A + 2 - \tan A} = \frac{1}{2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{\tan A}\right)^2 - \frac{1}{\tan A}} = \frac{1}{2 \left(\frac{1}{\tan A} - \frac{1}{4}\right)^2 + 2 - \frac{1}{8}}. \text{ 锐角 } \triangle ABC \text{ 中, 因为 } \tan A > 0, \text{ 所以 } \frac{1}{\tan A} > 0, \text{ 故当 } \frac{1}{\tan A} = \frac{1}{4} \text{ 时, } 2 \tan B \text{ 取得最大值为 } = \frac{8}{15}, \text{ 故 } \tan B \text{ 的最大值为 } \frac{8}{15}.$$

专题4 ω 函数之卡根法

达标训练

1. C 【解析】因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 图像的一条对称轴, 又因为 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 是 $f(x)$ 图像的一个对称中心, $\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} = \frac{2k-1}{4}T$, 所以 ω 可以表示为 $\omega = 2k - 1 (k \in \mathbf{Z})$, 故选 C.

2. D 【解析】最大值卡根: $\frac{\pi}{6} < \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{6}$, D 不符合, 故选 D.

3. C 【解析】因为函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$, 所以 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 因为 $f(x)$ 是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{5}\right)$ 上的单调函数, 所以 $\frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \leq \frac{\pi}{3}$, 且 $\frac{\frac{3\pi}{2} - \varphi}{2} \geq \frac{4\pi}{5}$, 求得 $-\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq -\frac{\pi}{10}$, 故选 C.

4. C 【解析】定义在 $[0, \pi]$ 上的函数 $y = \sin(\omega x - \frac{\pi}{6}) (\omega > 0)$, 因为函数有零点, 所以 $\pi \geq \frac{0 + \frac{\pi}{6}}{\omega} \geq 0$, 所以 $\omega \geq \frac{1}{6}$. 且函数的值域 $M \subseteq \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 联想 $y = \sin x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 时, $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$, 因为 $\frac{-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{\omega} = 0$, 所以

$\frac{7\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \geq \pi$, 求得 $\omega \leq \frac{4}{3}$, 则 ω 的取值范围为 $[\frac{1}{6}, \frac{4}{3}]$, 故选 C.

5. B 【解析】因为 $-1 \leq 3\cos(2x + \frac{\pi}{3}) \leq 3$, 所以 $-\frac{1}{3} \leq \cos(2x + \frac{\pi}{3}) \leq 1$. 所以 $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} \leq \cos(2x + \frac{\pi}{3}) \leq 1$. 则满足上述条件的 $2x + \frac{\pi}{3}$ 的最大范围是 $2k\pi - \frac{2\pi}{3} < 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 即 $k\pi - \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $(b-a)_{\max} < \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}$, 排除 C, D. 则满足上述条件的 $2x + \frac{\pi}{3}$ 的最小范围是 $2k\pi < 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 即 $k\pi - \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $(b-a)_{\min} > \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. 排除 A, 故 $b-a$ 的值可能是 $\frac{\pi}{2}$. 故选 B.

6. A 【解析】由题意函数 $f(x) = t = 3\sin(2x - \frac{\pi}{6})$, 因为 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 所以 $2x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$; 设 t_1, t_2 是函数 $y = f^2(x) - (m-1)f(x) - m = 0$ 的根. 可得 $t_1 = -1, t_2 = m$; 函数 $y = f^2(x) - (m-1)f(x) - m$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有 3 个零点, 当 $t_1 = -1$ 时, 对于的 x 值只有一个解; 那么 $t_2 = m$ 对于的 x 值有两个解; 所以 $\frac{3}{2} \leq t_2 < 3$, 即 $\frac{3}{2} \leq m < 3$; 故选 A.

7. A 【解析】函数 $f(x) = \sin\omega x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上恰有 9 个零点, 则 $\frac{\pi}{4} < \frac{5T}{2} = \frac{5}{2} \times \frac{2\pi}{\omega}$, 且 $\frac{\pi}{4} \geq 2T = 2 \times \frac{2\pi}{\omega}$, 求得 $16 \leq \omega < 20$, 故选 A.

8. B 【解析】当 $f(x)$ 取得最值时, $x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}}{\omega}$,

依题意得 $\frac{k\pi + \frac{\pi}{3}}{\omega} \leq \pi$, 且 $\frac{(k+1)\pi + \frac{\pi}{3}}{\omega} \geq 2\pi$,

所以 $k + \frac{1}{3} \leq \omega \leq k + \frac{2}{3}$ $\pi < \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega} \Rightarrow \omega < 1$, 显然, $k=0$ 和 $k=1$ 时符合条件, 所以 ω 的取值范围为: $(0, \frac{1}{6}) \cup [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$. 故选 B.

9. A 【解析】解法一: 令 $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{6}) - m = 0$, 则 $\sin(x + \frac{\pi}{6}) = m$, 因为函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ 的对称轴为 $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 所以当 $x \in [0, \frac{7\pi}{3}]$ 时, $x = \frac{\pi}{3}$ 或 $x = \frac{4\pi}{3}$. 因为函数 $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{6}) - m, x \in [0, \frac{7\pi}{3}]$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 所以函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ 与函数 $y = m$ 在 $[0, \frac{7\pi}{3}]$ 上有三个交点, 所以由函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ 与函数 $y = m$ 在 $[0, \frac{7\pi}{3}]$ 上的图像知当 $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ 与函数 $y = m$ 在 $[0, \frac{7\pi}{3}]$ 上有三个交点时, $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\pi}{3}, \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{4\pi}{3}$, 所以 $x_1 + 2x_2 + x_3 = \frac{2\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} = \frac{10\pi}{3}$. 故选 A.

解法二: 如图, 根据对称原理, 易知 $x_1 + x_2 = 2(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}) = \frac{2\pi}{3}, x_2 + x_3 = 2(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{6}) = \frac{8\pi}{3}$, 所以 $x_1 + 2x_2 + x_3 = \frac{2\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} = \frac{10\pi}{3}$. 故选 A.

10. B 【解析】由于 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内不单调, 由于 $\frac{0 + \frac{\pi}{4}}{\omega} > 0$, 故只能考虑五点法的第一个周期来进行卡根, 即: $1 < \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}}{\omega} < 2 \Rightarrow \frac{3\pi}{8} < \omega <$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ 或 } \begin{cases} 1 < \frac{\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4}}{\omega} < 2 \\ \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega} < 1 \end{cases} \Rightarrow \omega > \frac{7\pi}{8}, \text{ 则 } \omega \text{ 的取值范}$$

围为 $(\frac{3\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}) \cup (\frac{7\pi}{8}, +\infty)$, 故选 B.

11. D 【解析】由图像知 $A=1$, $T = \frac{5\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6}) = \pi$, 即 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega=2$, 则 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$,

则 $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 的中点为 $x = \frac{-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{12}$,

$[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$ 的中点为 $x = \frac{\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}}{2} = \frac{7\pi}{12}$, 因为

$x_1 < x_2 < x_3$, 所以 x_1, x_2 关于 $x = \frac{\pi}{12}$ 对称, x_2

与 x_3 关于 $x = \frac{7\pi}{12}$ 对称, 则 $x_1 + 2x_2 + x_3 = x_1 + x_2$

$+ x_2 + x_3 = 2 \times \frac{\pi}{12} + 2 \times \frac{7\pi}{12} = \frac{4\pi}{3}$, 故选 D.

12. A 【解析】函数的最大值为 2, 则 $A=2$, 因为相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 即

$T = \pi = \frac{2\pi}{\omega}$, 得 $\omega=2$, 则 $f(x) = 2\sin(2x + \varphi)$,

因为 $f(\frac{\pi}{6} - x) = f(\frac{\pi}{6} + x)$, 所以 $x = \frac{\pi}{6}$ 是函数的

的对称轴, 则 $2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $\varphi =$

$k\pi + \frac{\pi}{6}$, 因为 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 所以当 $k=0$ 时,

$\varphi = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$, 当 $x \in$

$[-\frac{\pi}{4}, \vartheta]$ 时, 当 $2x + \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{3}, 2\vartheta + \frac{\pi}{6}]$,

令 $t = 2x + \frac{\pi}{6}$, 则 $t \in [-\frac{\pi}{3}, 2\vartheta + \frac{\pi}{6}]$, 当

$t = -\frac{\pi}{3}$ 时, $f(x) = 2\sin(-\frac{\pi}{3}) = -2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} =$

$-\sqrt{3}$, 因为当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \vartheta]$ 时, $f(x)$ 的值域

为 $[-\sqrt{3}, 2]$, 所以 $\frac{\pi}{2} \leq 2\vartheta + \frac{\pi}{6} \leq \pi + \frac{\pi}{3}$,

得 $\frac{\pi}{6} \leq \vartheta \leq \frac{7\pi}{12}$, 故选 A.

13. B 【解析】函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 所以

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{4} \geq \frac{2k\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}}{\omega} \\ \frac{2\pi}{3} \leq \frac{2k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}}{\omega} \end{cases} \quad (k \in \mathbf{Z}), \text{ 解得:}$$

$$\begin{cases} \omega \leq \frac{8}{3} - 8k \\ \omega \leq \frac{1}{2} + 3k \end{cases}, \text{ 因为 } \omega > 0, \text{ 当 } k=0 \text{ 时, 可得 } 0$$

$< \omega \leq \frac{1}{2}$. 故选 B.

14. C 【解析】函数 $f(x) = -2 \leq \sin \leq (2x + \varphi)$, $|\varphi| < \pi$, 可以理解为由于 $y = -\sin x$ 在区间 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ 单调递增, 所以

$$\frac{2k\pi + \frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \leq \frac{\pi}{5} \text{ 且 } \frac{5\pi}{8} \leq \frac{2k\pi + \frac{3\pi}{2} - \varphi}{2}, k \in \mathbf{Z}.$$

解得 $2k\pi + \frac{\pi}{10} \leq \varphi \leq 2k\pi + \frac{\pi}{4}$, 因为 $|\varphi| < \pi$,

令 $k=0$, 可得 $\varphi \in [\frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{4}]$, 故选 C.

15. D 【解析】因为函数 $f(x) = \sin \omega x - \cos \omega x = \sqrt{2} \sin(\omega x - \frac{\pi}{4})$ ($\omega > \frac{1}{4}, x \in \mathbf{R}$), 若 $f(x)$ 的图像的任意一条对称轴与 x 轴的交点的横坐标都不属于区间 $(2\pi, 3\pi)$, 则 $f(x)$ 的半个周期大于或等于 π , 即 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \geq \pi$, 所以 $0 < \omega \leq 1$,

故有 $\frac{1}{4} < \omega \leq 1$. 求得对称轴为 x

$$= \frac{(k + \frac{3}{4}) \cdot \pi}{\omega},$$

$$\text{所以 } \begin{cases} \frac{(k + \frac{3}{4})\pi}{\omega} \leq 2\pi \\ \frac{(k + 1 + \frac{3}{4})\pi}{\omega} \geq 3\pi \end{cases}, \text{ 求得 } \frac{k}{2} + \frac{3}{8} \leq \omega \leq$$

$\frac{k}{3} + \frac{7}{12}$. 当 $k = -1$ 时, $-\frac{1}{8} \leq \omega \leq \frac{1}{4}$, 不合

题意; 当 $k=0$ 时, $\frac{3}{8} \leq \omega \leq \frac{7}{12}$; 当 $k=1$ 时,

$\frac{7}{8} \leq \omega \leq \frac{11}{12}$; 当 $k=2$ 时, $\frac{11}{8} \leq \omega \leq \frac{5}{4}$, 不合题意, 故 ω 的取值范围为 $\left[\frac{3}{8}, \frac{7}{12}\right] \cup \left[\frac{7}{8}, \frac{11}{12}\right]$, 故选 D.

16. D 【解析】函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi) + 1$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), 其图像与直线 $y=3$ 相邻两个交点的距离为 π , 所以 $T = \pi$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$, 若 $f(x) > 2$, 则 $\sin(2x + \varphi) > \frac{1}{2}$, 所

$$\text{以 } \frac{\frac{\pi}{6} + 2k\pi - \varphi}{2} < x < \frac{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi - \varphi}{2}, k \in \mathbf{Z}; \text{ 又}$$

$\forall x \in \left(\frac{\pi}{24}, \frac{\pi}{3}\right)$, 所以 $k = 0$, 所以

$$\begin{cases} \frac{\pi}{24} \geq \frac{\frac{\pi}{6} - \varphi}{2} \\ \frac{\pi}{3} \leq \frac{\frac{5\pi}{6} - \varphi}{2} \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{\pi}{12} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}; \text{ 所以 } \varphi \text{ 的取}$$

值范围是 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$. 故选 D.

17. B 【解析】第一步, 边界卡根, 确定 ω 的形式, $\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} = \frac{2n-1}{4}T = \frac{2n-1}{2}$.

$\frac{\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = 2n - 1$; 第二步, 半周期卡根, 由于 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$ 单调, 故 $\frac{T}{2} \geq \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \Rightarrow \omega \leq$

12; 由于此区间不在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 内, 三角函数不收到一个周期的限制, 故 $\omega = 11$ 为 ω 的最大值, 故选 B.

18. D 【解析】函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 且

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = f\left(\frac{5\pi}{6}\right), \text{ 所以 } x = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}\right) = \frac{3\pi}{4}$$

为 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的一条对称轴,

$$\text{且取得最大值; 所以 } \frac{3\pi}{4} = \frac{2k\pi + \frac{\pi}{3}}{\omega}, k \in \mathbf{Z}, \text{ 所}$$

$$\text{以 } \omega = \frac{8}{3}k + \frac{4}{9}, k \in \mathbf{Z}, \text{ (卡形式), 又 } \omega > 0,$$

且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$ 上有最大值, 无最小

值, 所以 $T > \frac{5\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$, 即 $\frac{2\pi}{\omega} > \frac{\pi}{6}$, 所以 $\omega < 12$, 所以当 $k=8$ 时, $\omega = \frac{32}{3} + \frac{4}{9} = \frac{100}{9}$ 为最大值. 故选 D.

19. C 【解析】由题意知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = \frac{\pi}{4}$ 为 $y = f(x)$ 图像的

对称轴, $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, 所以 $\frac{2n-1}{4} \cdot$

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}, \text{ 所以 } \omega = 2n - 1. \text{ (边界卡根,}$$

确定 ω 的形式) $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{24}\right)$ 上有最

小值无最大值, 所以周期 $T \geq \left(\frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{\pi}{8}$,

即 $\frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{8}$, 所以 $\omega \leq 16$. 要求 ω 的最大值, 结

合选项, 先检验 $\omega = 15$, 当 $\omega = 15$ 时, 由题意可得 $-\frac{\pi}{4} \times 15 + \varphi = k\pi, \varphi = -\frac{\pi}{4}$, 函数为 $y =$

$$f(x) = \sin\left(15x - \frac{\pi}{4}\right), \text{ 在区间 } \left(-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{24}\right) \text{ 上,}$$

$$15x - \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{8}\right), \text{ 此时 } f(x) \text{ 在 } x = -\frac{\pi}{60}$$

时取得最小值, 所以 $\omega = 15$ 满足题意. 则 ω 的最大值为 15, 故选 C.

20. B 【解析】因为 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{18}, \frac{\pi}{6}\right)$ 上单调,

$$\text{所以函数的周期 } T \geq 2 \times \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{18}\right) = 2 \times \frac{2\pi}{18} =$$

$$\frac{2\pi}{9}, \text{ 即 } \frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{2\pi}{9}, \text{ 则 } 0 < \omega \leq 9, \text{ 因为 } f(x) \text{ 关于}$$

$x = \frac{\pi}{3}$ 对称, $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 是 $y = f(x)$ 的一个对称

$$\text{中心, 故 } \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2} = \frac{2n-1}{4}T \Rightarrow \omega =$$

$$2n - 1; \text{ 如图所示, } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \geq \frac{T}{2} \Rightarrow \omega \geq 6,$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{18} = \frac{5\pi}{18} \leq T \Rightarrow \omega \leq 7.2, \text{ 得 } \omega = 7, \text{ 故选 B.}$$

21. B 【解析】解法一：由题意知，

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{3}\omega + \varphi = k_1\pi \\ \frac{\pi}{3}\omega + \varphi = k_2\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}, k_1, k_2 \in \mathbf{Z}, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \omega = \frac{3(2k+1)}{4} \\ \varphi = \frac{k'\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \end{cases}, k, k' \in \mathbf{Z}, \text{ 其中 } k = k_2 - k_1,$$

$k' = k_2 + k_1 = k + 2k_1$ ，故 k 与 k' 同为奇数或同为偶数. $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{5})$ 上有且只有一个

最大，且要求 ω 最大，则 $(\frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{5})$ 包含的周期

应该最多，所以 $\frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{15} = \frac{2\pi}{15} \leq 2T$ ，得 $0 <$

$\omega \leq 30$ ，即 $\frac{3(2k+1)}{4} \leq 30$ ，所以 $k \leq 19.5$. 当 k

$= 19$ 时， $\omega = \frac{117}{4}$ ， k' 为奇数， $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ，此时

$\frac{117}{4}x + \frac{3\pi}{4} \in (2.7\pi, 6.6\pi)$ ，当 $\frac{117}{4}x_1 + \frac{3\pi}{4} =$

4.5π 或 6.5π 时， $f(x_1) = 3$ 都成立，舍去；当

$k = 18$ 时， $\omega = \frac{111}{4}$ ， k' 为偶数， $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，此时

$\frac{111}{4}x + \frac{\pi}{4} \in (2.1\pi, 5.8\pi)$ ，当 $\frac{111}{4}x_1 + \frac{\pi}{4} =$

2.5π 或 4.5π 时， $f(x_1) = 3$ 都成立，舍去；当

$k = 17$ 时， $\omega = \frac{105}{4}$ ， k' 为奇数， $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ，此时

$\frac{105}{4}x + \frac{3\pi}{4} \in (2.5\pi, 6\pi)$ ，当且仅当 $\frac{105}{4}x_1 + \frac{3\pi}{4}$

$= 4.5\pi$ 时， $f(x_1) = 3$ 成立. 综上所述， ω 的最大

值为 $\frac{105}{4}$. 故选 B.

解法二：第一步，边界卡根，确定 ω 的形式，

$$\frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3} = \frac{2n-1}{4}T = \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{\pi}{\omega} \Rightarrow \omega =$$

$\frac{6n-3}{4}$ ；第二步，周期卡根，由于 $f(x)$ 在

$(\frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{5})$ 有且只有一个最大值，故 $T < \frac{\pi}{5} -$

$\frac{\pi}{15} \Rightarrow \omega > 15$ ；排除 A；同时根据图 1 可得 $2T \geq$

$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{5} \Rightarrow \omega \leq 30$ ，再根据图 2， $\frac{3T}{2} < \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{5} \Rightarrow$

$\omega > \frac{45}{2}$ ，且 $\frac{7}{2}T \geq \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} \Rightarrow \omega \leq \frac{105}{4}$ ，故选 B.

图 1

图 2

22. A 【解析】由 $f(-\frac{\pi}{4} + x) - f(-\frac{\pi}{4} - x) = 0$ ，

$f(\frac{\pi}{4} - x) + f(\frac{\pi}{4} + x) = 0$ ，得函数关于 $x =$

$-\frac{\pi}{4}$ 对称，关于点 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 对称，若 $f(x)$ 在

$(0, \frac{3\pi}{16})$ 上单调，则 $\frac{T}{2} \geq \frac{3\pi}{16}$ ，即 $T \geq \frac{3\pi}{8}$ ，得

$\frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{3\pi}{8}$ 得 $0 < \omega \leq \frac{16}{3}$ ，对称轴和对称点之间的

距离为 $\frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}$ ，若 $\frac{(2n-1)T}{4} = \frac{\pi}{2}$ ，

$\omega = 2n - 1$ ，当 $\omega = 1$ 时， $f(x) = A\cos(x + \varphi)$ ，

因为关于 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 对称，所以 $\frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi +$

$\frac{\pi}{2}$ ，得 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{4}$ ，因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以 $k = 0$

时， $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，此时 $f(x) = A\cos(x + \frac{\pi}{4})$ ，满足在

$(0, \frac{3\pi}{16})$ 上单调，若 $\omega = 3$ ，此时 $f(x) =$

$A\cos(3x + \varphi)$ ，因为关于 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 对称，所以 3

$\times \frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ，得 $\varphi = k\pi - \frac{\pi}{4}$ ，因为

$|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以 $k = 0$ 时， $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ ，此时 $f(x)$

$= A\cos(3x - \frac{\pi}{4})$ ，此时在 $(0, \frac{3\pi}{16})$ 上不单调，

不满足条件. 故 $\omega = 3$ 不成立，即 $\omega = 1$ ，故

选 A.

23. 【解析】函数 $f(x) = \cos\omega x + \sin(\omega x + \frac{\pi}{6}) =$

$\frac{3}{2}\cos\omega x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x = \sqrt{3}\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, ($\omega > 0$); 由 $x \in [0, \pi]$, 得 $\omega x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3}\right]$; 又 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上恰有一个最大值点和两个零点, 则 $2\pi \leq \omega\pi + \frac{\pi}{3} < \frac{5\pi}{2}$, 解得 $\frac{5}{3} \leq \omega < \frac{13}{6}$, 所以 ω 的取值范围是 $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$, 故答案为 $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$.

24. 【解析】函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$, 满足函数 $y = f\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6} + \varphi\right)$ 是奇函数, 且当 $|\varphi|$ 取最小值时, $-\frac{\pi}{6} + \varphi = -\frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$. 因为函数 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{a}{2}\right]$ 和 $\left[3a, \frac{7\pi}{6}\right]$ 上均单调递增, 所以 $\begin{cases} 2 \cdot \frac{a}{2} - \frac{\pi}{3} \leq 0 \\ \pi \leq 2 \cdot 3a - \frac{\pi}{3} < 2 \cdot \frac{7\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \end{cases}$, 求得 $\frac{2\pi}{9} \leq a \leq \frac{\pi}{3}$. 则实数 a 的范围为 $\left[\frac{2\pi}{9}, \frac{\pi}{3}\right]$. 故答案为 $\left[\frac{2\pi}{9}, \frac{\pi}{3}\right]$.

25. 【解析】函数 $f(x) = \sin^2 \frac{\omega x}{2} + \frac{1}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos \omega x) + \frac{1}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(\sin \omega x - \cos \omega x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right)$, $\omega > 0$; $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有极值点, 所以 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq \omega\pi - \frac{\pi}{4} < 2\omega\pi - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 或 $2k\pi + \frac{\pi}{2} \leq \omega\pi - \frac{\pi}{4} < 2\omega\pi - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$; 解得 $2k - \frac{1}{4} \leq \omega \leq k + \frac{3}{8}$, 或 $2k + \frac{3}{4} \leq \omega \leq k + \frac{7}{8}$, $k \in \mathbf{Z}$; 令 $k = 0$, 得 $\omega \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{3}{8}\right]$ 或 $\omega \in \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right]$; 又 $\omega > 0$, 所以 ω 取值范围是 $\left(0, \frac{3}{8}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right]$. 故答案为

$$\left(0, \frac{3}{8}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right].$$

专题5 周期函数

达标训练

- D 【解析】因为当 $x > \frac{1}{2}$ 是时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$, 所以 $f(x) = f(x+1)$, 所以当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 的周期 $T = 1$, 又当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 所以 $f(2019) = f(1) = -f(-1) = -(-1)^3 - 1 = 2$. 故选 D.
- D 【解析】由 $f(x+2) = -f(x)$, 得 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$, 即函数的周期是 4, 则 $f(5.5) = f(1.5) = -1$, $f(-1) = 1$, 即 $f(f(5.5)) = 1$, $f(f(4.5)) = f(f(0.5)) = f(-1) = 1$, $f(3.5) = f(-0.5) = 1$, $f(6) = f(2) = -1$, 故选 D.
- D 【解析】因为 $f(x+3) = -f(x)$, 所以 $f(x+6) = -f(x+3) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的周期为 6, 所以 $f(2019) = f(3)$, 又 $f(3) = -f(0) = -2$, 所以 $f(2019) = -2$. 故选 D.
- D 【解析】函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) = f(x-3)$, 得函数周期为 3, 所以 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2018) = 672 \times [f(1) + f(2) + f(3)] + f(1) + f(2)$, 因为 $f(1) = f(-2) = 1$, $f(2) = f(-1) = 0$, $f(3) = f(0) = 1$, 带入上式, 得 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2018) = 672 \times [f(1) + f(2) + f(3)] + f(1) + f(2) = 1345$. 故选 D.
- A 【解析】由 $f(x+1) = -f(x-1)$, 可得 $f(x+2) = -f(x)$, 则 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$, 故函数 $f(x)$ 的周期为 4, 则 $f(5) = f(1) = a^2 - 2a - 4$, 又因为函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f(-1) > 1$, 所以 $f(1) < -1$. 所以 $a^2 - 2a - 4 < -1$, 解得 $-1 < a < 3$. 所以实数 a 的取值范围是 $(-1, 3)$. 故选 A.
- B 【解析】函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的周期为 $T (T > 0)$, 但是 $x^2 \geq 0$, 所以函数的定义域变小, 故 $f(x^2)$ 不是周期函数. 且在 $(0, T)$ 上单调, 故 $0 < x^2 < T$, 解得 $0 < x < \sqrt{T}$, 故在 $(0, \sqrt{T})$ 上单调. 故

选 B.

7. B 【解析】因为 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且满足 $f(x+4) = -f(x)$ ，所以 $f(x)$ 是以 8 为周期的函数，所以 $f(8) = f(0)$ ， $f(11) = f(3) = -f(-1) = f(1)$ ， $f(15) = f(7) = f(-1)$ ，又 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上单调递减，所以 $f(-1) > f(0) > f(1)$ ，即 $f(15) > f(8) > f(11)$ 。故选 B.

8. A 【解析】因为 $(x+2) = f(x)$ ，所以 $f(x)$ 的周期为 2，所以当 $x \in [-1, 1]$ 时， $f(x) = 2 - |x| = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2+x, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$ ，所以 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是偶函数，且在 $[-1, 0]$ 上单调递增，在 $[0, 1]$ 上单调递减，因为 $1 > \cos \frac{\pi}{6} > \sin \frac{\pi}{6} > 0$ ，所以 $f(\cos \frac{\pi}{6}) < f(\sin \frac{\pi}{6})$ ，故 A 错误；因为 $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $1 > \sin 1 > \cos 1 > 0$ ，所以 $f(\sin 1) < f(\cos 1)$ ，故 B 正确；因为 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ ， $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $f(\cos \frac{2\pi}{3}) > f(\sin \frac{2\pi}{3})$ ，故 C 正确；因为 $\frac{\pi}{2} < 2 < \frac{3\pi}{4}$ ，所以 $1 > \sin 2 > |\cos 2| > 0$ ，所以 $f(\sin 2) < f(\cos 2)$ ，故 D 正确。故选 A.

9. A 【解析】 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是奇函数，且满足 $f(x+4) = f(x)$ ，可得函数的周期为 4， $f(2019) = f(2016+3) = f(3) = f(-1) = -f(1)$ 。当 $x \in (0, 2)$ 时， $f(x) = 2x^2$ ， $f(2019) = -f(1) = -2 \times 1^2 = -2$ 。故选 A.

10. A 【解析】由定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 的最小正周期等于 T ，得：在 A 中， $f(2x)$ 的最小正周期为： $\frac{T}{2}$ ，故 A 正确；在 B 中， $f(\frac{x}{2})$ 的最小正周期为： $\frac{T}{1} = T$ ，故 B 错误；在 C 中， $2f(x)$ 的最小正周期为 T ，故 C 错误；在 D 中， $f(x^2)$ 不一定是周期函数，故 D 错误。故选 A.

11. B 【解析】因为 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$ ，故有 $f(x+6) = -\frac{1}{f(x+3)} = -\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}} = f(x)$ 。函数

$f(x)$ 是以 6 为周期的函数。 $f(107.5) = f(6 \times 17 + 5.5) = f(5.5) = -\frac{1}{f(2.5)} = -\frac{1}{f(-2.5)} = -\frac{1}{-4 \times (-2.5)} = \frac{1}{10}$ 。故选 B.

12. D 【解析】因为当 $x \in (0, 1.5)$ 时 $f(x) = \ln(x^2 - x + 1)$ ，令 $f(x) = 0$ ，则 $x^2 - x + 1 = 1$ ，解得 $x = 1$ 。又因为函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数，所以在区间 $\in [-1.5, 1.5]$ 上， $f(-1) = f(1) = 0$ ， $f(0) = 0$ ， $f(1.5) = f(-1.5+3) = f(-1.5) = -f(1.5)$ ，所以 $f(-1) = f(1) = f(0) = f(1.5) = f(-1.5) = 0$ ，又因为函数 $f(x)$ 是周期为 3 的周期函数，则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[0, 6]$ 上的解有 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6，共 9 个，故选 D.

13. B 【解析】由题意 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 2 的函数， $f(x) - f(-x) = 0$ ，可得 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \in [0, 1]$ 时， $f(x) = -\sqrt{1-x^2}$ ，其值域为 $[-1, 0]$ ，两边平方：可得 $x^2 + y^2 = 1$ ， $(0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0)$ ，可得 $f(x)$ 图像为：以原点为圆心，半径为 1， x 轴的下半圆。看作是函数图像的交点问题，即 $y = f(x) + 1$ 与函数 $y = e^x$ ， $x \in [-2018, 0]$ ，图像在左边有 2018 交点。 $x \in [0, 2018]$ 在右边图像没有交点。函数 $g(x) = f(x) - e^x + 1$ 在区间 $[-2018, 2018]$ 上零点的个数为 2018。故选 B.

14. D 【解析】因为偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = f(x)$ ，故函数的周期为 2。当 $x \in [0, 1]$ 时， $f(x) = x$ ，故当 $x \in [-1, 0]$ 时， $f(x) = -x$ 。函数 $y = f(x) - \log_4 |x|$ 的零点的个数等于函数 $y = f(x)$ 的图像与函数 $y = \log_4 |x|$ 的图像的交点个数。在同一个坐标系中画出函数 $y = f(x)$ 的图像与函数 $y = \log_4 |x|$ 的图像，如图所示：显然函数 $y = f(x)$ 的图像与函数 $y = \log_4 |x|$ 的图像有 6 个交点，故选 D.

15. B 【解析】因为函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期

为2的奇函数,所以 $f(1) = f(-1)$,所以 $-f(1) = f(-1) = f(1)$,所以 $f(1) = f(-1) = 0$,所以 $f(2017) = f(1) = 0$. 故选B.

16. D 【解析】当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2^x - 1$, 函数 $y = f(x)$ 的周期为2, $x \in [-1, 0]$ 时, $f(x) = 2^{-x} - 1$, 可作出函数的图像; 图像关于y轴对称的偶函数 $y = \log_5 |x|$. 函数 $y = g(x)$ 的零点, 即为函数图像交点横坐标, 当 $x > 5$ 时, $y = \log_5 |x| > 1$, 此时函数图像无交点, 如图:

又两函数在 $x > 0$ 上有4个交点, 由对称性知它们在 $x < 0$ 上也有4个交点, 且它们关于直线y轴对称, 可得函数 $g(x) = f(x) - \log_5 |x|$ 的零点个数为8; 故选D.

17. D 【解析】由 $f(x-y) = \frac{f(x) \cdot f(y) + 1}{f(y) - f(x)}$ 成立, 且 $f(a) = 1$, 可得 $f(2a) = f(a+a) = f[a - (-a)] = \frac{f(a) \cdot f(-a) + 1}{f(-a) - f(a)} = \frac{1 - f^2(a)}{-2f(a)} = 0$, $f(3a) = f(2a+a) = f[2a - (-a)] = \frac{f(2a) \cdot f(-a) + 1}{f(-a) - f(2a)} = \frac{1}{-f(a)} = -1$, 故A不正确. 因为定义域 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 关于原点对称, $f(a) = 1$, 又 $f(-x) = f[(a-x) - a] = \frac{f(a-x) \cdot f(a) + 1}{f(a) - f(a-x)} = \frac{f(a-x) + 1}{1 - f(a-x)} = \frac{1 + \frac{f(a) \cdot f(x) + 1}{f(x) - f(a)}}{1 - \frac{f(a) \cdot f(x) + 1}{f(x) - f(a)}} = \frac{2f(x)}{-2} = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 为奇函数, 故B不正确. 由于 $f(x-a) = \frac{f(x) \cdot f(a) + 1}{f(a) - f(x)} = \frac{1 + f(x)}{1 - f(x)} = \frac{1 + \frac{f(x+a) \cdot f(a) + 1}{f(a) - f(x+a)}}{1 - \frac{f(x+a) \cdot f(x)}{f(a) - f(x+a)}} = \frac{1}{-f(x+a)}$, 所以 $f(x) = \frac{-1}{f(x+2a)} = f(x+4a)$,

故函数 $f(x)$ 为周期性等于 $4a$ 的周期函数, 故D正确. 先证明 $f(x)$ 在 $[2a, 3a]$ 上单调递减, 由题意可得必须证明 $x \in (2a, 3a)$ 时, $f(x) < 0$. 设 $2a < x < 3a$, 则 $0 < x - 2a < a$, 所以 $f(x - 2a) = \frac{f(2a) \cdot f(x) + 1}{f(2a) - f(x)} = \frac{1}{-f(x)} > 0$, 所以 $f(x) < 0$. 设 $2a < x_1 < x_2 < 3a$, 则 $0 < x_2 - x_1 < a$, 所以 $f(x_1) < 0 < f(x_2) < 0$, $f(x_2 - x_1) > 0$, 所以 $f(x_1) - f(x_2) = \frac{f(x_1) \cdot f(x_2) + 1}{f(x_2 - x_1)} > 0$, 所以 $f(x_1) > f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $[2a, 3a]$ 上单调递减, 故C不正确. 故选D.

18. 【解析】因为函数 $f(x)$ 周期为1, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, 因为当 $0 < x \leq 1$ 时, $f(x) = -\log_2 x$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 故答案为1.
19. 【解析】因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x+2) = f(x)$. 所以当 $x = -1$ 时, $f(-1+2) = f(-1) = f(1)$, 即 $-f(1) = f(1)$, 则 $f(1) = 0$, 因为当 $0 < x \leq 1$ 时, $f(x) = x^3 - ax + 1$. 所以 $f(1) = 1 - a + 1 = 0$, 得 $a = 2$. 故答案为2.
20. 【解析】因为函数 $f(x)$ 以5为周期, 所以 $f(2) = f(-3)$, 又因为 $f(3) = \frac{a^2 + a + 3}{a - 3}$, 函数是奇函数 所以 $f(-3) = -f(3) = -\frac{a^2 + a + 3}{a - 3}$, 因此, $f(2) = -\frac{a^2 + a + 3}{a - 3} > 1$, 解之得 $0 < a < 3$ 或 $a < -2$. 故答案为 $(-\infty, -2) \cup (0, 3)$
21. 【解析】由 $f(x+1) = f(x-1)$, 得 $f(x+2) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是以2为周期的周期函数, 又 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(\log_{\frac{1}{3}} 5) = f(-\log_3 5) = f(\log_3 5) = f(\log_3 5 - 2) = f\left(\log_3 \frac{5}{9}\right) = 3^{\log_3 \frac{5}{9}} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9} + \frac{4}{9} = 1$. 故答案为1.
22. 【解析】对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+6) = f(x) + f(3)$ 成立, 令 $x = -3$, 则 $f(-3+6) = f(-3) + f(3)$, 即 $f(-3) = 0$, 又因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以 $f(3) = 0$, 则 $f(x+6) = f(x) + f(3) = f(x)$, 即函数 $f(x)$ 是周期为6的周期函数. ① $f(2018) = f(336 \times 6 + 2) = f(2)$, 因为

$f(-4) = -2$, 所以 $f(-4+6) = f(-4) = -2$, 即 $f(2) = -2$, 即 $f(2018) = -2$, 正确; ②由(1)知 $f(x+6) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的周期为 6, 又因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以 $f(x+6) = f(-x)$, 而 $f(x)$ 的周期为 6, 所以 $f(x+6) = f(-6+x)$, $f(-x) = f(-x-6)$, 即 $f(-6-x) = f(-6+x)$, 即直线 $x = -6$ 是函数 $y = f(x)$ 的图像的一条对称轴, 即②正确; ③当 $x_1, x_2 \in [0, 3]$, 且 $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上为增函数, 因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以函数 $y = f(x)$ 在 $[-3, 0]$ 上为减函数, 而 $f(x)$ 的周期为 6, 所以函数 $y = f(x)$ 在 $[-9, -6]$ 上为减函数, 故③不正确; ④ $f(3) = 0$, $f(x)$ 的周期为 6, 函数 $y = f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上为增函数, 在 $[3, 6]$ 上为减函数, 所以 $y = f(x)$ 在 $[0, 6]$ 上只有一个零点 3, 所以 $f(3+6) = f(9) = 0$, 则 $f(-3) = f(3) = 0$, $f(-9) = f(9) = 0$, 所以, 函数 $y = f(x)$ 在 $[-9, 9]$ 上有 4 个零点, 故④正确. 故答案为①②④.

23. 【解析】(1) 由函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒有 $f(x+1) = f(x-1)$, 取 $x = x+1$ 则 $f(x+1+1) = f(x+1-1) = f(x)$, 即 $f(x+2) = f(x)$, 所以 2 是函数 $f(x)$ 的周期, 所以(1)正确; (2) 因为当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2^{x-1}$ 为增函数, 又因为函数 $f(x)$ 的周期是 2, 所以函数在 $[2, 3]$ 上的图像与在 $[0, 1]$ 上的图像完全相同, 所以函数 $f(x)$ 在 $(2, 3)$ 上是增函数, 所以(2)正确; (3) 因为当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2^{x-1}$ 为增函数, 且函数 $f(x)$ 为偶函数, 所以在 $[-1, 1]$ 上函数的最小值为 $f(0) = \frac{1}{2}$, 再由函数图像以 2 为周期周期出现, 所以函数 $f(x)$ 的最小值是 $\frac{1}{2}$, 所以(3)不正确; (4) 由函数 $f(x)$ 的周期是 2, 且函数 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(4+x) = f(x) = f(-x)$, 所以函数的一条对称轴是 $x = 2$, 所以(4)正确. 故答案为(1)(2)(4).

24. 【解析】函数 $y = f(x)$ 满足 $f(x+a) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$,

$$x \in \mathbf{R}, \text{ 可得 } f(x+2a) = \frac{1+f(x+a)}{1-f(x+a)} = \frac{1 + \frac{1+f(x)}{1-f(x)}}{1 - \frac{1+f(x)}{1-f(x)}} = \frac{2}{-2f(x)} = -\frac{1}{f(x)}, \text{ 即有}$$

$$f(x+4a) = -\frac{1}{f(x+2a)} = f(x), \text{ 则函数 } y = f(x) \text{ 的最小正周期为 } 4|a|. \text{ 故答案为 } 4|a|.$$

25. 【解析】由题意知, 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 有 $f(x+2) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)}$, 则令 $x = x+2$ 代入得, 所

$$\text{以 } f(x+4) = \frac{1-f(x+2)}{1+f(x+2)} = \frac{1 - \frac{1-f(x)}{1+f(x)}}{1 + \frac{1-f(x)}{1+f(x)}} = f(x),$$

所以函数 $f(x)$ 是周期函数且 $T = 4$, 所以 $f(2019) = f(4 \times 504 + 3) = f(3)$, 因为当 $x \in (0, 4)$ 时, $f(x) = x^2 - 1$, 所以 $f(3) = 8$. 即 $f(2019) = 8$. 故答案为 8.

26. 【解析】因为函数 $f(x)$ 对定义域内任意 x, y , 有 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$, 所以令 $x = y = 0$, 得

$$f(0) = \frac{2f(0)}{1-[f(0)]^2}, \text{ 解得 } f(0) = 0. \text{ 令 } y = -x,$$

$$\text{得 } f(0) = \frac{f(x)+f(-x)}{1-f(x)f(-x)} = 0, \text{ 所以 } f(-x) =$$

$$-f(x), \text{ 即函数 } f(x) \text{ 是奇函数. 因为 } f(x+y) =$$

$$\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}, \text{ 所以 } f(x+1) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}, \text{ 所以}$$

$$f(x+2) = \frac{1+f(x+1)}{1-f(x+1)} = \frac{1 + \frac{1+f(x)}{1-f(x)}}{1 - \frac{1+f(x)}{1-f(x)}} = -\frac{1}{f(x)},$$

$$\text{所以 } f(x+4) = -\frac{1}{f(x+2)} = f(x), \text{ 所以 } f(x) \text{ 是}$$

以 4 为周期的周期函数, 因为 $f(1) = 1$, 所以 $f(2019) = f(505 \times 4 - 1) = f(-1) = -f(1) = -1$. 故答案为 -1.

27. 【解析】因为 $f(1) = 2$, $f(x+1) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$, 所

$$\text{以 } f(2) = \frac{1+2}{1-2} = -3, f(3) = \frac{1-3}{1+3} = -\frac{1}{2},$$

$$f(4) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}, f(5) = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2. \text{ 所以}$$

$f(x)$ 是周期为 4 的周期函数. 因为 $2018 =$

$504 \times 4 + 2$, 所以 $f(2018) = f(2) = -3$. 故答案为 -3 .

28. 【解析】因为定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 为周期函数, 其周期为 8, 当 $x \in [-4, 0]$ 时, $f(x) = x + 1$, 所以 $f(25) = f(8 \times 3 + 1) = f(1) = f(-1) = -1 + 1 = 0$. 故答案为 0.

29. 【解析】因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的函数, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2 = 1$. 故答案为 1.

30. 【解析】因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, $f(x) = \begin{cases} ax + 1, & -1 \leq x < 0 \\ bx + 2, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2}a$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{b+4}{3}$; 又 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$, 所以 $1 - \frac{1}{2}a = \frac{b+4}{3}$ ① 又 $f(-1) = f(1)$, 所以 $2a + b = 0$ ②, 由 ①② 解得 $a = 2, b = -4$; 所以 $a + 3b = -10$. 故答案为 -10 .

31. 【解析】(1) 因为 $f(1) = f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) = f^2\left(\frac{1}{2}\right) = a$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \pm\sqrt{a}$, 又因为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = f^2\left(\frac{1}{4}\right) > 0$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = a^{\frac{1}{2}}$ 同理可得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = a^{\frac{1}{4}}$; (2) 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-x) = f(x)$, 又因为 $f(x)$ 关于 $x = 1$ 对称, 所以 $f(x) = f(2-x)$, 所以 $f(x) = f(-x) = f[2 - (-x)] = f(2+x) \cdot (x \in \mathbf{R})$, 这表明 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的周期函数, 且 2 是它的一个周期.

32. 【解析】(1) $f(1-2x) - f(x) = \lg(1-2x+1) - \lg(x+1) = \lg(2-2x) - \lg(x+1)$, 要使函数有意义, 则由 $\begin{cases} 2-2x > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$ 解得: $-1 < x < 1$. 由 $0 < \lg(2-2x) - \lg(x+1) = \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1$ 得: $1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$, 因为 $x+1 > 0$, 所以 $x+1 < 2-2x < 10x+10$, 所以 $-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$. 由 $\begin{cases} -1 < x < 1 \\ -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3} \end{cases}$ 得: $-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$; (2) 当

$x \in [1, 2]$ 时, $2-x \in [0, 1]$, 所以 $y = g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$, 由单调性可知 $y \in [0, \lg 2]$, 又因为 $x = 3 - 10^y$, 所以所求反函数是 $y = 3 - 10^x, x \in [0, \lg 2]$.

33. 【解析】(1) 由 $\begin{cases} f(2-x) = f(2+x) \\ f(7-x) = f(7+x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = f(4-x) \\ f(x) = f(14-x) \end{cases} \Rightarrow f(4-x) = f(14-x) \Rightarrow f(x) = f(x+10)$, 又 $f(3) = 0$, 而 $f(7) \neq 0, \Rightarrow f(-3) = f(7) \neq 0 \Rightarrow f(-3) \neq f(3), f(-3) \neq -f(3)$. 故函数 $y = f(x)$ 是非奇非偶函数; (2) 由 $\begin{cases} f(2-x) = f(2+x) \\ f(7-x) = f(7+x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = f(4-x) \\ f(x) = f(14-x) \end{cases} \Rightarrow f(4-x) = f(14-x) \Rightarrow f(x) = f(x+10)$, 又 $f(3) = f(1) = 0 \Rightarrow f(11) = f(13) = f(-7) = f(-9) = 0$, 因为在闭区间 $[0, 7]$ 上, 只有 $f(1) = f(3) = 0$, 故在 $[4, 7]$ 上无零点, 又 $f(7-x) = f(7+x)$, 故在 $[4, 10]$ 上无零点, 故在 $[0, 10]$ 上仅有两个解, 故 $f(x)$ 在 $[0, 10]$ 和 $[-10, 0]$ 上均有两个解, 从而可知函数 $y = f(x)$ 在 $[0, 2005]$ 上有 402 个解, 在 $[-2005, 0]$ 上有 400 个解, 所以函数 $y = f(x)$ 在 $[-2005, 2005]$ 上有 802 个解.

专题 6 三角恒等变形求值

达标训练 1

1. A 2. D 3. C 4. C 5. A 6. A 7. A
8. C 9. D 10. $-\frac{\sqrt{14}}{2}$ 11. $\sqrt{3}$
12. 8 【解析】 $\sin A = 2\sin B \sin C \Rightarrow \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = 2\sin B \sin C \Rightarrow \frac{\sin B \cos C + \cos B \sin C}{\cos B \cos C} = \frac{2\sin B \sin C}{\cos B \cos C} \Rightarrow \tan B + \tan C = 2\tan B \tan C$, 因为 $\tan A \tan B \tan C = \tan A + \tan B + \tan C = \tan A + 2\tan B \tan C \geq 2\sqrt{\tan A \cdot 2\tan B \tan C}$, 所以 $\tan A \tan B \tan C \geq 2\sqrt{2} \sqrt{\tan A \tan B \tan C} \Rightarrow \sqrt{\tan A \tan B \tan C} \geq 2\sqrt{2}$, 故 $\tan A \tan B \tan C \geq 8$
13. $\frac{16+26\sqrt{13}}{39}$

【解析】 $f(x) = 2\left[\sin x \cos x + \sin x + \frac{2\sqrt{13}-5}{3\sqrt{13}} \cos x\right]$

$(0 < x < \frac{\pi}{2})$, $m=1$, $n=\frac{2\sqrt{13}-5}{3\sqrt{13}}$, 取得最值

时 $\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1+\cos x}{\frac{2\sqrt{13}-5}{3\sqrt{13}} + \sin x}$, 按照必要探路法,

$|\sin x| > |\cos x|$, 求最大值时取正号,

$$\begin{cases} \sin x = \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \cos x = \frac{2}{\sqrt{13}} \end{cases}, \text{ 满足最值的式子, 此时求得最}$$

大值为 $\frac{16+26\sqrt{3}}{39}$.

14. $\frac{13\sqrt{3}}{6}$ 【解析】由 $f(x) = (\sin 2x + 2\cos x) + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin x +$

$\cos x = 2\cos x(1 + \sin x) + \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin(x + \frac{\pi}{3})$, 两个

函数在 $x = \frac{\pi}{6}$ 时同时取得最大值, 故最大值

为 $\frac{13\sqrt{3}}{6}$.

15. 【解析】(1) 因为 $C = \pi - (A + B)$, 所以 $\tan C =$

$$-\tan(A + B) = -\frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}{1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}} = -1, \text{ 又因为 } 0$$

$< C < \pi$, 所以 $C = \frac{3\pi}{4}$; (2) 由

$$\begin{cases} \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{1}{4}, \text{ 且 } A \in (0, \frac{\pi}{2}), \text{ 得 } \sin A = \\ \sin^2 + \cos^2 A = 1 \end{cases}$$

$\frac{\sqrt{17}}{17}$. 因为 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 所以 $BC = AB \cdot \frac{\sin A}{\sin C} = \sqrt{2}$.

16. 【解析】(1) 因为 $m \cdot n = 1$, 所以 $(-1, \sqrt{3}) \cdot$

$(\cos A, \sin A) = 1$, 即 $\sqrt{3} \sin A - \cos A =$

$$2\left(\sin A \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \cos A \cdot \frac{1}{2}\right) = 1, \sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) =$$

$\frac{1}{2}$, 因为 $0 < A < \pi$, $-\frac{\pi}{6} < A - \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$, 所以

$A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$; (2) 由题知

$$\frac{1+2\sin B \cos B}{\cos^2 B - \sin^2 B} = -3, \text{ 整理得 } \sin^2 B - \sin B \cos B -$$

$2 \cos^2 B = 0$, 所以 $\cos B \neq 0$, 所以 $\tan^2 B - \tan B -$

$2 = 0$, 所以 $\tan B = 2$ 或 $\tan B = -1$, 而 $\tan B =$

-1 使 $\cos^2 B - \sin^2 B = 0$, 舍去, 所以 $\tan B = 2$,

所以 $\tan C = \tan[\pi - (A + B)] = -\tan(A + B) =$

$$-\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\frac{2 + \sqrt{3}}{1 - 2\sqrt{3}} = \frac{8 + 5\sqrt{3}}{11}.$$

达标训练 2

1. D 2. B 3. C 4. C 5. C 6. D 7. D 8. D

9. A 10. C 11. C 12. D 13. D 14. B

15. $(-\frac{1}{2}, 1]$ 16. $\frac{1}{2}$ 17. 1 18. -4

19. $-\sqrt{3}$ 20. 1 21. 4 22. $\sqrt{3}$

第2章 八仙过海显神通 平面向量无敌路

专题1 向量的基础知识

达标训练

1. B 2. A 3. A 4. D 5. B 6. A 7. C

8. D 9. A 10. A 11. B

12. $\frac{1}{2}$ 13. -1 14. -3 15. 3 16. -3

17. 2 18. 7 19. $2\sqrt{3}$ 20. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 21. $[-5\sqrt{2}, 1]$

22. 6 23. -6 24. -2 25. -5 26. $-\frac{2}{3}$

27. $\frac{1}{2}$

专题2 共线向量之对面的女孩看过来

达标训练

1. A 【解析】 $\vec{EB} = \vec{EA} + \vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{BA} - \vec{BD}) + \vec{AB} =$

$$\frac{1}{2}[\vec{BA} - \frac{4}{5}(\vec{AC} - \vec{AB})] + \vec{AB} = \frac{9}{10}\vec{AB} - \frac{2}{5}\vec{AC},$$

故选 A.

2. B 【解析】因为 $\vec{AE} = \vec{AD} + \vec{DE} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}$, 所

以 $\lambda = \frac{1}{2}$, $\mu = 1$, 即 $\lambda\mu = \frac{1}{2}$, 故选 B.

3. A 【解析】在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 满足 $\vec{CD} = 2\vec{DB}$,

点 M 为 AC 中点, 所以 $\vec{MD} = \vec{MC} + \vec{CD} = \frac{1}{2}\vec{AC} +$

$$\frac{2}{3}\vec{CB} = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{2}{3}(\vec{AB} - \vec{AC}) = \frac{2}{3}\vec{AB} - \frac{1}{6}\vec{AC}.$$

故选 A.

4. B 【解析】因为 E 为 BC 的中点, 点 F 在 CD 上, 且 $DF = 2FC$, 连接 AE , BF 交于 G 点, 如图所示,

所以存在实数 m, n 使得 $\vec{AG} = m\vec{AE}, \vec{FG} = n\vec{FB}$,

所以 $\vec{DG} = \vec{DA} + \vec{AG} = -\vec{AD} + m\vec{AE} = -\vec{AD} +$

$$m(\vec{AB} + \vec{BE}) = -\vec{AD} + m\left(\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}\right) = \left(\frac{1}{2}m - 1\right)$$

$$\vec{AD} + m\vec{AB}, \vec{DG} = \vec{DF} + \vec{FG} = \frac{2}{3}\vec{AB} + n(\vec{FC} + \vec{CB})$$

$$= \frac{2}{3}\vec{AB} + n\left(\frac{1}{3}\vec{AB} - \vec{AD}\right) = -n\vec{AD} +$$

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}n\right)\vec{AB}, \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{1}{2}m - 1 = -n \\ m = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}n \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$\begin{cases} m = \frac{6}{7} \\ n = \frac{4}{7} \end{cases}, \text{ 所以 } \vec{DG} = \frac{6}{7}\vec{AB} - \frac{4}{7}\vec{AD}, \text{ 故选 B.}$$

5. C 【解析】因为 D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点，则

$$\text{向量 } \vec{DC} = -\frac{1}{2}(\vec{CA} + \vec{CB}) = -\frac{1}{2}(2\vec{CB} + \vec{BA}) =$$

$$\vec{BC} - \frac{1}{2}\vec{BA}, \text{ 故选 C.}$$

6. D 【解析】因为 $\vec{EB} = \vec{AB} - \vec{AE} = \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{AB} -$

$$-\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{BD}) = \frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\vec{BC} = \frac{1}{2}\vec{AB} -$$

$$\frac{1}{6}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{2}{3}\vec{AB} - \frac{1}{6}\vec{AC}, \text{ 故选 D.}$$

7. B 【解析】由题意，画出几何图形如图所示：

$$\vec{GM} = \vec{GA} + \vec{AM}; \text{ 因为 } G \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 的重心，} M \text{ 满足}$$

$$\vec{MC} = 3\vec{AM}; \text{ 所以 } \vec{AG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) =$$

$$\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}), \vec{AM} = \frac{1}{4}\vec{AC}; \text{ 所以 } \vec{GM} =$$

$$-\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}) + \frac{1}{4}\vec{AC} = -\frac{1}{3}\vec{AB} - \frac{1}{12}\vec{AC}. \text{ 故选 B.}$$

8. D 【解答】依题意， $\vec{BE} = \vec{AE} - \vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CE} - \vec{AB} = \vec{AC} + \frac{2}{3}\vec{CD} - \vec{AB} = \vec{AC} + \frac{2}{3}(\vec{AD} - \vec{AC}) - \vec{AB} = \frac{1}{3}\vec{AC} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}\vec{AB} - \vec{AB} = \frac{1}{3}\vec{AC} - \frac{7}{9}\vec{AB}$. 故选 D.

专题3 等高线定理的运用

达标训练 1

1. C 【解析】解法一：如图1所以，由重心的定义

$$\text{可知：} \vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) =$$

$$\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}), \text{ 所以 } \vec{GC} = \vec{AC} - \vec{AG} = \vec{AC} -$$

$$\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}) = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}. \text{ 所以 } x + y =$$

$$-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}. \text{ 故选 C.}$$

图1

图2

解法二：如图2所示，作 $AE \parallel CG$ ，且 $AE = CG$ ，

根据等高线知识和重心定理可得 $x + y = \frac{|AF|}{|AD|} =$

$$\frac{1}{3}, \text{ 故选 C.}$$

2. B 【解析】因为 $\triangle ABC$ 内一点， $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} =$

$$\vec{0}, \text{ 所以 } O \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 的重心.}$$

解法一：又 M 在 $\triangle OBC$ 内(不含边界)，且当 M

与 O 重合时， $\lambda + 2\mu$ 最小，此时 $\vec{AM} = \lambda\vec{AB} +$

$$\mu\vec{AC} = \frac{2}{3} \times \left[\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})\right] = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}, \text{ 所}$$

以 $\lambda = \mu = \frac{1}{3}$ ，即 $\lambda + 2\mu = 1$ ，当 M 与 C 重合时，

$\lambda + 2\mu$ 最大，此时 $\vec{AM} = \vec{AC}$ ，所以 $\lambda = 0, \mu = 1$ ，

即 $\lambda + 2\mu = 2$ ，因为 M 在 $\triangle OBC$ 内且不含边界，

所以取开区间，即 $\lambda + 2\mu \in (1, 2)$ ，故选 B.

解法二： M 在 $\triangle OBC$ 内(不含边界)，如图的阴

影部分, $\vec{AM} = \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AC} = \lambda \vec{AB} + 2\mu \vec{AE}$, 根据等高线原理易知, M 在 OB 边上时, $\lambda + 2\mu = 1$, M 在 C 点时, $\lambda + 2\mu = 2$, 即 $\lambda + 2\mu \in (1, 2)$, 故选 B.

3. D 【解析】解法一: 设半径为 1, 由已知可设 OB 为 x 轴的正半轴, O 为坐标原点, 建立直角坐标系, 其中 $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $B(1, 0)$, $C(\cos\theta, \sin\theta)$ (其中 $\angle BOC = \theta (0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3})$), 有 $\vec{OC} = \lambda \vec{OA} + \mu \vec{OB}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$), 即 $(\cos\theta, \sin\theta) = \lambda\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \mu(1, 0)$, 整理得: $-\frac{1}{2}\lambda + \mu = \cos\theta$, $\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda = \sin\theta$, 解得 $\lambda = \frac{2\sin\theta}{\sqrt{3}}$, $\mu = \cos\theta + \frac{\sin\theta}{\sqrt{3}}$, 则 $\lambda + \mu = \frac{2\sin\theta}{\sqrt{3}} + \cos\theta + \frac{\sin\theta}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta = 2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$, 其中 $(0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3})$, 易知 $\lambda + \mu = \frac{2\sin\theta}{\sqrt{3}} + \cos\theta + \frac{\sin\theta}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta = 2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$ 为增函数, 由单调性易得具值域为 $[1, 2]$, 故选 D.

解法二: 等高线法, 如图, 连接 AB , 当 C 位于 A 或者 B 点时, $(\lambda + \mu)_{\min} = 1$, 当 C 位于 $\widehat{AB}$ 中点 C_0 时, 根据菱形的对角线性质的可得: $(\lambda + \mu)_{\max} = 2$, 则 $\lambda + \mu$ 的取值范围为 $[1, 2]$, 故选 D.

4. A 【解析】解法一: 如图 1 所示, 建立直角坐标系. $A(1, 0)$, $B(0, 1)$. $\vec{OC} = x \vec{OA} + y \vec{OB} =$

(x, y) , 设 $C(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$). 则 $3x + 5y = 3\cos\alpha + 5\sin\alpha = \sqrt{34}\sin(\alpha + \varphi)$, 其中 $\cos\varphi = \frac{5}{\sqrt{34}}$, $\sin\varphi = \frac{3}{\sqrt{34}}$. 所以 $3x + 5y \leq \sqrt{34}$, 当且仅当 $\sin(\alpha + \varphi) = 1$ 时取等号. 故选 A.

图 1

图 2

解法二: 如图 2 所示, 分别取 $\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{OA}$, $\vec{ON} = \frac{1}{5}\vec{OB}$, $\vec{OC} = x \vec{OA} + y \vec{OB} = 3x \vec{OM} + 5y \vec{ON}$, 根据等高线知识可得: $3x + 5y = \frac{|OC|}{|OD|}$, 故当 OD 取得最小值, 即 $OD \perp MN$ 时, 此时 $|OD| = \frac{|OM| \cdot |ON|}{|MN|} = \frac{1}{\sqrt{34}}$, 故 $(3x + 5y)_{\max} = \sqrt{34}$. 故选 A.

5. C 【解析】解法一: 如图 1, 以 D 为原点, BC , AD 所在的直线为 x, y 轴建立如图所示的直角坐标系, 则 $A(0, 3)$, $B(-\sqrt{3}, 0)$, $D(0, 0)$, 所以 $\vec{BA} = (\sqrt{3}, 3)$, $\vec{BD} = (\sqrt{3}, 0)$, 因为圆 O 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形 ABC 的内切圆, 所以圆 O 的方程为: $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 设点 M 的坐标为 $(\cos\theta, \sin\theta + 1)$, 因为 $\vec{BM} = x \vec{BA} + y \vec{BD}$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 所以 $(\cos\theta + \sqrt{3}, \sin\theta + 1) = x(\sqrt{3}, 3) + y(\sqrt{3}, 0)$, 所以 $\begin{cases} \cos\theta + \sqrt{3} = \sqrt{3}x + \sqrt{3}y \\ \sin\theta + 1 = 3x \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} x = \frac{\sin\theta + 1}{3} \\ y = \frac{\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta + 2}{3} \end{cases}$, 所以 $2x + y = \frac{\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta + 4}{3} = \frac{2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + 4}{3}$, 所以 当 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时, $2x + y$ 的最大值为 2. 故选 C.

图1

图2

解法二：如图2， $\vec{BM} = x\vec{BA} + y\vec{BD} = 2x\vec{BE} + y\vec{BD}$ ($x, y \in R$)，故根据等高线知识 $2x + y = \frac{|\vec{BM}|}{|\vec{BN}|}$ ，显然当M位于AC中点F时， $(2x + y)_{\max} = \frac{|\vec{BC}|}{|\vec{BD}|} = 2$ ，故选C。

6. A 【解析】由题意可知，O为 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心，如图所示，在圆O中，弧CAB所对的圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$ ，点A, B为定点，点C为优弧上的动点，则点A, B, C, O满足题中的已知条件，延长AO交BC于点D，设 $\vec{AO} = \lambda\vec{AD}$ ，根据等高线知识，则m+n的最大值即 $\lambda = \frac{|\vec{AO}|}{|\vec{AD}|}$ 的最大

值，由于 $|\vec{AO}|$ 为定值，故 $|\vec{AD}|$ 最小时，m+n取得最大值，由几何关系易知当AB=AC是， $|\vec{AD}|$ 取得最小值，此时 $\lambda = \frac{|\vec{AO}|}{|\vec{AD}|} = \frac{2}{3}$ 。故

选A。

7. B 【解析】解法一：由题意可得， $\vec{OC}$ 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，所以 $\vec{OC} = k(\vec{OA} + \vec{OB})$ 。再由 $\vec{OC} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$ 可得 $\lambda = \mu$ ，即 $\vec{OC} = \lambda \cdot (\vec{OA} + \vec{OB})$ 。再由 $|\vec{OC}| = 2\sqrt{3}$ ，可得 $2\sqrt{3} = \sqrt{\lambda^2 \cdot (\vec{OA} + \vec{OB})^2} = \sqrt{\lambda^2(1 + 2 \times 1 \times 1 \cos 60^\circ + 1)}$ ，解得 $\lambda = 2$ ，故 $\mu = 2$ ，故 $\lambda + \mu = 4$ 。故选B。

解法二：如图，连接AB交OC于点D，易知 $|\vec{OD}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，根据等高线 $\lambda + \mu = \frac{|\vec{OC}|}{|\vec{OD}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4$ 。

4. 故选B。

8. A 【解析】解法一：因为 $\tan \angle AOB = -\frac{4}{3}$ ，

$\sin \angle AOB = \frac{4}{5}$ ，如图1所示，过点C作 $CD \parallel OB$ 交OA的延长线于D，作 $CE \parallel OA$ 交OB的延长线于E，在 $\triangle OCD$ 中， $\angle OCD = 45^\circ$ ， $\sin \angle ODC = \frac{4}{5}$ ，由正弦定理得： $\frac{OC}{\sin \angle ODC} = \frac{OD}{\sin \angle OCD}$ ，得：

$\frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{OD}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ ，得： $OD = \frac{5}{4} = m$ ，由余弦定理得：

$OD^2 = OC^2 + CD^2 - 2OC \cdot CD \cos 45^\circ$ ，得： $\frac{25}{16} =$

$2 + n^2 - 2\sqrt{2}n \cos 45^\circ$ ，解得 $n = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{7}{4}$ ，当 $n =$

$\frac{1}{4}$ 时， $\cos \angle CDO < 0$ ， $\angle CDO$ 为钝角，与

$\angle EOD$ 为钝角矛盾，故 $n = \frac{7}{4}$ ，所以 $\frac{m}{n} = \frac{5}{7}$ 。

故选A。

图1

图2

解法二：此题根据等高线和张角定理，连接

AB， $\tan \angle AOC = \frac{-\frac{4}{3} - 1}{1 + (-\frac{4}{3})} = 7$ ，根据张角定理

(参考本书解三角形新三板斧) $\frac{\sin \angle AOB}{|\vec{OD}|} =$

$\frac{\sin \angle AOC}{|\vec{OB}|} + \frac{\sin \angle COB}{|\vec{OA}|}$ 可得 $|\vec{OD}| = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ，故 $m + n =$

$\frac{|OC|}{|OD|} = 3$, (这部分回答了2017年江苏高考题的

秒杀解法) 根据正弦定理 $\frac{|OD|}{\sin A} = \frac{|OD|}{\sin B} =$

$$\frac{|BD|}{\sin \angle BOC} = \frac{|AD|}{\sin \angle AOC} \Rightarrow \begin{cases} |BD| = \sqrt{2} \\ |AD| = \frac{7\sqrt{2}}{5} \end{cases}, \text{根据对面}$$

女孩看起来可知: $\frac{m}{n} = \frac{|BD|}{|AD|} = \frac{5}{7}$, 故选 A.

达标训练 2

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. A 7. A
8. B 9. A 10. C 11. C 12. B 13. C 14. D
15. A 16. B
17. $-\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$ 18. $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}$ 19. $\frac{5}{2}$ 20. 2
21. $-\frac{8}{3}$ 22. 2 23. 2 24. $\frac{1}{2}$ 25. 2 26. $\frac{3}{11}$
27. $\frac{29}{18}$ 28. $\frac{29}{18}$ 29. 2 30. 3

专题 4 用万能的建系法求向量乘积问题

达标训练

1. C 2. B 3. A 4. B 5. D 6. D 7. A
8. A 9. A 10. B 11. B 12. C
13. $[-1, \sqrt{2}]$ 14. $-\frac{16}{15}$ 15. $\frac{29}{18}$ 16. 9
17. $\frac{29}{18}$ 18. $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}$ 19. 22 20. $2\sqrt{5}$
21. 2 22. $\frac{1}{2}$ 23. 2 24. $\frac{1}{2}$ 25. $\frac{7}{12}$
26. $\sqrt{2}$ 27. 1 28. 18 29. 5 30. $\frac{15}{2}$ 31. $-\frac{1}{4}$
32. $\sqrt{3}$ 33. $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ 34. -2 35. 22

专题 5 奔驰定理与三角形四心

达标训练

1. B 2. B 3. A 4. A 5. D 6. D 7. B
8. C 9. D 10. A 11. C 12. C 13. A
14. A 15. C 16. B 17. B 18. A 19. C
20. D 21. B 22. A 23. D 24. D 25. C
26. D 27. C 28. A 29. B 30. D
31. 6 32. $\frac{3}{2}$ 33. 90° 34. -16 35. $\sqrt{3}$

36. $\frac{1}{2}$

专题 6 极化恒等式

达标训练

1. C 【解析】解法一: 如图1, 以 BC 为 x 轴, BC 的垂直平分线为 y 轴建立坐标系, 则 $D(3, 5)$, $C(6, 0)$, 设 $M(x, 0) (-6 \leq x \leq 6)$, $\vec{MD} = (3-x, 5)$, $\vec{MC} = (6-x, 0)$, 所以 $\vec{MD} \cdot \vec{MC} = (3-x)(6-x) = (x - \frac{9}{2})^2 - \frac{9}{4}$, 当 $x = \frac{9}{2}$ 时, 则 $\vec{MD} \cdot \vec{MC}$ 的最小值为 $-\frac{9}{4}$. 故选 C.

图 1

图 2

解法二: 极化恒等式, 如图2所示, 取 CD 中点 E , 过 E 作 $EM_0 \perp BC$, 则 $EM_0 = \frac{1}{4}h = \frac{1}{4}\sqrt{10^2 - 6^2} = 2$, $\vec{MD} \cdot \vec{MC} = ME^2 - CE^2 = ME^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 \geq M_0E^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}h\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = -\frac{9}{4}$, 故选 C.

2. D 【解析】取 MN 中点 P , $\vec{CM} \cdot \vec{CN} = |\vec{CP}|^2 - |\vec{MP}|^2 = |\vec{CP}|^2 - \frac{1}{2}$, 故当 P 位于 AB 中点时, $|\vec{CP}|$ 取得最小值 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 当 M 位于 $A(B)$ 点时, $|\vec{CP}|$ 取得最大值, 根据余弦定理, $|\vec{CA}|^2 + |\vec{AP}|^2 - |\vec{CP}|^2 = 2|\vec{CA}| \cdot |\vec{AP}| \cdot \cos 45^\circ$, $|\vec{CP}|^2 = \frac{13}{2}$, 故选 D.
3. B 【解析】取 AB 中点 E , AC 中点 F , 连接 EF , $\vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC}) = \vec{PA} \cdot \vec{PB} + \vec{PA} \cdot \vec{PC} = |\vec{PE}|^2 -$

$$\left| \frac{AB}{2} \right|^2 + |PF|^2 - \left| \frac{AB}{2} \right|^2 \geq 2 |\vec{PE}| \cdot |\vec{PF}| - 2,$$

当 $|\vec{PE}| = |\vec{PF}|$ 时等号成立, 当 P 位于 EF 中点时, $2|\vec{PE}| \cdot |\vec{PF}| = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 取得最小, 故选 B.

8. D

4. A 【解析】取 AB 中点 F , 连接 EF , $\vec{AE} \cdot \vec{BE} = |\vec{EF}|^2 - |\vec{AF}|^2 = |\vec{EF}|^2 - \frac{1}{4}$, 根据几何条件, 当 $EF \perp CD$ 时, $|\vec{EF}|$ 最小, 过 B 作 $BG \perp CD$ 交 CD 于 G , $|\vec{BC}| = \sqrt{3}$, $|BG| = |BC| \cos 60^\circ = \frac{3}{2}$, 此时 $|\vec{EF}| = \frac{|\vec{AD}| + |\vec{BG}|}{2} = \frac{5}{4}$. 所以 $|\vec{EF}|^2 - \frac{1}{4} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 - \frac{1}{4} = \frac{21}{16}$, 故 $\vec{AE} \cdot \vec{BE}$ 的最小值为 $\frac{21}{16}$, 故选 A.

9. C 【解析】解法一: $I_1 = \vec{AP}_1 \cdot \vec{AP}_2 = (\vec{AB} + \vec{BP}_1) \cdot (\vec{AB} + \vec{BP}_2) = \left(\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{BC}\right) \cdot \left(\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}\right) = \left(\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC} - \frac{1}{4}\vec{AB}\right) \cdot \left(\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{AB}\right) = \left(\frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}\right) = \frac{3}{8}\vec{AB}^2 + \frac{1}{8}\vec{AC}^2 + \frac{1}{2}\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{13}{8}\vec{AC}^2 + |\vec{AC}|^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8}|\vec{AC}|^2$, 同理可得: $I_2 = \frac{5}{16}|\vec{AC}|^2$, $I_3 = \frac{3}{8}|\vec{AC}|^2$ 所以 $I_1 > I_3 > I_2$, 故选 C.

5. B 【解析】解法一: AB, CD 是半径为 1 的圆 O 的两条直径, $\vec{AE} = 3\vec{EO}$, 可得 $\vec{OD} = -\vec{OC}$, $\vec{EO} = \frac{1}{4}\vec{AO}$, $\vec{EC} \cdot \vec{ED} = (\vec{EO} + \vec{OC}) \cdot (\vec{EO} + \vec{OD}) = (\vec{EO} + \vec{OC}) \cdot (\vec{EO} - \vec{OC}) = \vec{EO}^2 - \vec{OC}^2 = \frac{1}{16} - 1 = -\frac{15}{16}$, 故选 B.

解法二: 极化恒等式, $\vec{EC} \cdot \vec{ED} = EO^2 - OD^2 = \left(\frac{1}{4}R\right)^2 - R^2 = -\frac{15}{16}R^2 = -\frac{15}{16}$, 故选 B.

解法二: 极化恒等式, 取 P_1P_2 中点 M , P_2P_3 中点 N , $I_1 = \vec{AP}_1 \cdot \vec{AP}_2 = AM^2 - \left(\frac{P_1P_2}{2}\right)^2$, $I_2 = \vec{AP}_1 \cdot \vec{AP}_3 = AP_2^2 - (P_1P_2)^2$, $I_3 = \vec{AP}_2 \cdot \vec{AP}_3 = AN^2 - \left(\frac{P_1P_2}{2}\right)^2$, 目测法显然 $I_1 > I_3$, 又 $AP_2^2 = \frac{AM^2 + AN^2}{2} - \left(\frac{P_1P_2}{2}\right)^2$, 显然 $I_3 > I_2$, 此题可以详细算出 AP_2, AM, AN, P_1P_2 , 基本性质判断可以快速得出答案 所以 $I_1 > I_3 > I_2$, 故选 C.

6. D 【解析】如图在三角形 OPA 中, M 为 AP 中点, 及 $2(OM^2 + MP^2) = OP^2 + OA^2$, 又因为 $OM \perp B_1B_2$, $MB_2 = PM$, $OM^2 + MB_2^2 = OB_2^2 = 1$, 即 $OP^2 + OA^2 = 2$, 即 $\frac{7}{4} \leq OP^2 \leq 2$, 即 $\frac{\sqrt{7}}{2} \leq OP \leq \sqrt{2}$, 故选 D.

10. D 11. C

7. D 【解析】 $PA^2 + PB^2 = 2(PD^2 + DA^2)$, 又因为 $PD = PC = \frac{1}{4}AB$, $AD = 2PC = \frac{1}{2}AB$, 故选 D.

12. B 【解析】解法一: 因为 $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = -\frac{1}{2}$, 所以 $ab \cos C = -\frac{1}{2}$, 由余弦定理可得, $ab \times \frac{a^2 + b^2 - 4}{2ab} = -\frac{1}{2}$, 所以 $a^2 + b^2 = 3$, 由余弦定理可得, $\cos A = \frac{b^2 + 4 - a^2}{4b} = \frac{b^2 + 4 - (3 - b^2)}{4b} = \frac{2b^2 + 1}{4b} = \frac{b}{2} + \frac{1}{4b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{2} \cdot \frac{1}{4b}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当且仅

当 $\frac{b}{2} = \frac{1}{4b}$ 即 $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 此时 $\cos A$ 取得最小值, 根据余弦函数 $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减可知, 此时 A 取得最大 $\frac{\pi}{4}$, 则 $\angle A$ 的最大值是 $\frac{\pi}{4}$, 故选 B.

解法二: $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = -\frac{1}{2} = CD^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \Leftrightarrow |CD| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 其中 D 为 AB 中点, 根据正弦定理, 在 $\triangle ACD$ 中, $\frac{CD}{\sin A} = \frac{AD}{\sin \angle ACD} \Rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \angle ACD \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 此时 A 取得最大 $\frac{\pi}{4}$, 故选 B.

13. C 【解析】解法一: 根据题意, 建立平面直角坐标系, 如图所示:

不妨设 $CD \parallel AB$, 由 $AB = 4$, $\angle CMD = 120^\circ$, 得 $M(0, 0)$, $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, $C(\sqrt{3}, 1)$, $D(-\sqrt{3}, 1)$, 由 P 在线段 CD 上(端点 C, D 除外), 可设 $P(x, 1)$, 其中 $x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$; 则 $\vec{PA} = (-2-x, -1)$, $\vec{PB} = (2-x, -1)$, 所以 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (-2-x)(2-x) + 1 = x^2 - 3$; 又 $x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, 所以 $x^2 - 3 \in [-3, 0)$, 即 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 $[-3, 0)$, 故选 C.

解法二: 极化恒等式 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = PM^2 - AM^2 \in \left[r^2 - \left(\frac{CD}{2}\right)^2, r^2 - r^2 \right] = [-3, 0)$, 故选 C.

14. B 【解析】解法一: 因为 $|(a+b) \cdot c| \leq |a \cdot c| + |b \cdot c| \leq \sqrt{26}$, $|c| = 2$, 所以 $|a+b| \leq \frac{\sqrt{26}}{2}$, 所以 $a^2 + 2a \cdot b + b^2 \leq \frac{13}{2}$, 因为 $|a| = 1$, $|b| = 2$, 所以 $a \cdot b \leq \frac{3}{4}$, 则 $|a-b|^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b = 5 - 2a \cdot b \geq \frac{7}{2}$, 所以 $|a-b|$ 的

最小值为 $\frac{\sqrt{14}}{2}$, 故选 B.

解法二: 极化恒等式 $\frac{a^2+b^2}{2} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)_{\max}^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)_{\min}^2 = \frac{5}{2}$, 故只需求得 $\left|\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|_{\max}$, 根据法一的第一步可知 $|a+b| \leq \frac{\sqrt{26}}{2}$, 故 $|a-b|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{14}}{2}$, 故选 B.

15. D 【解析】解法一: 由题意, 可知: 因为 $a \cdot e = 2$, $b \cdot e = -1$, 所以 $(a+b) \cdot e = a \cdot e + b \cdot e = 1$. 因为 $|a+b| = 2$, $|e| = 1$, 所以 $\cos \langle a+b, e \rangle = \frac{(a+b) \cdot e}{|a+b| \cdot |e|} = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$.

所以 $\langle a+b, e \rangle = \frac{\pi}{3}$. 所以可以把 $a+b$ 和 e

两个向量作为基底向量来表示 a 和 b . 可设

$\begin{cases} a = \lambda_1(a+b) + \mu_1 e \\ b = \lambda_2(a+b) + \mu_2 e \end{cases}$. 因为 $a \cdot e = 2$, 所以 $2 =$

$a \cdot e = [\lambda_1(a+b) + \mu_1 e] \cdot e = \lambda_1(a+b) \cdot e + \mu_1 \cdot |e|^2 = \lambda_1 + \mu_1$. 同理, 因为 $b \cdot e = -1$, 所以 $-1 = b \cdot e = [\lambda_2(a+b) + \mu_2 e] \cdot e = \lambda_2(a+b) \cdot e + \mu_2 \cdot |e|^2 = \lambda_2 + \mu_2$. 联立两式,

得: $\begin{cases} \lambda_1 + \mu_1 = 2 \\ \lambda_2 + \mu_2 = -1 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \mu_1 = 2 - \lambda_1 \\ \mu_2 = -1 - \lambda_2 \end{cases}$. 又因为

$a+b = (\lambda_1 + \lambda_2)(a+b) + (\mu_1 + \mu_2)e$, 所以可得

方程组: $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 1 \\ \mu_1 + \mu_2 = 0 \end{cases}$, 即: $\begin{cases} \lambda_2 = 1 - \lambda_1 \\ \mu_2 = -\mu_1 \end{cases}$.

由上面两个方程组, 可知: $\begin{cases} \lambda_2 = 1 - \lambda_1 \\ \mu_1 = 2 - \lambda_1 \\ \mu_2 = \lambda_1 - 2 \end{cases}$. 所以

$a \cdot b = [\lambda_1(a+b) + \mu_1 e] \cdot [\lambda_2(a+b) + \mu_2 e] = [\lambda_1(a+b) + (2-\lambda_1)e] \cdot [(1-\lambda_1)(a+b) + (\lambda_1-2)e] = \lambda_1(1-\lambda_1) \cdot |a+b|^2 + [\lambda_1(\lambda_1-2) + (2-\lambda_1)(1-\lambda_1)] \cdot (a+b) \cdot e + (2-\lambda_1)(\lambda_1-2) \cdot |e|^2 = 4\lambda_1(1-\lambda_1) + [\lambda_1(\lambda_1-2) + (2-\lambda_1)(1-\lambda_1)] + (2-\lambda_1)(\lambda_1-2) = -3\lambda_1^2 + 3\lambda_1 - 2$. 由二次函数的知识, 可知: 当 $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ 时, $a \cdot b$ 取得最大值为 $-\frac{5}{4}$. 故选 D.

解法二: $a \cdot b = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$, 故根据题

意, 只需求 $|(a-b)|$ 最小值, 根据 $a \cdot e - b \cdot e = (a-b)e = 3 \leq |(a-b)|$, 故 $a \cdot b = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \geq 1 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{5}{4}$. 故选 D.

16. B 【解析】解法一: 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得: $\cos \angle ABC = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2BC \cdot AB} = \frac{4}{7}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = |\vec{AB}| |\vec{BC}| \cos(\pi - \angle ABC) = 7 \times 8 \times \left(-\frac{4}{7}\right) = -32$, 故选 B.

解法二: 根据极化恒等式 $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -BD^2 + \left(\frac{AC}{2}\right)^2 = -BD^2 + \frac{49}{4}$, 其中 D 为 AC 中点, 由于 $\frac{BA^2 + BC^2}{2} = BD^2 + \left(\frac{AC}{2}\right)^2 \Rightarrow BD^2 = \frac{BA^2 + BC^2}{2} - \left(\frac{AC}{2}\right)^2 = \frac{177}{4}$, $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -BD^2 + \frac{49}{4} = -32$, 故选 B.

17. 【解析】 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AM}|^2 - |\vec{BM}|^2 = 9 - 25 = -16$.

18. 【解析】 $\vec{BA} \cdot \vec{CA} = |\vec{AD}|^2 - |\vec{BD}|^2 = 4$, $\vec{BF} \cdot \vec{CF} = \left|\frac{1}{3}\vec{AD}\right|^2 - |\vec{BD}|^2 = -1$; 解得 $|\vec{AD}|^2 = \frac{45}{8}$, $|\vec{BD}|^2 = \frac{13}{8}$, 故 $\vec{BE} \cdot \vec{CE} = \left|\frac{2}{3}\vec{AD}\right|^2 - |\vec{BD}|^2 = \frac{7}{8}$.

19. 【解析】设 $\vec{OA} = a$, $\vec{OB} = b$, $\vec{OC} = e$, 则 $\vec{OD} = a + b$, $\vec{BA} = \vec{a} + b$, 由绝对值不等式得 $\sqrt{6} \geq |a \cdot e| + |b \cdot e| \geq |a \cdot e + b \cdot e| = |(a+b) \cdot e|$, 于是对任意的单位向量 e , 均有 $|(a+b) \cdot e| \leq \sqrt{6}$, 由题设当且仅当 e 与 $\vec{OD}$ 同向时, 等号成立, 此时 $(a+b)^2$ 取得最大值 6, 由于 $|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2) = 10$, 于是 $(a-b)^2$ 取得最小值 4, 则 $a \cdot b = \frac{|a+b|^2 - |a-b|^2}{4} \leq \frac{1}{2}$, $a \cdot b$ 的最大值是 $\frac{1}{2}$.

20. 4 21. $\frac{1}{2}$ 22. $2\sqrt{2}$ 23. 25

24. 【解析】解法一: 由 $AB = 2$, $AC = 4$, $\angle BAC = 60^\circ$ 可得 $BC = 2\sqrt{3}$, $AB \perp BC$, 以 B 为原点建立

坐标系如图 1, 作 $PE \perp BC$ 于 E , 设 P 点横坐标为 x , 则 $x \in [0, 2\sqrt{3}]$, $EC = 2\sqrt{3} - x$, 所以 $PE = \frac{\sqrt{3}}{3}(2\sqrt{3} - x)$, 所以 $P\left(x, \frac{\sqrt{3}}{3}(2\sqrt{3} - x)\right)$, 所以 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = \left(-x, \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 2\sqrt{3})\right) \cdot \left(2\sqrt{3} - x, \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 2\sqrt{3})\right) = x(x - 2\sqrt{3}) + \frac{1}{3}(x - 2\sqrt{3})^2 = \frac{4}{3}x^2 - \frac{10\sqrt{3}}{3}x + 4$, 由二次函数可知, 当 $x = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ 时得最小值 $-\frac{9}{4}$, 当 $x = 0$ 时得最大值 4, 所以 $\vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 的范围为 $\left[-\frac{9}{4}, 4\right]$, 故答案为 $\left[-\frac{9}{4}, 4\right]$.

图 1

图 2

解法二: 极化恒等式, 如图 2 所示, 取 BC 中点 E , $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = PE^2 - BE^2 = PE^2 - 3$, 显然当 $PE \perp AC$ 时, PE 取得最小值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 当 P 位于 A 点时, PE 取得最大值 $\sqrt{7}$, 所以 $\vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 的范围为 $\left[-\frac{9}{4}, 4\right]$. 故答案为 $\left[-\frac{9}{4}, 4\right]$.

25. 【解析】(1) $x_1^2 + x_2^2 = 3y_1^2 + y_2^2 = 2$ (参考仿射大法部分, 这里不详解); (2) $4|\vec{OM}|^2 + |\vec{PQ}|^2 \geq 4|\vec{OM}| \cdot |\vec{PQ}|$, 所以 $|\vec{OM}| \cdot |\vec{PQ}| \leq \frac{1}{4}[(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + (y_2 + y_1)^2] = \frac{5}{2}$, 故最大值为 $\frac{5}{2}$, 故答案为 $\frac{5}{2}$.

专题 7 极化恒等式之矩形大法

达标训练

1. C 【解析】如图所示, 设 $a = \vec{OA}$, $b = \vec{OB}$, $c = \vec{OC}$, 点 C 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 点 A, B 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 则 $a - c = \vec{CA}$, $b - c = \vec{CB}$, 因此 $CA \perp$

CB, 作矩形 ACBD, 故根据矩形大法 $|\vec{OA}|^2 + |\vec{OB}|^2 = |\vec{OC}|^2 + |\vec{OD}|^2$, 即 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = |c|^2 + |\vec{OD}|^2$, 根据 $|\vec{CD}| - |\vec{OC}| \leq |\vec{OD}| \leq |\vec{OC}| + |\vec{CD}|$, $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$, 即 $|\vec{AB}| - 1 \leq \sqrt{7} \leq 1 + |\vec{AB}|$, 故有 $|\vec{a} - \vec{b}| \in [\sqrt{7} - 1, \sqrt{7} + 1]$. 故选 C.

2. D 【解析】如图, 设 $\vec{a} = \vec{OA}$, $\vec{b} = \vec{OB}$, $\vec{c} = \vec{OC}$, 由 $|\vec{a}| = 1$, $\vec{a} \perp (\vec{a} - 2\vec{b})$, 所以 $\vec{a} \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 即 $1 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, $(\vec{a} - \vec{c}) \perp (\vec{b} - \vec{c})$, 因此 $CA \perp CB$, 作矩形 ACBD, M 为 AB 中点, 根据三角形知识 $|\vec{OC}| + |\vec{CM}| \geq |\vec{OM}|$, $|\vec{OD}| - |\vec{DM}| \leq |\vec{OM}|$, 当 O, C, D 三点共线时, $|\vec{OC}| = m$, $|\vec{OD}| = n$, 故根据矩形大法 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OC} \cdot \vec{OD} = \frac{1}{2}$, 且 $|\vec{OA}|^2 + |\vec{OB}|^2 = |\vec{OC}|^2 + |\vec{OD}|^2 = \frac{41}{4}$, 故 $(m+n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn = \frac{45}{4} \Rightarrow m+n = \frac{3\sqrt{5}}{2}$; 故选 D.

3. B 【解析】如图, 作矩形 ACBD, 因为 $\angle C = 90^\circ$, $|\vec{AB}| = 6$, 所以 $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$, $|\vec{CA} + \vec{CB}| = |\vec{CA} - \vec{CB}| = |\vec{AB}| = |\vec{CD}| = 6$, 连接 CD 并反向延长至 P_1 , 根据矩形大法 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PC} \cdot \vec{PD}$, 易知当 $\vec{PC}$ 与 $\vec{CA} + \vec{CB}$ 方向相同时, 即 P 位于 P_1 时, $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 取得最大值 $2 \times 8 = 16$, 故选 B.

4. B 【解析】如图, 由 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ 是单位向量, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{c} = \vec{OC}$, 作正方形 OADB, 易知 $|\vec{AB}| = |\vec{OD}| = \sqrt{2}$, 由向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}| = 2$, 故 C 在以 D 为圆心, 2 为半径的圆上, 所以 $2 - \sqrt{2} \leq |\vec{c}| \leq 2 + \sqrt{2}$. 故选 B.

5. A 【解析】如图, 设 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OD} = 2\vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OE} = \frac{2}{3}\vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$, 显然 $|\vec{OD}| = 4$, $|\vec{OE}| = 2$, $|\vec{b}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \Rightarrow \angle AOB = 60^\circ$ 则: $\angle OED = 90^\circ$, $|\vec{ED}| = 2\sqrt{3}$, $(\vec{c} - 2\vec{a}) \cdot (\vec{c} - \frac{2}{3}\vec{b}) = 0 \Rightarrow \vec{CE} \perp \vec{CD}$; 所以 $\vec{c}$ 的终点在以 ED 中点 G 为圆心, $\sqrt{3}$ 为半径的圆上, 当 B, C, G, F 共线时, $|\vec{b} - \vec{c}|$ 的最小值 $|\vec{BC}|$ 为 $|\vec{BG}| - |\vec{CG}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} - \sqrt{3} = 2 - \sqrt{3}$. 故选 A.

6. C 【解析】因为 $|\vec{AB}| = 1$, $|\vec{BC}| = 2$, 若 $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$, $\vec{AD} \cdot \vec{DC} = 0$, 所以 A, B, C, D 四点共圆, 圆的直径为 $|\vec{AC}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 则 $|\vec{BD}|$ 的最大值为直径长度为 $\sqrt{5}$, 故选 C.

7. C 【解析】由 $c^2 - (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 得:

$(c-a) \cdot (c-b) = 0$, 即 $(c-a) \perp (c-b)$, 设 $\vec{DA} = a$, $\vec{DC} = b$, $\vec{DC} = c$, 则 $c-a = \vec{AC}$, $c-b = \vec{BC}$, 则点 C 在以 AB 为直径的圆 O 周上运动, 由图知: 当 $DC \perp AB$ 时, $|DC| \geq |DC'|$, 设 $\angle ADC = \theta$, 则 $|DC| = |DO| + |AO| = \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $|DC|$ 取最大值 $\sqrt{2}$, 故选 C.

8. A 【解析】因为 $|a|=1$, $|b|=2$, $a \cdot b=1$, 所以 $\cos\theta = \frac{1}{2}$ 即夹角 $\theta = \frac{1}{3}\pi$, 故可设 $a = \vec{OA} = (1, 0)$, $b = \vec{OB} = (1, \sqrt{3})$, $c = \vec{OC} = (x, y)$, 因为 $(a-c) \cdot (b-c) = 0$, 所以 $(1-x, -y) \cdot (1-x, \sqrt{3}-y) = 0$ 所以 $(x-1)^2 + y^2 - \sqrt{3}y = 0$, 即 $(x-1)^2 + (y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$ 表示以 $M(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 为圆心, 以 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 为半径的圆, 则 $|2a-c| = |CD|$ 最大值的几何意义是在圆 M 上任取一点, 到 $D(2, 0)$ 的距离的最大值, 根据圆的性质可知, 所求的值为圆心 $M(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 到 D 的距离 $|C'D| = |MD| + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{7}}{2}$, 故选 A.

9. 【解析】设 $\vec{OB} = a$, $\vec{OC} = b$, $\vec{OD} = c$, 如图 c 的终点 D 的几何意义是以 $a+b$ 的终点 A 为圆心, $|a-b|$ 为半径的圆, 则 $|c|$ 的最大值为 $|a+b| + |a-b|$, 因为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 所以 $2(a^2 + b^2) \geq a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, 则 $a+b \leq \sqrt{2(a^2 + b^2)}$, 则 $|a+b| + |a-b| \leq \sqrt{2(|a+b|^2 + |a-b|^2)} = \sqrt{2(a^2 + 2a \cdot b + b^2 + a^2 - 2a \cdot b + b^2)} =$

$\sqrt{4(|a|^2 + |b|^2)} = \sqrt{4 \times (1+1)} = 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $|a+b| = |a-b|$, 即 $a \perp b$ 时取等号, 即 $|c|$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$. 故答案为 $2\sqrt{2}$.

10. 【解析】如图, 设 $\vec{OA} = a$, $\vec{OB} = b$, $\vec{OC} = a+b$, 因为 $|a|=|b|=1$, 且 $a \perp b$, 所以四边形 $OACB$ 是边长为 1 的正方形, 以 C 为圆心, 以 1 为半径作圆 C , 设 $\vec{OD} = -\vec{m}$, 则 $|a+b+\vec{m}| = |\vec{OC} - \vec{OD}| = |\vec{CD}| \leq 1$, 所以 D 在圆 C 内部或圆周上, 且 $|\vec{m}| = |-\vec{m}| = |OD|$. 所以 $\sqrt{2}-1 \leq |OD| \leq \sqrt{2}+1$, 即 $\sqrt{2}-1 \leq |\vec{m}| \leq \sqrt{2}+1$. 故答案为 $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$.

11. 【解析】如图所示, 因为 $\vec{OB}_1 \perp \vec{OB}_2$, 则根据矩形大法 $|OM|^2 + |PM|^2 = |B_1M|^2 + |B_2M|^2 = 4$, 又由于 $0 \leq |\vec{MP}| < 1$ 所以 $|\vec{OM}|$ 的范围是 $(\sqrt{3}, 2]$. 故答案为 $(\sqrt{3}, 2]$.

12. 【解析】连接 P_1P_3 和 P_2P_4 交于 M , 根据矩形大法可知 $\vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_3 = \vec{OP}_2 \cdot \vec{OP}_4 = |OM|^2 - |P_1M|^2 = |OM|^2 - \frac{49}{4}$, $|OP_1|^2 + |OP_3|^2 = |OP_2|^2 + |OP_4|^2 = 41 = 2(|OM|^2 + |P_1M|^2) \Rightarrow |OM|^2 = \frac{33}{4}$, 所以 $\vec{OP}_2 \cdot \vec{OP}_4 = \frac{33}{4} - \frac{49}{4} = -4$. 故答案为 -4 .

13. 【解析】如图，以 O 为原点，以 OB_2, OB_1 所在直线为坐标轴建立平面直角坐标系，则 $B_1(0, 2), B_2(1, 0), P = (1, 2)$ ，因为 $|\vec{MB}_1| = |\vec{MB}_2|$ ，所以 M 点的轨迹为为线段 B_1B_2 的中垂线 l ，直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1$ ，即 $x - 2y + \frac{3}{2} = 0$ ，所以 P 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|1 - 4 + \frac{3}{2}|}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$ 。所以 $|\vec{PM}| \geq \frac{3\sqrt{5}}{10}$ 。故答案为 $\left[\frac{3\sqrt{5}}{10}, +\infty\right)$

14. 【解析】如图所示，构造正方形 $ABED$ ，以 A 为圆心， AB 为半径在正方形内部作圆，显然 C 在圆弧上，根据矩形大法可知， $\vec{CB} \cdot \vec{CD} = \vec{CA} \cdot \vec{CE}$ ，故当 A, C, E 三点共线时， $\vec{CA} \cdot \vec{CE}$ 取得最小值 $-\sqrt{2} \cdot (2 - \sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2}$ ，故答案为 $2 - 2\sqrt{2}$ 。

15. 【解析】(1) $|\mathbf{a} - 2\mathbf{b}| = \sqrt{(\mathbf{a} - 2\mathbf{b})^2} = \sqrt{16 + 4 \times 4} = 4\sqrt{2}$;

(2) 如上图构造矩形 $OADB$ ，设 $\vec{OA} = \mathbf{a}, \vec{OB} =$

$\mathbf{b}, \vec{OC} = \mathbf{c}$ ，因为 $(\mathbf{c} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = 0$ ，所以 C 在以 AB 为直径的圆上，当 OC 为直径时， $|\mathbf{c}|$ 的最大值为 $\sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{5}$ 。

16. 【解析】(1) 由题意可得 $2b = 2$ ，即 $b = 1, e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $a^2 - c^2 = 1$ ，解得 $a = \sqrt{2}, b = 1$ ，即有椭圆的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ；
- (2) 解法一：设 $P(x_0, y_0)$ ，切线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，可得 $y = kx + (y_0 - kx_0)$ ，代入椭圆方程 $x^2 + 2y^2 = 2$ ，即有 $(1 + 2k^2)x^2 + 4k(y_0 - kx_0)x + 2(y_0 - kx_0)^2 - 2 = 0$ ，由直线与椭圆相切，可得 $\Delta = 0$ ，即为 $16k^2(y_0 - kx_0)^2 - 8(1 + 2k^2)[(y_0 - kx_0)^2 - 1] = 0$ ，化为 $k^2(x_0^2 - 2) - 2kx_0y_0 + y_0^2 - 1 = 0$ ，由 $T_1P \perp T_2P$ ，可得 $k_1k_2 = -1$ ，即有 $\frac{x_0^2 - 1}{y_0^2 - 2} = -1$ ，化为 $x_0^2 + y_0^2 = 3$ ，可得点 P 的轨迹 E 的方程为圆 $x^2 + y^2 = 3$ ；

解法二：参考例 6 用矩形大法来证明。

- (3) PT_1 交 E 于 Q_1, PT_2 交 E 于 Q_2 ，可得 Q_1Q_2 为圆的直径，设 $\angle PQ_1Q_2 = \alpha$ ，即有 $PQ_1 = 2\sqrt{3}\cos\alpha, PQ_2 = 2\sqrt{3}\sin\alpha$ ，则 $\triangle PQ_1Q_2$ 面积为 $S = \frac{1}{2}PQ_1 \cdot PQ_2 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3}\cos\alpha \cdot 2\sqrt{3}\sin\alpha = 6\sin\alpha\cos\alpha = 3\sin 2\alpha$ ，当 $\alpha = 45^\circ$ 时， $\sin 2\alpha$ 取得最大值 1。

专题 8 对角线向量定理(斯坦纳定理)

达目标训练

1. B 【解析】解法一：因为在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中，所以 $\triangle ACE$ 是边长为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，且 $AE \parallel BD, AE = BD$ ，所以 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \vec{AC} \cdot \vec{AE} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \cos 60^\circ = \frac{3}{2}$ ，故选 B。
- 解法二：对角线向量定理， $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \frac{AD^2 + BC^2 - AB^2 - CD^2}{2} = \frac{3}{2}$ ，故选 B。
2. B 【解析】解法一： $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = (\vec{AD} + \vec{DC})(\vec{AD} - \vec{AB}) = (\vec{AD} + \frac{2}{5}\vec{AB})(\vec{AD} - \vec{AB}) = \vec{AD}^2 - \frac{3}{5}\vec{AD} \cdot$

$$\vec{AB} - \frac{2}{5}\vec{AB}^2 = 0, \text{ 所以 } \vec{AD}^2 - \frac{3}{5}\vec{AD} \cdot \vec{AB} = 10, \vec{AD} \cdot$$

$$\vec{BC} = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = \vec{AD} \cdot (\vec{AD} + \vec{DC} - \vec{AB}) = \vec{AD}^2 - \frac{3}{5}\vec{AD} \cdot \vec{AB} = 10, \text{ 故选 B.}$$

解法二: 作辅助线 $CE \parallel BD$ 交 AB 延长线于 E , 易知 $AC \perp CE$, 且 $|AE| = 7$, 根据对角线向量定理可得: $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = \frac{AC^2 + BD^2 - AB^2 - CD^2}{2} = \frac{AE^2 - AB^2 - CD^2}{2} = 10$. 故选 B.

3. A 【解析】解法一: 由图可知 $|\vec{AB}| = |\vec{AC}| = 4$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2$, $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$, $\vec{BN} = \vec{BA} + \vec{AN} = -\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$, 所以 $\vec{AM} \cdot \vec{BN} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot (-\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}) = -\frac{1}{2}\vec{AB}^2 + \frac{1}{4}\vec{AC}^2 - \frac{1}{4}\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -6$, 故选 A.

解法二: $\vec{AM} \cdot \vec{BN} = \frac{AN^2 + BM^2 - AB^2 - MN^2}{2} = \frac{4 + 4 - 16 - 4}{2} = -6$, 故选 A.

4. D 【解析】解法一: 设 AB 中点为 D , 则 $\vec{OP} = \vec{OD} + \vec{DP}$, $\vec{OD} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$, 所以 $c \cdot (a - b) = (\vec{OD} + \vec{DP}) \cdot \vec{BA} = \vec{OD} \cdot \vec{BA} + \vec{DP} \cdot \vec{BA} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB}) \cdot (\vec{OA} - \vec{OB}) + 0 = \frac{1}{2}(a^2 - b^2) = \frac{1}{2}(9 - 4) = \frac{5}{2}$, 故选 D.

解法二: $c \cdot (a - b) = \vec{OP} \cdot \vec{BA} = \frac{(\vec{OA}^2 + \vec{PB}^2) - (\vec{OB}^2 + \vec{PA}^2)}{2} = \frac{\vec{OA}^2 - \vec{OB}^2}{2} = \frac{9 - 4}{2} = \frac{5}{2}$

$\frac{5}{2}$, 故选 D.

5. D 【解析】解法一: 取 AB, AC 的中点 E, F , $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \vec{AO} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = \vec{AO} \cdot \vec{AC} - \vec{AO} \cdot \vec{AB} = 2\vec{AO} \cdot \vec{AF} - 2\vec{AO} \cdot \vec{AE} = 2|\vec{AO}| |\vec{AF}| \cos \angle OAF - 2|\vec{AO}| |\vec{AE}| \cos \angle OAE = 2|\vec{AO}| |\vec{AF}| \frac{|\vec{AF}|}{|\vec{AO}|} - 2|\vec{AO}| |\vec{AE}| \frac{|\vec{AE}|}{|\vec{AO}|} = 2|\vec{AF}|^2 - 2|\vec{AE}|^2 = 2 \times 2^2 - 2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}$, 故选 D.

解法二: $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \frac{AC^2 + OB^2 - AB^2 - OC^2}{2} = \frac{7}{2}$, 故选 D.

6. C 【解析】解法一: 可设菱形的边长为 1, 则 $BE = CF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BD = 1$; 线段 AD, BD 的中点分别为 E, F ; 所以 $\vec{BE} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{BD})$, $\vec{CF} = \frac{1}{2}(\vec{CB} + \vec{CD}) = \frac{1}{2}(\vec{BD} - 2\vec{BC})$; 所以 $\vec{BE} \cdot \vec{CF} = \frac{1}{4}(\vec{BA} + \vec{BD}) \cdot (\vec{BD} - 2\vec{BC}) = \frac{1}{4}\vec{BA} \cdot \vec{BD} - \frac{1}{2}\vec{BA} \cdot \vec{BC} + \frac{1}{4}\vec{BD}^2 - \frac{1}{2}\vec{BD} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{8} - \frac{1}{2}\cos \langle \vec{BA}, \vec{BC} \rangle + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{8} - \frac{1}{2}\cos \langle \vec{BA}, \vec{BC} \rangle$, 所以 $\cos \langle \vec{BE}, \vec{CF} \rangle = \frac{\vec{BE} \cdot \vec{CF}}{|\vec{BE}| |\vec{CF}|} = \frac{\frac{1}{8} - \frac{1}{2}\cos \langle \vec{BA}, \vec{BC} \rangle}{\frac{3}{4}}$, 由图看出 $-\frac{1}{2} < \cos \langle \vec{BA}, \vec{BC} \rangle < 1$, 所以 $-\frac{1}{2} < \cos \langle \vec{BE}, \vec{CF} \rangle < \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{3} < \cos \langle \vec{BE}, \vec{CF} \rangle < \frac{2\pi}{3}$, 即异面直线 BE 与 CF 所成角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$. 故选 C.

解法二: 设 $AB = 2$, 在翻折过程中 $1 < CE < \sqrt{7}$, $\cos \langle \vec{CF}, \vec{BE} \rangle = \frac{|(\vec{FB}^2 + \vec{CE}^2) - (\vec{CB}^2 + \vec{EF}^2)|}{2|\vec{CF}| \cdot |\vec{BE}|}$

$$\frac{|\vec{CE}^2 - 4|}{6} \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \text{ 所以异面直线 } BE \text{ 与 } CF$$

所成角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故选 C.

7. C 【解析】解法一：以 D 为原点，DA 为 x 轴，DC 为 y 轴，DD₁ 为 z 轴，建立空间直角坐标系，因为在长方体 ABCD - A₁B₁C₁D₁ 中，AB = BC = 1，AA₁ = $\sqrt{3}$ ，所以 A(1, 0, 0)，D₁(0, 0, $\sqrt{3}$)，D(0, 0, 0)，B₁(1, 1, $\sqrt{3}$)， $\vec{AD}_1 = (-1, 0, \sqrt{3})$ ， $\vec{DB}_1 = (1, 1, \sqrt{3})$ ，设异面直线 AD₁ 与 DB₁ 所成角为 θ ，则 $\cos\theta = \frac{|\vec{AD}_1 \cdot \vec{DB}_1|}{|\vec{AD}_1| \cdot |\vec{DB}_1|} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，所以异面直线 AD₁

与 DB₁ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$. 故选 C.

解法二： $\cos\langle AD_1, DB_1 \rangle = \frac{AB_1^2 + DD_1^2 - AD^2 - B_1D_1^2}{2|AD_1| |DB_1|} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 故选 C.

8. C 【解析】解法一：梯形 ABCD 中，AD // BC，AD = 5，BC = 3，设梯形的高为 h，则梯形 ABCD 的面积为 $\frac{1}{2}(5+3)h = 8$ ，解得 h = 2；建立平面直角坐标系如图所示，设 B(x, 2)，则 C(x+3, 2)，又 A(0, 0)，D(5, 0)，所以 $\vec{AC} = (x+3, 2)$ ， $\vec{BD} = (5-x, -2)$ ，所以 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = (x+3)(5-x) - 4 = -x^2 + 2x + 11$ ，当 x = 1 时， $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$ 取得最大值为 -1 + 2 + 11 = 12. 故选 C.

图 1

图 2

图 3

解法二：对角线向量定理， $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \frac{AD^2 + BC^2 - AB^2 - CD^2}{2} = \frac{34 - (AB^2 + CD^2)}{2}$ ，如

图 2，过 B 作 BE // CD 交 AD 于 E，F 为 AE 中点，BG ⊥ AD 于 G，则 $\frac{AB^2 + CD^2}{2} = \frac{AB^2 + BE^2}{2} =$

$$BF^2 + AF^2 \geq BG^2 + AF^2 = 5, (\vec{AC} \cdot \vec{BD})_{\max} = 12.$$

解法三：极化恒等式平移构造，如图 3，过 C 作 CE // BD 交 AD 延长线于 E，M 为 AE 中点，CH ⊥ AD 于 H， $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = -\vec{CA} \cdot \vec{CE} = -(CM^2 - AM^2) \leq 16 - CH^2 = 12$ ，故选 C.

9. C 【解析】解法一：由条件，知 $\vec{CD} \cdot \vec{AB} = 0$ ， $\vec{AB} \cdot \vec{BD} = 0$ ， $\vec{CD} = \vec{CA} + \vec{AB} + \vec{BD}$. 所以 $|\vec{CD}|^2 = |\vec{CA}|^2 + |\vec{AB}|^2 + |\vec{BD}|^2 + 2\vec{CA} \cdot \vec{AB} + 2\vec{AB} \cdot \vec{BD} + 2\vec{CA} \cdot \vec{BD} = 6^2 + 4^2 + 8^2 + 2 \times 6 \times 8 \cos 120^\circ = 68$ ，所以 $CD = 2\sqrt{17}$ ，故选 C.

解法二： $AD^2 = AB^2 + BD^2 = 80$ ， $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 52$ ， $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \frac{1}{2}((AD^2 + BC^2) - (AB^2 + CD^2))$ ，解得 $|\vec{CD}| = 2\sqrt{17}$. 故选 C.

10. 【解析】解法一：如图，因为 AB = 2，AC = 3， $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2$ ，且 $\vec{BP} = 2\vec{PC}$ ，所以 $\vec{AP} \cdot \vec{BC} = (\vec{AB} + \vec{BP}) \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = \left(\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BC}\right) \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = \left(\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}\right) \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = -\frac{1}{3}\vec{AB} \cdot \vec{AC} - \frac{1}{3}|\vec{AB}|^2 + \frac{2}{3}|\vec{AC}|^2 = -\frac{1}{3} \times 2 - \frac{1}{3} \times 4 + \frac{2}{3} \times 9 = 4$. 故答案为 4.

解法二：由余弦定理向量式得 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{\vec{AB}^2 + \vec{AC}^2 - \vec{BC}^2}{2} = 2$ 得 $BC = 3$ 。又 $\vec{BC} = 2\vec{PC}$ ，

所以 $PB = 2, PC = 1$ 。由对角线向量定理得 $\vec{AP} \cdot \vec{BC} = \frac{(\vec{AC}^2 + \vec{PB}^2) - (\vec{AB}^2 + \vec{PC}^2)}{2} = \frac{(9+4) - (4+1)}{2} = 4$ 。

11. 【解析】解法一：因为已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2， E 为 CD 的中点，则 $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ ，故 $\vec{AE} \cdot \vec{BD} = (\vec{AD} + \vec{DE}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AD}) = (\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}) \cdot (\vec{AD} - \vec{AB}) = \vec{AD}^2 - \vec{AD} \cdot \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} \cdot \vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AB}^2 = 4 + 0 - 0 - \frac{1}{2} \times 4 = 2$ 。故答案为 2。

解法二：由对角线定理得， $\vec{AE} \cdot \vec{BD} = \frac{\vec{AD}^2 + \vec{EB}^2 - (\vec{AB}^2 + \vec{ED}^2)}{2} = 2$ 。

12. 【解析】解法一：取 BD 的中点 H ，连接 AH, CH ，由 $\triangle BCD$ 为等边三角形可得 $CH \perp BD$ ，由 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 1$ ，可得 $(\vec{AH} + \vec{HC}) \cdot \vec{BD} = \vec{AH} \cdot \vec{BD} + \vec{HC} \cdot \vec{BD} = \vec{AH} \cdot \vec{BD} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AB}) \cdot (\vec{AD} - \vec{AB}) = \frac{1}{2}(\vec{AD}^2 - \vec{AB}^2) = 1$ ，可得 $\vec{AD}^2 = \vec{AB}^2 + 2 = 4 + 2 = 6$ ，即有 AD 的长为 $\sqrt{6}$ 。故答案为 $\sqrt{6}$ 。

解法二： $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \frac{AD^2 + BC^2 - AB^2 - CD^2}{2} = 1 \Rightarrow AD^2 = 2 + CD^2 + AB^2 - BC^2 = 6$ 。故答案为 $\sqrt{6}$ 。

13. 【解析】解法一： $AB \perp BC$ ， $AB = 6, BC = 8$ ，所以 $AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ，所以 $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$ ；又 $\triangle ACD$ 是等边三角形，所以 $AD = AC = 10$ ， $\cos \angle CAD = \frac{1}{2}$ ，所以 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \vec{AC} \cdot$

$(\vec{AD} - \vec{AB}) = \vec{AC} \cdot \vec{AD} - \vec{AC} \cdot \vec{AB} = 10 \times 10 \times \frac{1}{2} - 10 \times 6 \times \frac{3}{5} = 14$ 。

解法二： $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \frac{AD^2 + BC^2 - AB^2 - CD^2}{2} = \frac{AD^2 + 64 - 36 - CD^2}{2} = 14$ ，故答案为 14。

14. 【解析】解法一：矩形 $ABCD$ 中， $AB = 4, BC = 3$ ，过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E ，过点 B 作 $BF \perp AC$ 于点 F ，如图所示，则 $|\vec{DE}| = |\vec{BF}| = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$ ， $|\vec{EF}| = 5 - 2 \times \frac{9}{5} = \frac{7}{5}$ ；沿对角线 AC 把矩形折成二面角 $D-AC-B$ 的平面角为 60° 时，则 $\vec{BD} = \vec{BF} + \vec{FE} + \vec{ED}$ ， $\vec{BD}^2 = \vec{BF}^2 + \vec{FE}^2 + \vec{ED}^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = (\frac{12}{5})^2 \times 2 + (\frac{7}{5})^2 + 0 + 0 + 2 \times \frac{12}{5} \times \frac{12}{5} \times \cos(180^\circ - 60^\circ) = \frac{193}{25}$ ，所以 $|\vec{BD}| = \frac{\sqrt{193}}{5}$ 。故答案为 $\frac{\sqrt{193}}{5}$ 。

解法二：由于 $\cos \langle \vec{DE}, \vec{BF} \rangle = \frac{DF^2 + BE^2 - BD^2 - EF^2}{2|\vec{DE}||\vec{BF}|} = \frac{1}{2}$ ①，因为 $|\vec{DE}| = |\vec{BF}| = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$ ， $|\vec{EF}| = 5 - 2 \times \frac{9}{5} = \frac{7}{5}$ ， $|\vec{DF}| = |\vec{BE}| = \sqrt{(\frac{12}{5})^2 + (\frac{7}{5})^2} = \frac{\sqrt{193}}{5}$ ，代入①，所以 $|\vec{BD}| = \frac{\sqrt{193}}{5}$ 。故答案为 $\frac{\sqrt{193}}{5}$ 。

第3章 天山七剑下四海 解三角形破解路 专题1 三板斧之射影定理

←←← 达标训练

1. C 【解析】解法一：由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ ，即 $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B, c =$

$2R\sin C$, 代入 $a\cos B + b\cos A$ 中得: $2R\sin A\cos B + 2R\sin B\cos A = 2R(\sin A\cos B + \cos A\sin B) = 2R\sin(A+B) = 2R\sin C = c$. 故选 C.

解法二: 射影定理直接可得 $a\cos B + b\cos A = c$. 故选 C.

2. 【解析】在 $\triangle ABC$ 中, 根据射影定理 $3b\sin A = c\cos A + a\cos C = b$, 所以 $\sin A = \frac{1}{3}$. 所以 $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = \frac{7}{9}$, 故答案为 $\frac{1}{3}, \frac{7}{9}$.
3. 【解析】由射影定理得: $a\cos B + b\cos A = 3a = c$, $c = 3a$, 所以 $\frac{c}{a} = 3$. 故答案为 3.
4. 【解析】因为 $b\cos C + (a+c)(b\sin C - 1) = 0$, 且 $a+c=2$, 所以 $(b\cos C - a) + 2b\sin C - c = -c\cos B + 2b\sin C - c = 0$, 由正弦定理可得 $-\sin C\cos B + 2\sin B\sin C - \sin C = 0$, 即有 $2\sin B - \cos B = 1$, 可得: $\cos B = 2\sin B - 1$, 可得: $\sin^2 B + \cos^2 B = \sin^2 B + (2\sin B - 1)^2 = 1$, 解得: $\sin B = \frac{4}{5}$. 故答案为 $\frac{4}{5}$.
5. 【解析】在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $a\sin B\cos C + c\sin B\cos A = \frac{1}{2}b \Rightarrow a\cos C + c\cos A = \frac{b}{2\sin B} = b$, 所以 $\sin B = \frac{1}{2}$, 又 $a > b$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$. 故答案为 $\frac{\pi}{6}$.
6. 【解析】因为 $(2a-b) \cdot \cos C = c \cdot \cos B$, 所以 $2a\cos C = b\cos C + c\cos B = a$, 所以 $\cos C = \frac{1}{2}$, 又 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6$. 故答案为 6.
7. 【解析】因为 $(a+2c)\cos B + b\cos A = 0$, 所以 $-2c\cos B = a\cos B + b\cos A = c$, 所以 $\cos B = -\frac{1}{2}$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3}$. 故答案为 $\frac{2\pi}{3}$.
8. 【解析】根据题意, $\triangle ABC$ 中, $b = a\left(\cos C + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin C\right) = a\cos C + c\cos A$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{3}a\sin C = c\cos A$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{3}\sin A\sin C = \sin C\cos A$, 变形可得 $\tan A = \sqrt{3}$, 则 $A = \frac{\pi}{3}$, 即 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 又由 $a = \sqrt{3}, c = 1$, 则

$\sin C = \frac{c \times \sin A}{a} = \frac{1}{2}$, 又由 $a > c$, 则 $A > C$, 则 $C = \frac{\pi}{6}$. 故答案为 $\frac{\pi}{6}$.

9. 【解析】(1) 由已知, $(2b-c)(b^2+c^2-a^2) = 2ab\cos C$, 则 $(2b-c)\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = a\cos C$, 所以 $(2b-c)\cos A = a\cos C$, 由正弦定理, $2\sin B\cos A - \sin C\cos A = \sin A\cos C$, 所以 $2\sin B\cos A = \sin(A+C) = \sin B$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 又因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = 60^\circ$; (2) 解法一: 由题意, $A = \frac{\pi}{3}$ 及 $a = \sqrt{3}$, 求得三角形外接圆半径 $R = 1$, 建立以外接圆圆心为原点的坐标系, $BC \parallel x$ 轴, M 点坐标为 $(0, -\frac{1}{2})$, 则 A 点坐标为 $(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6})$, 则 $|AM| = \sqrt{\cos^2\theta + (\sin\theta + \frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{5}{4} + \sin\theta}$, $\sin\theta \leq 1$ (当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取“=”), 所以 $|AM|$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

解法二: 因为 AM 为 BC 边上中线, 令 $\vec{AB} = \mathbf{c}$, $\vec{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\vec{AM} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$ ①, $\frac{\vec{CB}}{2} = \frac{\mathbf{b} - \mathbf{c}}{2}$ ② 两式平方和得 $AM^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{b^2 + c^2}{2}$; 又因为 $a = \sqrt{3}$, 所以 $b^2 + c^2 - 3 = bc \leq \frac{b^2 + c^2}{2}$, 所以 $b^2 + c^2 \leq 6$, 所以 $AM \leq \frac{3}{2}$, 即 AM 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

10. 【解析】(1) $\triangle ABC$ 中, 由 $\frac{4\sin A - \sqrt{7}\cos C}{c} = \frac{\sqrt{7}\cos B}{b}$, 根据正弦定理得, $(4\sin A - \sqrt{7}\cos C) \cdot \sin B = \sqrt{7}\cos B\sin C$ $4\sin A\sin B = \sqrt{7}\cos B\sin C + \sqrt{7}\sin B\cos C$, 即 $4\sin B\sin A = \sqrt{7}\sin A$, 所以 $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$; (2) 由已知和正弦定理以及 (1) 得 $\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2}$, ① 设 $\cos A - \cos C = x$, ②, ①² + ②², 得 $2 - 2\cos(A+C) = \frac{7}{4} + x^2$ ③, 又 $a <$

$b < c, A < B < C$, 所以 $0^\circ < B < 90^\circ$, $\cos A > \cos C$, 故 $\cos(A+C) = -\cos B = -\frac{3}{4}$, 代入③式得 $x^2 = \frac{7}{4}$, 因此 $\cos A - \cos C = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

11. 【解析】(1) 因为 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - c = 0$, 利用正弦定理得: $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C - \sin B - \sin C = 0$, 因为 $\sin B = \sin(A+C)$, $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C - \sin(A+C) - \sin C = 0$, $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C - \sin A\cos C - \cos A\sin C - \sin C = 0$, 所以 $\sqrt{3}\sin A\sin C = \sin C + \cos A\sin C$, $\sqrt{3}\sin A = 1 + \cos A = 2\cos^2 \frac{A}{2}$, 而 $\sin A = 2\sin \frac{A}{2}\cos \frac{A}{2}$, 所以 $\tan \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 因为 $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{A}{2} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$; (2) 依题意, $b+c = 2\sqrt{3}$, $bc = 2$, 所以 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = (b+c)^2 - 2bc - bc = 12 - 6 = 6$, 所以 $a = \sqrt{6}$.

12. 【解析】(1) 由正弦定理得 $2\sin A\cos C = \sin B\cos C + \sin C\cos B$, 即 $2\sin A\cos C = \sin(B+C) = \sin A$, 由于 $\sin A \neq 0$, 故 $\cos C = \frac{1}{2}$, 又 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$; (2) 由于 $c = 2$, 三角形的周长为 6, 故 $a+b = 4$, 由余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = (a+b)^2 - 3ab$, 即 $4 = 16 - 3ab$, 故 $ab = 4$, 所以三角形的面积 $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

13. 【解析】(1) 由正弦定理得 $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C = \sin B + \sin C$, 所以 $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C = \sin(A+C) + \sin C$, 化简并整理得 $\sqrt{3}\sin A - \cos A = 1$, 即 $\sin(A-30^\circ) = \frac{1}{2}$, 所以 $A-30^\circ = 30^\circ$, 从而 $A = 60^\circ$; (2) 解法一: 由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$, 所以 $25 = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$, 又 $3bc \leq 3\left(\frac{b+c}{2}\right)^2$, 所以 $(b+c)^2 - 3bc \geq \frac{1}{4}(b+c)^2$, 即 $25 \geq \frac{1}{4}(b+c)^2$, 所以 $b+c \leq 10$, 从而 $a+b+c \leq 15$, 所以 $\triangle ABC$ 的周长的最大值为 15.

解法二: $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$, $b+c =$

$2R(\sin B + \sin C) = \frac{10\sqrt{3}}{3}[\sin B + \sin(A+B)] = \frac{10\sqrt{3}}{3}[\sin B + \sin(60^\circ + B)] = 10\sin(B+30^\circ)$, 当 $B = 60^\circ$ 时, $b+c$ 取得最大值 10, 所以 $\triangle ABC$ 的周长的最大值为 15.

专题2 三板斧之灵动面积周长公式

←←← 达标训练

1. C 【解析】由 $\frac{a^2 - (b-c)^2}{bc} = 1$ 得 $\frac{2bc(1 - \cos A)}{bc} = 1$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$. 故选 C.
2. D 【解析】由 $4\sqrt{3}S = (a+b)^2 - c^2$, 得 $4\sqrt{3} \times \frac{1}{4}[(a+b)^2 - c^2]\tan \frac{C}{2} = (a+b)^2 - c^2 \Rightarrow \tan \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow C = \frac{\pi}{3}$, 则 $\sin\left(C + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3}\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3}\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, 故选 D.
3. D 【解析】由三角形的面积 $S = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{12}$, 得 $\frac{1}{2}ab\sin C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{12}$, $S = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 - c^2)\tan C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{12}$ 所以 $\tan C = \frac{1}{3}$, 得 $\sin C = \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 因为 $A = \frac{2\pi}{3}$, $a = 2\sqrt{10}$, 所以由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 得 $c = \frac{a}{\sin A} \cdot \sin C = \frac{2\sqrt{10}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.
4. A 【解析】 $\triangle ABC$ 中, $b = 2, B = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{4}[(a+c)^2 - b^2]\tan \frac{B}{2} = \sqrt{3}$, 所以 $(a+c)^2 = 16$, 解得 $a+c = 4$. 故选 A.
5. C 【解析】因为 $c = 2\cos C (a\cos B + b\cos A) = 2c\cos C$, 解得: $\cos C = \frac{1}{2}$, 因为 $C = \frac{\pi}{3}$. 因为 $c = \sqrt{7}$, 所以由 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2} =$

$\frac{1}{4}[(a+b)^2 - c^2] \tan \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{3}}{12}[(a+b)^2 - 7]$, 解得: $a+b=5$, 所以 $\triangle ABC$ 的周长 $= a+b+c=5+\sqrt{7}$. 故选 C.

6. D 【解析】因为 $2S+a^2=(b+c)^2$, 所以 $2S = \frac{1}{2}[(b+c)^2 - a^2] \tan \frac{A}{2} = (b+c)^2 - a^2$, 所以 $\tan \frac{A}{2} = 2$, 所以 $\tan A = \frac{2 \tan \frac{A}{2}}{1 - \tan^2 \frac{A}{2}} = -\frac{4}{3}$, 则

$\sin A = \frac{4}{5}$, 故选 D.

7. 【解析】 $(a+b-c)(a+b+c) = 3ab$, 则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$, 整理得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$, 由于 $0 < C < \pi$, 解得 $C = \frac{\pi}{3}$. 由于 $c = 4$, 故 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 转换为 $16 \geq 2ab - ab = ab$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C \leq 4\sqrt{3}$. 故最大值为 $4\sqrt{3}$.

8. 【解析】 $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{A}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 所以 $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{2}$, 因为 $S = \frac{1}{4}[a^2 - (b-c)^2] \frac{1}{\tan \frac{A}{2}} = 5\sqrt{2}$, 所

以 $a^2 = 44$, 故 $a = 2\sqrt{11}$. 故答案为 $2\sqrt{11}$.

专题3 三板斧之万能辅助角公式

达标训练

1. B 【解析】解法一: 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{3}{5}$, $a = 4$, 所以 $\sin A = \frac{4}{5}$. 则 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{3}{5}$, 故 $b^2 + c^2 = 16 + \frac{6}{5}bc \geq 2bc$, 即 $bc \leq 20$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A \leq \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot \frac{4}{5} = 8$, 故选 B.

解法二: 若 $\cos A = \frac{3}{5}$, $a = 4$, 所以 $\cos \frac{A}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin A = \frac{4}{5}$, $2R = 5$, $b+c = 5(\sin B + \sin C) =$

$10 \cos \frac{A}{2} \sin\left(B + \frac{A}{2}\right)$, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4}[(b+c)^2 - a^2]$

$\tan \frac{A}{2} \leq \frac{1}{4}(80 - 16) \times \frac{1}{2} = 8$, 故选 B.

2. C 【解析】解法一: 因为 $BD = 2DC$, $\angle DAC =$

30° , $AD = 2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 所以 $\triangle ADC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 可得 $\frac{1}{2} AD \cdot AC \cdot \sin \angle DAC = \frac{1}{2} \times 2 \times AC \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, 所以解得 $AC = 2\sqrt{3}$, 因为在 $\triangle ACD$ 中, $CD^2 = 12 + 4 - 2 \times 2\sqrt{3} \times 2 \times \cos 30^\circ = 4$, 所以解得 $CD = 2$, 因为 $\angle DAC = 30^\circ$, $AD = 2$, $BD = 2DC$, 所以 $\angle C = 30^\circ$, $BD = 4$, 所以在 $\triangle ABC$ 中, $AB^2 = (2\sqrt{3})^2 + 6^2 - 2 \times 2\sqrt{3} \times 6 \times \cos 30^\circ = 12$, 解得 $AB = 2\sqrt{3}$. 故选 C.

解法二: 倍长定比分线, 如图, 作 $CE \parallel AB$ 交 AD 延长线于 E , 易知 $CE = \frac{1}{2} AB$, $AE = 3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 所以 $\triangle ADC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 可得: $\frac{1}{2} AD \cdot AC \cdot \sin \angle DAC = \frac{1}{2} \times 2 \times AC \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, 所以解得: $AC = 2\sqrt{3}$, 易知 $CE = \sqrt{3}$, $AB = 2\sqrt{3}$. 故选 C.

3. D 【解析】解法一: 因为由正弦定理可得: $\frac{b}{\sin B} =$

$\frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2$, 所以 $b+c = 2\sin B + 2\sin C =$

$2\sin B + 2\sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right) = 2\sin B + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos B + \frac{1}{2}\sin B\right)$

$= 3\sin B + \sqrt{3}\cos B = 2\sqrt{3}\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right)$, 因为 B, C

为锐角, $B+C = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, 可得

$B + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$, 所以 $\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \in$

$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$, 所以 $b+c = 2\sqrt{3}\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \in$

$(3, 2\sqrt{3}]$, 故选 D.

解法二: 根据万能辅助角公式: $b+c = 2R \cdot$

$2\cos \frac{A}{2} \sin\left(B + \frac{A}{2}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} \cos \frac{\pi}{6} \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right)$,

因为 B, C 为锐角, $B+C = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B \in$

$\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, 可得: $B + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$, 所以 $b + c = 2\sqrt{3}\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \in (3, 2\sqrt{3}]$, 故选 D.

4. C 【解析】解法一: 因为 $2a\sin C = \sqrt{3}c$, 所以由正弦定理得 $2\sin A\sin C = \sqrt{3}\sin C$, 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C \neq 0$. 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为三角形 ABC 是锐角三角形, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$. 由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, 所以 $1 = (b+c)^2 - 3bc$, 所以 $bc = \frac{(b+c)^2 - 1}{3}$. 因为 $b > 0, c > 0$, 所以 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, 所以 $(b+c)^2 \geq 4bc$. 所以 $bc = \frac{(b+c)^2 - 1}{3} \leq \frac{(b+c)^2}{4}$. 所以 $b+c \leq 2$, 当且仅当 $b=c=1$ 时等号成立. 所以 $\triangle ABC$ 周长 $a+b+c$ 的最大值为 $1+2=3$. 故选 C.

解法二: $a=1, \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据万能辅助角公式: $b+c = 2R \cdot 2\cos\frac{A}{2}\sin\left(B+\frac{A}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\frac{\pi}{6}\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right) \leq 2$, 所以 $\triangle ABC$ 周长 $a+b+c$ 的最大值为 $1+2=3$. 故选 C.

5. B 【解析】因为 $\triangle ABC$ 中, $S = \frac{1}{2}ab\sin C, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, 且 $a^2 + b^2 - c^2 = 4\sqrt{3}S$, 所以 $2ab\cos C = 4\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times ab\sin C$, 解得: $\tan C = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $C = \frac{\pi}{6}$, 因为 $c=1$, 所以 $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} = \frac{1}{2} = 2$, 可得 $a = 2\sin A, b = 2\sin B = 2\sin\left(\frac{5\pi}{6} - A\right), \sqrt{3}b - a = 2\sqrt{3}\sin B - 2\sin A = 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{5\pi}{6} - A\right) - 2\sin A = 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\cos A + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin A\right) - 2\sin A = \sqrt{3}\cos A + \sin A = 2\sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) \leq 2$, 可得 $\sqrt{3}b - a$ 的最大值为 2. 故选 B.

6. D 【解析】解法一: $\triangle ABC$ 中, $AB=2, C = \frac{\pi}{6}$, 则 $2R = \frac{AB}{\sin C} = 4$, 则 $AC + \sqrt{3}BC = 4\sin B + 4\sqrt{3}\sin A =$

$4\sin\left(\frac{5\pi}{6} - A\right) + 4\sqrt{3}\sin A = 2\cos A + 6\sqrt{3}\sin A = 4\sqrt{7}\sin(A + \theta)$, 由于: $0 < A < \frac{5\pi}{6}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < A + \theta < \frac{4\pi}{3}$, 所以最大值为 $4\sqrt{7}$. 故选 D.

解法二: 根据万能辅助角公式: $AC + \sqrt{3}BC = b + \sqrt{3}a = 2R \cdot \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\cos C + 1}\sin(A + \varphi) \leq 4\sqrt{7}$. 故选 D.

7. 【解析】由 $a^2 + c^2 - b^2 = \sqrt{2}ac$, 可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\sqrt{2}ac}{2ac} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 可得 $B = \frac{\pi}{4}$, 根据正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B} = 2$, 可得 $a = 2\sin A, c = 2\sin C$, 可得 $\sqrt{2}a + c = 2\sqrt{2}\sin A + 2\sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) = 3\sqrt{2}\sin A + \sqrt{2}\cos A = 2\sqrt{5}\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\sin A + \frac{1}{\sqrt{10}}\cos A\right)$, 令 $\sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}, \cos\varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}$, 可知 $\varphi \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$, 所以 $\sqrt{2}a + c = 5\sqrt{2}\sin(A + \varphi)$, 又因为 $A \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $A + \varphi \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$, 由于 φ 是一个确定值, 可得 $\sqrt{2}a + c = 5\sqrt{2}\sin(A + \varphi) \in (4, 2\sqrt{5}]$. 故答案为 $(4, 2\sqrt{5}]$.

8. 【解析】因为 $S = \frac{1}{2}ac\sin B, \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 所以 $\frac{1}{2}ac\sin B = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2accosB$, 所以 $\tan B = \sqrt{3}$, 又 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$; 又 $b = \sqrt{3}, \triangle ABC$ 的内角和 $A + B + C = \pi$, 又 $A > 0, C > 0$, 得 $0 < A < \frac{2\pi}{3}$, 由正弦定理, 知 $a = \frac{b \cdot \sin A}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}\sin A}{\sin\frac{\pi}{3}} = 2\sin A, c = \frac{b \cdot \sin C}{\sin B} = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right)$, 所以 $(\sqrt{3} - 1)a + 2c = 2(\sqrt{3} - 1)\sin A + 4\sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = 2\sqrt{3}\sin A + 2\sqrt{3}\cos A = 2\sqrt{6}\sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) \left(0 < x < \frac{2\pi}{3}\right)$, 所以 $\frac{\pi}{4} < A + \frac{\pi}{4}$

$< \frac{11\pi}{12}$, 又 $\sin \frac{11\pi}{12} = \sin \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$,
所以 $\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1) < \sin \left(A + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1$, 所以 $3 - \sqrt{3} < 2\sqrt{6} \sin \left(A + \frac{\pi}{4} \right) \leq 2\sqrt{6}$. 故答案为 $(3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{6})$.

9. 【解析】倍长定比分线, 如图, 作 $CE \parallel AB$ 交 AD 延长线于 E , 易知 $CE = 2AB = 2c$, $AE = 6$, $\angle ACE = 120^\circ$, 根据余弦定理: $AE^2 = b^2 + 4c^2 - 2b \cdot 2c \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow b^2 + 4c^2 + 2bc = 36$, $S_{\triangle ABC} = \frac{3}{2} S_{\triangle ADC} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} S_{\triangle AEC} = \frac{1}{2} S_{\triangle AEC}$, 故只需求 $S_{\triangle AEC}$ 最大值, $36 = b^2 + 4c^2 + 2bc \geq 4bc + 2bc = 6bc \Rightarrow bc \leq 6$, $S_{\triangle AEC} = \frac{1}{2} \times 2bc \times \sin 120^\circ \leq 3\sqrt{3}$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} S_{\triangle AEC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 故答案为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

10. 【解析】因为 $a = 2$, $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, 所以由正弦定理可得: $\sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B \cos A$, 因为 $\sin B > 0$, 所以 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$, 可得 $\tan A = \sqrt{3}$, 因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$, 所以由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 可得 $4 = b^2 + c^2 - bc \geq 2bc - bc = bc$, 当且仅当 $b = c$ 时等号成立, 所以由 $4 = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$, 可得: $(b+c)^2 = 4 + 3bc \leq 4 + 3 \times 4 = 16$, 即 $b+c \leq 4$, 当且仅当 $b = c$ 时等号成立, 所以 $\triangle ABC$ 周长 $a + b + c \leq 2 + 4 = 6$, 即其最大值为 6. 故答案为 6.

11. 【解析】(1) 因为 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$. 则 $\sin^2 B + \sin^2 C - 2\sin B \sin C = \sin^2 A - \sin B \sin C$, 所以由正弦定理得: $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, 所以 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$, 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$; (2) 因为 $\sqrt{2}a + b = 2c$, $A = \frac{\pi}{3}$, 所以由正弦定理得 $\sqrt{2} \sin A + \sin B =$

$2\sin C$, 所以 $\frac{\sqrt{6}}{2} + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - C \right) = 2\sin C$, 解得 $\sin \left(C - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $C - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}$, $C = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$, 所以 $\sin C = \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

12. 【解析】(1) 因为 $a = 2$, $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = \sqrt{3}$, 因为 $a > b \geq c$, 所以 $A = \frac{2\pi}{3}$, 所以由正弦定理可得 $\sin B = \frac{b \cdot \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{3}{4}$, 因为 $a > b \geq c$, 可得 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 所以 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{7}}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{21} - 3}{8}$, 所以 $\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$, 所以 $c = \frac{\sqrt{21} - 3}{8} \times \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7} - 3\sqrt{3}}{8}$; (2) 因为 $a = 2$, $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 所以 $b - c = \frac{4\sqrt{3}}{3} (\sin B - \sin C) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin B - \frac{4\sqrt{3}}{3}$. $\sin \left(\frac{\pi}{3} - B \right) = 2\sqrt{3} \sin B - 2\cos B = 4\sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right)$, 因为 $\frac{\pi}{6} \leq B < \frac{\pi}{3}$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in \left[0, \frac{\pi}{6} \right)$, 所以 $\sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) \in \left[0, \frac{1}{2} \right)$, 所以 $b - c \in [0, 2)$.
13. 【解析】(1) 因为 $a = \sqrt{2} b \sin \left(C + \frac{\pi}{4} \right) = b \sin C + b \cos C$, 所以由正弦定理可得: $\sin A = \sin B \cos C + \sin C \sin B$, 所以 $\sin(B+C) = \sin B \cos C + \sin C \sin B$, 可得: $\cos B \sin C = \sin C \sin B$, 因为 $\sin C \neq 0$, 所以 $\cos B = \sin B$, 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{4}$; (2) 因为 $B = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sqrt{2} \sin A - \sin C = \sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{4} - C \right) - \sin C = \cos C$, 又因为 $0 < C <$

$\frac{3\pi}{4}$, 且 $y = \cos C$ 在 $(0, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递减, 所以

$\sqrt{2}\sin A - \sin C$ 的取值范围是 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$.

14. 【解析】(1) 由于 $\sin A + \sqrt{2}\sin B = 2\sin C$, 根据万能辅助角公式: $\sin(B+C) + \sqrt{2}\sin B = \sqrt{2+2\sqrt{2}\cos C+1}\sin(B+\varphi) = 2\sin C$, 所以 $\sqrt{3+2\sqrt{2}\cos C} \geq 2\sin C$, 即 $4\cos^2 C + 2\sqrt{2}\cos C - 1 \geq 0 \Rightarrow \cos C \geq \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; (2) $\sin A + \lambda\sin B = 2\sin C$ ($\lambda > 0$) $\Rightarrow \sqrt{\lambda^2+2\lambda\cos C+1} \geq 2\sin C$ 恒成立, 故此不等式变形为 $4\cos^2 C + 2\lambda\cos C + \lambda^2 - 3 \geq 0 \Rightarrow (2\cos C + \frac{\lambda}{2})^2 + \frac{3}{4}(\lambda^2 - 4) \geq 0$ 恒成立, 故只需 $\lambda \geq 2$, 由于 $\lambda = 2$ 时, $\cos C = -\frac{1}{2}$, 等号成立, 此时 $\sin A + 2\sin B = 2\sin C \Rightarrow \sqrt{3}\sin(B+\varphi) = 2\sin C = \sqrt{3}(\tan\varphi = \frac{\sin C}{\cos C+2} = \frac{\sqrt{3}}{3})$, 此时 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$, 此时 $B+C = \pi$ 显然矛盾, 故 $\lambda \neq 2$, 所以 $\lambda > 2$. 注意: 临界条件是否取等, 需要验算.

专题4 三板斧之米勒定理

达标训练

1. C 【解析】因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, $a^2+b^2-c^2 = 2ab\cos C \Rightarrow ab = \frac{a^2+b^2-c^2}{2\cos C}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4}\tan C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4} \Rightarrow C = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \cos C$, 故选 C.
2. C 【解析】因为 $c^2 = (a-b)^2 + 6$, 所以 $6 = 2ab(1 - \cos C) = 2ab(1 - \frac{1}{2}) \Rightarrow ab = 6$, 则 $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 故选 C. (采用灵动双曲线焦点三角形面积公式 $S = \frac{1}{4}[c^2 - (a-b)^2] \frac{1}{\tan \frac{C}{2}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 可以一步秒杀)
3. A 【解析】因为 $\triangle ABC$ 的边 a, b, c 满足 $(a+b)^2 - c^2 = 4 = 2ab(1 + \cos C)$, $C = 60^\circ$, 所

以 $ab = \frac{4}{3}$, 故选 A.

4. D 【解析】 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, C = \frac{\pi}{6}$, 则 $2R = \frac{AB}{\sin C} = 4$, 则 $AC + \sqrt{3}BC = 4\sin B + 4\sqrt{3}\sin A = 4\sin(\frac{5\pi}{6} - A) + 4\sqrt{3}\sin A = 2\cos A + 6\sqrt{3}\sin A = 4\sqrt{7}\sin(A+\theta)$, 由于 $0 < A < \frac{5\pi}{6}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 所以 $0 < A+\theta < \frac{4\pi}{3}$, 所以最大值为 $4\sqrt{7}$. 故选 D. 秒杀解法: 利用万能辅助角公式: $AC + \sqrt{3}BC = b + \sqrt{3}a \leq 2R\sqrt{3+2\sqrt{3}\cos C+1} = 4\sqrt{7}$.
5. 【解析】因为 $2b\cos B = a\cos C + c\cos A \Rightarrow 2b\cos B = b$, 所以 $\cos B = \frac{1}{2}$, 因为 $0 < B < \pi$ 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 故答案为 $\frac{\pi}{3}$.
6. 【解析】将 $b\cos C + c\cos B = a = 2b \Rightarrow \frac{a}{b} = 2$. 故答案为 2.
7. 【解析】由已知条件 $(a+b-c)(a+b+c) = ab$ 可得 $a^2 + b^2 - c^2 + 2ab = ab$ 即 $a^2 + b^2 - c^2 = -ab$. 由余弦定理得: $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$, 又因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3}$. 故答案为 $\frac{2\pi}{3}$.
8. 【解析】 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2+c^2-b^2) = \frac{1}{4}(a^2+c^2-b^2)\tan B$, 可得 $\tan B = \sqrt{3}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}, \angle C$ 为钝角, $A \in (0, \frac{\pi}{6}), \frac{1}{\tan A} \in (\sqrt{3}, +\infty)$. $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin(A+B)}{\sin A} = \cos B + \frac{1}{\tan A}\sin B = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\tan A} \in (2, +\infty)$. 故答案为 $(2, +\infty)$.
9. 【解析】因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4} \Rightarrow \tan \frac{A}{2} = \frac{\sin A}{1 + \cos A} = \frac{\sqrt{15}}{3}$, 采用灵动双曲线焦点三角形面积公式 $S = \frac{1}{4}[a^2 - (b-c)^2] \frac{1}{\tan \frac{A}{2}} = 3\sqrt{15} \Rightarrow a^2 - 4 = 60$, 解得 $a = 8$. 故答案为 8.
10. 【解析】由正弦定理得 $a + \sqrt{2}b = 2c$, 得 $c = \frac{1}{2}(a +$

$$\sqrt{2}b), \text{由余弦定理得 } \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} =$$

$$\frac{a^2 + b^2 - \frac{1}{4}(a + \sqrt{2}b)^2}{2ab} = \frac{\frac{3}{4}a^2 + \frac{1}{2}b^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}ab}{2ab} =$$

$$\frac{\frac{3}{4}a^2 + \frac{1}{2}b^2}{2ab} - \frac{\sqrt{2}}{4} \geq \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}b}{2ab} - \frac{\sqrt{2}}{4} =$$

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}, \text{当且仅当 } \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2}b \text{ 时, 取等号, 故}$$

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \leq \cos C < 1, \text{故 } \cos C \text{ 的最小值是}$$

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \text{故答案为 } \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

秒杀解法: 根据万能辅助角公式 $\sin A + \sqrt{2}\sin B = 2\sin C \Rightarrow \sin(B+C) + \sqrt{2}\sin B = 2\sin C \leq \sqrt{2+2\sqrt{2}\cos C+1}$, 平方得: $4\sin^2 C \leq 3+2\sqrt{2}\cos C \Rightarrow 4\cos^2 C + 2\sqrt{2}\cos C - 1 \geq 0 \Rightarrow \cos C \geq \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 或 $\cos C \leq \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (舍).

11. 【解析】由 $a+b > 2c$, 即 $c < \frac{a+b}{2}$, 由余弦定理和基本不等式知: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > \frac{a^2 + b^2 - \frac{(a+b)^2}{2}}{2ab} = \frac{3(a^2 + b^2) - 2ab}{8ab} \geq \frac{6ab - 2ab}{8ab} = \frac{1}{2}$, 故 $0 < C < \frac{\pi}{3}$. 故答案为 $(0, \frac{\pi}{3})$.

秒杀解法: $a+b > 2c \Rightarrow \sin A + \sin B = \sqrt{2+2\cos C}$, $\sin(A+\varphi) > 2\sin C \Rightarrow 2\cos^2 C + \cos C - 1 > 0$, 即 $(2\cos C - 1)(\cos C + 1) > 0 \Rightarrow \cos C > \frac{1}{2}$ 或 $\cos C < -1$, 故 $\cos C > \frac{1}{2} \Rightarrow C \in (0, \frac{\pi}{3})$.

12. 【解析】因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $b = \sqrt{3}$, 所以由正弦定理可得: $\frac{b}{\sin B} = 2$, 可得: $a = 2\sin A$, $c = 2\sin C = 2\sin(\frac{2\pi}{3} - A)$, 所以 $3a + c = 6\sin A + 2\sin(\frac{2\pi}{3} - A) = 6\sin A + \sqrt{3}\cos A + \sin A = 2\sqrt{13}\sin(A+\varphi)$, 其中 $\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{7}$, 所以 $3a + c$ 的最大值为 $2\sqrt{13}$. 故答案为 $2\sqrt{13}$.
秒杀解法: 利用万能辅助角公式(公式四): c

$$+ 3a \leq 2R\sqrt{9+6\cos B+1} = 2\sqrt{13}.$$

13. 【解析】利用万能辅助角公式: $2\sqrt{2}|AB| + 3|AC| = 2\sqrt{2}(c + \frac{3\sqrt{2}}{4}b) \leq 4\sqrt{2}R$.
 $\sqrt{\frac{9}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\cos A + 1}$, 由于 $\cos A = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $2R = \sqrt{2}$, 代入得 $2\sqrt{2}|AB| + 3|AC| = 2\sqrt{2}(c + \frac{3\sqrt{2}}{4}b) \leq 4\sqrt{\frac{5}{8}} = \sqrt{10}$.

14. 【解析】如图, 直接讲重点, $|AE| = 3\sqrt{7}$, $|CE| = \frac{1}{2}|AB|$, $|AC| = 6$, $\angle ACE = 120^\circ$. 根据余弦定理可求 $|AC|^2 + |CE|^2 - 2|AC| \cdot |CE|\cos 120^\circ = |AE|^2$, 解得 $|CE| = 3 \Rightarrow |AB| = 6$. 故答案为 6.

15. 【解析】如图, 易求得 $\cos \angle ABC = \frac{1}{4}$, $|BE| = 4\sqrt{2}$, $|CE| = 3|AB|$, $\cos \angle BCE = -\frac{1}{4} \Rightarrow \sin \angle BCE = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $3AB + BC = 2R$.
 $2\cos \frac{\angle BCE}{2} \sin(\angle E + \frac{\angle BCE}{2}) \leq \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{15}} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{16\sqrt{5}}{5}$. 故答案为 $\frac{16\sqrt{5}}{5}$.

16. 【解析】(1) 证明: 在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} = \frac{\sin C}{c} \Rightarrow b\cos A + a\cos B = \frac{ab\sin C}{c} = \frac{ab}{2R}$, 所以由正弦定理得 $\cos A\sin B + \cos B\sin A = \sin A\sin B$, 因为 $\sin(A+B) = \sin C$. 所以整理可得: $\sin A\sin B = \sin C$; (2) 解 $b^2 + c^2 - a^2 = \frac{6}{5}bc$, 由

余弦定理可得 $\cos A = \frac{3}{5}$, $\sin A = \frac{4}{5}$, $\frac{\cos A}{\sin A} = \frac{3}{4}$, $\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\sin C}{\sin C} = 1$, $\frac{\cos B}{\sin B} = \frac{1}{4}$, $\tan B = 4$.

17. 【解析】(1) 因为在 $\triangle ABC$ 中, $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C \neq 0$, $2\cos C(\sin A\cos B + \sin B\cos A) = \sin C$, 整理得: $2\cos C\sin(A+B) = \sin C$, 即 $2\cos C\sin[\pi - (A+B)] = \sin C$, $2\cos C\sin C = \sin C$, 所以 $\cos C = \frac{1}{2}$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$; (2) 由余弦定理得 $7 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \frac{1}{2}$, 所以 $(a+b)^2 - 3ab = 7$, 因为 $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}ab = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 所以 $ab = 6$, 所以 $(a+b)^2 - 18 = 7$, 所以 $a+b = 5$, 所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $5 + \sqrt{7}$.

18. 【解析】(1) 由正弦定理得: $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - c = 0$, 即 $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C = \sin B + \sin C$, 所以 $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C = \sin(A+C) + \sin C$, 即 $\sqrt{3}\sin A - \cos A = 1$, 所以 $\sin(A-30^\circ) = \frac{1}{2}$, 所以 $A = 60^\circ$; (2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 的面积 = $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}bc = \sqrt{3}$, 所以 $bc = 4$ ①, 再利用余弦定理可得: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = (b+c)^2 - 3bc = (b+c)^2 - 3 \times 4 = 4$, 所以 $b+c = 4$ ②, 结合①②求得 $b = c = 2$.

19. 【解析】(1) $3a\cos A = c\cos B + b\cos C \Rightarrow 3\sin A\cos A = \sin C\cos B + \sin B\cos C = \sin A$; 得 $\cos A = \frac{1}{3}$; 因为 $\cos A = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos B = -\cos(A+C) = -\cos A\cos C + \sin A\sin C = -\frac{1}{3}\cos C + \frac{2\sqrt{2}}{3}\sin C$, 已知 $\cos B + \cos C = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\cos C + \sqrt{2}\sin C = \sqrt{3}$, 与 $\cos^2 C + \sin^2 C = 1$, 联立解得 $\sin C = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 已知 $a = 1$, 再根据正弦定理: $c = \frac{a\sin C}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

20. 【解析】(1) 根据题意, $b\cos A + a\cos B = 2c\cos B + 2b\cos C$, 由正弦定理设 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 则整理求得 $\sin(A+B) = 2\sin(B+C)$, 又 $A +$

$B + C = \pi$, 所以 $\sin C = 2\sin A$, 即 $\frac{\sin C}{\sin A} = 2$;

(2) 由余弦定理可知 $a^2 + c^2 - b^2 = 2accosB \Rightarrow (a+c)^2 - b^2 = 2ac(1+\cos B)$; 由(1)可知 $\frac{\sin C}{\sin A} = \frac{c}{a} = 2$. 再由 $b = 2$, 联立求得 $c = 2$, $a = 1$,

$\sin B = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 所以 $S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

21. 【解析】(1) $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$, 所以 $\sin B = 4(1 - \cos B)$, 因为 $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$, 所以 $16(1 - \cos B)^2 + \cos^2 B - 1 = 0$, 所以 $(17\cos B - 15)(\cos B - 1) = 0$, 所以 $\cos B = \frac{15}{17}$;

(2) 由(1)可知 $\sin B = \frac{8}{17}$, 因为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = 2$, 所以 $ac = \frac{17}{2}$, 所以 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB = a^2 + c^2 - 2 \times \frac{17}{2} \times \frac{15}{17} = a^2 + c^2 - 15 = (a+c)^2 - 2ac - 15 = 36 - 17 - 15 = 4$, 所以 $b = 2$.

22. 【解析】(1) 因为在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + c^2 = b^2 + \sqrt{2}ac$. 所以 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\sqrt{2}ac}{2ac} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{4}$;

(2) 由(1)得 $C = \frac{3\pi}{4} - A$, 所以 $\sqrt{2}\cos A + \cos C = \sqrt{2}\cos A + \cos\left(\frac{3\pi}{4} - A\right) = \sqrt{2}\cos A - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos A + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos A + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin A = \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $A \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$, 所以 $A + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$, 故当 $A + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$ 取最大值 1, 即 $\sqrt{2}\cos A + \cos C$ 的最大值为 1.

23. 【解析】(1) 由已知得: $-\cos(A+B) + \cos A\cos B - \sqrt{3}\sin A\cos B = 0$, 即 $\sin A\sin B - \sqrt{3}\sin A\cos B = 0$, 因为 $\sin A \neq 0$, 所以 $\sin B - \sqrt{3}\cos B = 0$, 即 $\tan B = \sqrt{3}$, 又 B 为三角形的内角, 则 $B = \frac{\pi}{3}$; (2) 因为 $a + c = 1$, $\cos B = \frac{1}{2}$, 所以由余弦定理得: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B \Rightarrow (a+c)^2 - b^2 = 2ac(1+\cos B) = 3ac$, 即 $b^2 = 1 -$

$3ac < 1$, 且 $(a+c)^2 - 3ac \geq (a+c)^2 - 3\left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{4} \leq b^2 < 1$, 则 $\frac{1}{2} \leq b < 1$.

解法二: $a+c=1=2R(\sin A+\sin C)=2R(\sin A+\sin(A+B))=2\sqrt{3}R\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right) \in (\sqrt{3}R, 2\sqrt{3}R]$, 故 $b=2R\sin B \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$.

24. 【解析】(1) 由已知和正弦定理得 $\sin A = \sin B \cos C + \sin B \sin C$, 因为 $\sin A = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$, 所以 $\sin B = \cos B$, 即 $\tan B = 1$, 因为 B 为三角形的内角, 所以 $B = \frac{\pi}{4}$;

(2) $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{2}}{4}ac$, 由已知及余弦定理得: $4 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \frac{\pi}{4} \geq 2ac - 2ac \times \frac{\sqrt{2}}{2}$,

整理得: $ac \leq \frac{4}{2-\sqrt{2}}$, 当且仅当 $a=c$ 时, 等号

成立, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1$.

25. 【解析】(1) 因为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times a \times \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $a=2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C =$

13. 所以 $c = \sqrt{13}$; (2) 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} =$

$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 所以 $a = \frac{b \sin A}{\sin B} = 2 \sin A$, $c = \frac{b \sin C}{\sin B} = 2 \sin C$, 所以 $2a - c = 4 \sin A - 2 \sin C = 4 \sin\left(\frac{2\pi}{3} - C\right) - 2 \sin C = 4\left(\sin \frac{2\pi}{3} \cos C - \cos \frac{2\pi}{3} \sin C\right) -$

$2 \sin C = 2\sqrt{3} \cos C$. 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 < C < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $-\frac{1}{2} < \cos C < 1$, 所以 $-\sqrt{3} < 2\sqrt{3} \cos C <$

$2\sqrt{3}$, 所以 $2a - c$ 的取值范围为 $(-\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.

26. 【解析】(1) 因为 $a^2 + b^2 = ab + c^2$, 即 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$, 所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$, 所以 $\angle C = 60^\circ$; (2) 因为 $c=1$, 由正弦定理可得

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $b =$

$\frac{2\sqrt{3}}{3} \sin B$, $a = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin A$, 所以 $\frac{1}{2}b + a = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B$

$+ \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin A = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) + \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin A =$

$\frac{\sqrt{3}}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos A + \frac{1}{2} \sin A + 2 \sin A\right) = \frac{\sqrt{21}}{3} \sin(A +$

$\varphi)$, 其中 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, $\tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{5}$, 所以当

$\sin(A + \varphi) = 1$ 时, $\frac{1}{2}b + a$ 取最大值 $\frac{\sqrt{21}}{3}$.

27. 【解析】(1) 因为 $(a+b) \sin A = 2b \sin(A+C) = 2b \sin(A+C) = 2b \sin B$, 所以由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} =$

$\frac{b}{\sin B}$, 可得 $a(a+b) = 2b^2$, 整理可得 $(a+2b)$

$(a-b) = 0$, 因为 $a+2b > 0$, 所以 $a=b$, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 得证; (2) 设 $BD = x$,

则 $AD = 2x$, 由余弦定理可得: $\cos \angle CDA = \frac{4x^2 + 17 - 25}{2 \times 2x \times \sqrt{17}}$, $\cos \angle CDB = \frac{x^2 + 17 - 25}{2 \times x \times \sqrt{17}}$, 因为

$\angle CDA = \angle CDB$, 所以 $\frac{4x^2 + 17 - 25}{2 \times 2x \times \sqrt{17}} =$

$-\frac{x^2 + 17 - 25}{2 \cdot x \cdot \sqrt{17}}$, 解得 $x=2$, 所以 $AB=6$.

28. 【解析】(1) 由 $(2b-c) \cos A = a \cos C$, 得 $2 \sin B \cdot \cos A = \sin A \cdot \cos C + \sin C \cos A$, 则 $2 \sin B \cdot \cos A = \sin(A+C) = \sin B$, 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B \neq 0$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 又因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$;

(2) 解法一: 由于点 D 满足 $\vec{AD} = 2\vec{AC}$, 且 $BD = 3$, 所以 C 为线段 AD 的中点, 则在 $\triangle ABD$ 中, $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos A$, 整理得: $9 = (AB + BD)^2 - 3AB \cdot BD$, 由于 $AB \cdot BD \leq \left(\frac{AB + BD}{2}\right)^2$, 则: $9 \geq \frac{3}{4}(c+2b)^2 + (c+2b)^2$,

所以 $c+2b \leq 6$, 由于 $c+2b > 3$, 所以 $3 < c+2b \leq 6$, 即 $2b+c$ 的取值范围为 $(3, 6]$

(2)解法二: 如图, 在 $\triangle ABD$ 中, $2R = \frac{|BD|}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$, 根据万能辅助角(中间过程请读者自己完成, 老唐只给思路) $2b + c = |AD| + |AB| = 2R \cdot \cos 30^\circ \sin(\angle D + 30^\circ) = 6\sin(\angle D + 30^\circ) \in (3, 6]$, 当 $\angle D = 60^\circ$ 时等号成立.

29. 【解析】(1) $\frac{H}{AD} = \tan\beta \Rightarrow AD = \frac{H}{\tan\beta}$, 同理 $AB = \frac{H}{\tan\alpha}$, $BD = \frac{h}{\tan\beta}$, $AD - AB = DB$, 故得 $\frac{H}{\tan\alpha} - \frac{H}{\tan\beta} = \frac{h}{\tan\beta}$, 得 $H = \frac{h \tan\alpha}{\tan\alpha - \tan\beta} = \frac{4 \times 1.24}{1.24 - 1.20} = 124$; (2) 由题设知 $d = AB$, 得 $\tan\alpha = \frac{H}{d}$, $\tan\beta = \frac{H}{AD} = \frac{h}{DB} = \frac{H-h}{d}$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{\frac{H}{d} - \frac{H-h}{d}}{1 + \frac{H}{d} \cdot \frac{H-h}{d}} = \frac{hd}{d^2 + H(H-h)} = \frac{h}{d + \frac{H(H-h)}{d}}$ $d + \frac{H(H-h)}{d} \geq 2\sqrt{H(H-h)}$ (当且仅当 $d = \sqrt{H(H-h)} = \sqrt{125 \times 121} = 55\sqrt{5}$ 时, 取等号), 故当 $d = 55\sqrt{5}$ 时, $\tan(\alpha - \beta)$ 最大. 因为 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 则 $0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以当 $d = 55\sqrt{5}$ 时, $\alpha - \beta$ 最大.

秒杀解法: 先证一下米勒定理, 模仿前面例题解析框里面的证明过程, 再根据米勒定理可得, 当仅当过点 B, D 的圆与射线 AE 切于 E 点时, $\alpha - \beta$ 最大, 此时 $|AE| = \sqrt{|AB| |AD|} \Rightarrow d = 55\sqrt{5}$.

30. 【解析】如图 2 所示, 建立平面直角坐标系, 则 $A(200, 0), B(0, 220), C(0, 300)$. 直线 l 的方程为 $y = (x - 200)\tan\alpha$, 即 $y = \frac{x - 200}{2}$. 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则 $P\left(x, \frac{x - 200}{2}\right)$ ($x > 200$) 由经过两点的直线的斜率公式 $k_{PC} = \frac{\frac{x - 200}{2} - 300}{x} = \frac{x - 800}{2x}$, $k_{PB} = \frac{\frac{x - 200}{2} - 220}{x} = \frac{x - 640}{2x}$. 由直线 PC 到直线 PB 的角的公式得 $\tan \angle BPC = \frac{k_{PB} - k_{PC}}{1 + k_{PB}k_{PC}} = \frac{\frac{160}{2x}}{1 + \frac{x - 800}{2x} \cdot \frac{x - 640}{2x}} =$

$$\frac{64x}{x^2 - 288x + 160 \times 640} = \frac{64}{x + \frac{160 \times 640}{x} - 288} \quad (x > 200).$$

要使 $\tan \angle BPC$ 达到最大, 只须 $x + \frac{160 \times 640}{x} - 288$ 达到最小. 由均值不等式 $x + \frac{160 \times 640}{x} - 288 \geq 2\sqrt{160 \times 640} - 288$. 当且仅当 $x = \frac{160 \times 640}{x}$ 时上式取等号. 故当 $x = 320$ 时 $\tan \angle BPC$ 最大. 这时, 点 P 的纵坐标为 $y = \frac{320 - 200}{2} = 60$. 由此实际问题知, $0 < \angle BPC < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\tan \angle BPC$ 最大时, $\angle BPC$ 最大. 故当此人距水平地面 60 米高时, 观看铁塔的视角 $\angle BPC$ 最大.

秒杀解法: 当且仅当过点 B, C 的圆与直线 l 切于第一象限 P 点时, $\angle BPC$ 最大, 此时设直线 l 与 y 轴的负半轴交点为 D , 根据米勒定理可得 $DP = \sqrt{|DB| |DC|} = 160\sqrt{5} \Rightarrow |DA| = 160\sqrt{5}$, $|PA| = 60\sqrt{5}$, 点 P 纵坐标为 60.

31. 【解析】(1) 作 $CD \perp AO$ 于 D , 则 $CD = x = \sqrt{3}$, 在直角 $\triangle CDO$ 中, $DO = \frac{\sqrt{3}}{3}x = 1$, $\tan \angle BCD = \frac{BO - OD}{CD} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan \angle ACD = \frac{AO - OD}{CD} = \sqrt{3}$, 因 $\angle BCD, \angle ACD$ 都为锐角, 所以 $\angle BCD = 30^\circ, \angle ACD = 60^\circ$, 所以 $\tan\theta = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) 设 $\angle BCD = \alpha, \angle ACD = \beta$. 做如下规定: 当 D 点在 B 点下方时 α 为正, 当 D 点在 B 点上方时 α 为负, 当 D 点与 B 重合时 α 为零. 类似地 β 也如此规定. 于是有 $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \theta =$

$$\beta - \alpha, \tan\alpha = \frac{BO - OD}{CD} = \frac{2 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x}, \tan\beta = \frac{AO - OD}{CD} = \frac{4 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x} \quad \tan\theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{4 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x} - \frac{2 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x} = \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta \cdot \tan\alpha} = \frac{4 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x} - \frac{2 - \frac{\sqrt{3}}{3}x}{x} =$$

$$\frac{\frac{2}{\frac{4}{3}x + \frac{8}{x} - 2\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}-3}} \leq \frac{\frac{2}{2\sqrt{\frac{4}{3}x \cdot \frac{8}{x} - 2\sqrt{3}}}}{\frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}-3}} =$$

最大, 从而 θ 最大, 此时 C 点离墙 $\sqrt{6}$ m.

秒杀解法: 先证一下米勒定理, 再根据米勒定理可得, 当仅当过点 A, B 的圆与射线 DC 切于 C 点时, $\beta - \alpha$ 最大, 此时 $OC^2 = |OB| \cdot |OA|$, $\left(\frac{CO}{\cos 30^\circ}\right)^2 = |BO| \cdot |AO| = 8$, 即 $|CD| = \sqrt{6}$.

32. 【解析】(1) 如图, 作 $CD \perp AF$ 于 D , 则 $CD = EF$, 设 $\angle ACD = \alpha$, $\angle BCD = \beta$, $CD = x$, 则 $\theta = \alpha - \beta$, 在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 和 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中, $\tan \alpha = \frac{2.5}{x}$, $\tan \beta = \frac{0.5}{x}$, 则 $\tan \theta = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{2x}{x^2 + 1.25}$, 令 $u = \frac{2x}{x^2 + 1.25}$, 则 $ux^2 - 2x + 1.25u = 0$, 因为上述方程有大于 0 的实数根, 所以 $\Delta \geq 0$ 即 $4 - 4 \times 1.25u^2 \geq 0$, 所以 $u \leq \sqrt{\frac{1}{1.25}}$, 即 $(\tan \theta)_{\max} = \sqrt{\frac{1}{1.25}}$, 因为正切函数 $y = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上是增函数, 所以视角 θ

同时取得最大值, 此时, $x = \frac{2}{2u} = \sqrt{1.25}$, 所以观察者离墙 $\sqrt{1.25}$ 米远时, 视角 θ 最大;

$$(2) \text{ 由 (1) 可知, } \tan \theta = \frac{1}{2} = \frac{\frac{4-a}{x} - \frac{2-a}{x}}{1 + \frac{4-a}{x} \cdot \frac{2-a}{x}} =$$

$$\frac{2x}{x^2 + 8 - 6a + a^2}, \text{ 即 } x^2 - 4x + 4 = -a^2 + 6a - 4,$$

所以 $(x-2)^2 = -(a-3)^2 + 5$, 因为 $1 \leq a \leq 2$, 所以 $1 \leq (x-2)^2 \leq 4$, 化简得: $0 \leq x \leq 1$ 或 $3 \leq x \leq 4$, 又因为 $x > 1$, 所以 $3 \leq x \leq 4$.

33. 【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b >$

$0)$, 半焦距为 c , 则 $|MA_1| = \frac{a^2}{c} - a$,

$|A_1F_1| = a - c$. 由题意, 得

$$\begin{cases} \frac{a^2}{c} - a = 2(a - c) \\ 2a = 4 \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases}, \text{ 所以 } a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1.$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) 设 $P(m, y_0)$, $|m| > 1$, 当 $y_0 = 0$ 时, $\angle F_1PF_2 = 0$; 当 $y_0 \neq 0$ 时, $0 < \angle F_1PF_2 < \angle PF_1M < \frac{\pi}{2}$, 所以只需求 $\tan \angle F_2PF_2$

的最大值即可. 设直线 PF_1 的斜率 $k_1 = \frac{y_0}{m+1}$, 直

线 PF_2 的斜率 $k_2 = \frac{y_0}{m-1}$, 所以 $\tan \angle F_1PF_2 =$

$$\left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right| = \frac{2|y_0|}{m^2 - 1 + y_0^2} \leq \frac{2|y_0|}{2\sqrt{m^2 - 1} \cdot |y_0|} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}} \text{ 当且仅当 } \sqrt{m^2 - 1} = |y_0| \text{ 时, } \angle F_1PF_2$$

最大, 所以 $Q(m, \pm \sqrt{m^2 - 1}) |m| > 1$.

秒杀解法: 利用米勒定理, 可得: 当 $\angle F_1PF_2$ 最大时, 一定有 $y_P^2 = (-1-m)(1-m) = m^2 - 1 \Rightarrow y_P = \pm \sqrt{m^2 - 1}$, 故所以 $Q(m, \pm \sqrt{m^2 - 1}) |m| > 1$.

专题 5 新三板斧之角平分线相关定理

达标训练

1. D 【解析】解法一: 由角平分线定理得: $\frac{BD}{DC} =$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}, \text{ 余弦定理可得: } BC =$$

$$\sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \angle BAC} = \sqrt{19}, \text{ 所}$$

以 $BD = \frac{2}{5}BC = \frac{2\sqrt{19}}{5}$, 在三角形 ABC 中, 由余

$$\text{弦定理得 } \cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{4 + 19 - 9}{4\sqrt{19}} =$$

$$\frac{7}{2\sqrt{19}}, \text{ 在三角形 } ABD \text{ 中由余弦定理得 } \cos B =$$

$$\frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD}, \frac{7}{2\sqrt{19}} = \frac{4 + \frac{4 \times 19}{25} - AD^2}{2 \times 2 \times \frac{2\sqrt{19}}{5}}, \text{ 解}$$

得 $AD = \frac{6}{5}$. 故选 D.

解法二: 由角平分线张角定理得: $\cos \frac{\angle BAC}{2} =$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow AD = \frac{6}{5}. \text{ 故选 D.}$$

2. C 【解析】解法一: 在 $\triangle ABD$ 中, $\angle A = 30^\circ$, $\angle ADB = 60^\circ$, 在 $\triangle BCD$ 中, $CD = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $\angle C =$

45°, $\angle CBD = 15^\circ$, 可得 $\frac{CD}{\sin 15^\circ} = \frac{BD}{\sin 45^\circ}$, 即为 $\frac{\sqrt{3}-1}{2} = \frac{BD}{\sqrt{2}}$, 解得 $BD = 1$, 可得 $AB = BD \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 故选 C.

解法二: 由张角定理得: $\frac{\sin \angle ABC}{BD} = \frac{\sin \angle ABD}{BC} + \frac{\sin \angle CBD}{AB} \Rightarrow \frac{\sin 105^\circ}{BD} = \frac{\sin 15^\circ}{CD \sin 120^\circ} + \frac{\sin 15^\circ}{\sqrt{3}BD}$, 解得 $BD = 1$, $AB = \sqrt{3}$, 故选 C.

3. D 【解析】根据题意, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac$, 因为 $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = \sqrt{3}$, 所以 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \times BD \times c \times \sin \angle ABD = \frac{\sqrt{3}}{4}c$, $S_{\triangle CBD} = \frac{1}{2} \times BD \times a \times \sin \angle CBD = \frac{\sqrt{3}}{4}a$, 而 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{4}ac = \frac{\sqrt{3}}{4}c + \frac{\sqrt{3}}{4}a$, 化简得 $ac = c + a$, 即 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 1$, 则 $a + 2c = (a + 2c) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c}\right) = 3 + 2\sqrt{\frac{a}{c} \times \frac{2c}{a}} \geq 3 + 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $a = \sqrt{2}c$ 时取等号, 即最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$. 故选 D. 注意: 可以直接张角定理加柯西不等式, 此为熟能生巧.

4. D 【解析】由 $\frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot \sin \alpha + \frac{1}{2}AC \cdot AD \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin 2\alpha = S$, 得 $AD \cdot (AB + AC) = AB \cdot AC \cdot 2 \cos \alpha$, 所以 $AD = \frac{AB \cdot AC \cdot 2 \cos \alpha}{AB + AC} \leq \frac{AB \cdot AC \cdot 2 \cos \alpha}{2 \sqrt{AB \cdot AC}} = \sqrt{AB \cdot AC} \cos \alpha = \sqrt{\frac{2S}{\sin 2\alpha}} \cos \alpha = \sqrt{\frac{2S \cos^2 \alpha}{\sin 2\alpha}} = \sqrt{\frac{S \cos \alpha}{\sin \alpha}} = \sqrt{\frac{S}{\tan \alpha}}$, 当且仅当 $AB = AC = \sqrt{\frac{2S}{\sin 2\alpha}}$ 时取等. 故选 D.

5. B 【解析】解法一: 设 $AC = x$, 则 $AB = 2x$, 在三角形 ABC 中由余弦定理得 $BC^2 = x^2 + (2x)^2 - 2 \cdot x \cdot 2x \cdot \cos 120^\circ = 7x^2$, 所以 $\cos C = \frac{x^2 + 7x^2 - 4x^2}{2 \cdot x \cdot \sqrt{7}x} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 所以 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} =$

$\frac{\sqrt{21}}{7}$, 所以 $\sin \angle ADC = \sin(60^\circ + C) = \frac{3\sqrt{21}}{14}$, 在 $\triangle ADC$ 中由正弦定理得 $\frac{AD}{\sin C} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}$, 即 $\frac{AD}{\frac{\sqrt{21}}{7}} = \frac{x}{\frac{3\sqrt{21}}{14}}$, 所以 $AD = \frac{2}{3}x = \frac{2}{3} \times \frac{AB}{2} = \frac{AB}{3}$, 所以 $AB = 3AD$, 故选 B.

解法二: 由角平分线张角定理得: $\cos \frac{\angle BAC}{2} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow AB = 3AD$, 故选 B.

6. B 【解析】解法一: 因为 $a = \frac{\sqrt{5}}{2}b$, 所以由正弦定理得 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin B$ ①, 又因为 $A = 2B$, 所以 $\sin A = \sin 2B = 2 \sin B \cos B$ ②, 由①②可得 $\frac{\sqrt{5}}{2} \sin B = 2 \sin B \cos B$, 约掉 $\sin B$ 可得 $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{4}$, 故选 B.

解法二: 由倍角定理得: $A = 2B \Rightarrow a^2 = b(b+c) \Rightarrow \frac{5b^2}{4} = b(b+c) \Rightarrow c = \frac{1}{4}b$, 根据余弦定理可得: $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\sqrt{5}}{4}$, 故选 B.

7. B 【解析】因为 $a \sin A + b \sin B - c \sin C = 4b \sin B \cos C$, 所以由正弦定理得 $a^2 + b^2 - c^2 = 4b^2 \cos C = 4b^2 \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, 即 $1 = \frac{2b}{a}$, 则 $a = 2b$, CD 是角 C 的角平分线, 且 $CD = b$,

解法一: 由三角形的面积公式得 $S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = S_{\triangle ABC}$, 即 $\frac{1}{2}b \cdot b \sin \frac{C}{2} + \frac{1}{2}a \cdot b \sin \frac{C}{2} = \frac{1}{2}a \cdot b \sin C$, 即 $b^2 \sin \frac{C}{2} + 2b^2 \sin \frac{C}{2} = 2b^2 \cdot 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$, 即 $1 + 2 = 4 \cos \frac{C}{2}$, 即 $\cos \frac{C}{2} = \frac{3}{4}$, 即 $\cos C = 2 \cos^2 \frac{C}{2} - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = 2 \times \frac{9}{16} - 1 = \frac{1}{8}$, 故选 B.

解法二：由斯库顿定理得： $b^2 = ab - AD \cdot BD \Rightarrow AD \cdot BD = b^2 \Rightarrow AB^2 = (3AD)^2 = \frac{9b^2}{2}$ ，根据余弦定理，所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - AB^2}{2ab} = \frac{4b^2 + b^2 - \frac{9b^2}{2}}{4b^2} = \frac{1}{8}$ ，故选 B。

8. D 【解析】解法一：如图所示，因为在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 $\angle A$ 的平分线， $AB = 2AC$ ，所以 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = 2$ ，所以 $\angle 1 = \angle 2$ 。令 $AC = a$ ， $DC = b$ ， $AD = c$ ，则 $AB = 2a$ ， $BD = 2b$ 。在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 中，分别利用余弦定理可得：

$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos \angle 1$ ， $DC^2 = AC^2 + AD^2 - 2AC \cdot AD \cos \angle 2$ ，所以 $4b^2 = 4a^2 + c^2 - 4accos \angle 1$ ， $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \angle 2$ ，化为 $3c^2 - 4accos \angle 1 = 0$ ，又 $a = tc$ ，所以 $t = \frac{3}{4\cos \angle 1}$ ，因为 $\angle 1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，所以 $\cos \angle 1 \in (0, 1)$ 。所以 $t \in \left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$ 。故选 D。

解法二：根据角平分线张角定理得： $\cos \frac{\angle BAC}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2t} + \frac{1}{t}\right) = \frac{3}{4t}$ ，因为 $\cos \frac{\angle BAC}{2} \in (0, 1)$ ，所以 $0 < \frac{3}{4t} < 1$ ，所以 $t \in \left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$ 。故选 D。

9. C 【解析】解法一：因为 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，所以 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{5}$ ，又 $BD + DC = 7$ ，所以 $DC = \frac{35}{8}$ ， $BD = \frac{21}{8}$ ，在三角形 ABC 中由余弦定理得 $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{3^2 + 7^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 7} = \frac{33}{42} = \frac{11}{14}$ ，在三角形 ABD 中，由余弦定理得： $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \times \frac{11}{14} = 3^2 + \left(\frac{21}{8}\right)^2 - 2 \times$

$\frac{21}{8} \times 3 \times \frac{11}{14} = \frac{225}{64}$ ，所以 $AD = \frac{15}{8}$ 。故选 C。

解法二：利用角平分线定理 $\begin{cases} BD + DC = 7 \\ \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = \frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow BD = \frac{21}{8}$ ， $CD = \frac{35}{8}$ ，根据斯库顿定理： $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot CD$ 。代入数据得： $AD = \frac{15}{8}$ 。故选 C。

10. A 【解析】因为 $b^2 - a^2 = ac$ ，所以由正弦定理得， $\sin^2 B - \sin^2 A = \sin A \sin C$ ，可得 $\frac{1 - \cos 2B}{2} - \frac{1 - \cos 2A}{2} = \sin A \sin C$ ，可得 $\frac{\cos 2A - \cos 2B}{2} = \sin A \sin C$ ，所以由和差化积公式得 $\cos 2A - \cos 2B = -2\sin(A+B)\sin(A-B)$ ，代入上式得， $-\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin A \sin C$ ，因为 $\sin(A+B) = \sin C \neq 0$ ，所以 $-\sin(A-B) = \sin A$ ，即 $\sin(B-A) = \sin A$ ，所以在 $\triangle ABC$ 中， $B - A = A$ ，得 $B = 2A$ ，则 $C = \pi - 3A$ ，因为

$$\triangle ABC \text{ 为锐角三角形，所以 } \begin{cases} 0 < 2A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \pi - 3A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

所以解得： $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{4}$ ，则 $\frac{\pi}{3} < B < \frac{\pi}{2}$ ，所以

$$\frac{1}{\tan A} - \frac{1}{\tan B} = \frac{\cos A}{\sin A} - \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\cos A \sin B - \sin A \cos B}{\sin A \sin B} = \frac{\sin(B-A)}{\sin A \sin B} = \frac{1}{\sin B}$$

因为由 $\frac{\pi}{3} < B < \frac{\pi}{2}$ 得，

$$\sin B \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$$
，则 $\frac{1}{\sin B} \in \left(1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ ，所以

$$\frac{1}{\tan A} - \frac{1}{\tan B} \text{ 取值范围是 } \left(1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$
，故选 A。

注意：此题可以直接用倍角定理得出 $B = 2A$ ，能大大简化计算。

11. B 【解析】在锐角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 2\angle B$ ， $\angle B \in (30^\circ, 45^\circ)$ ， $\cos B \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\cos^2 B \in \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ 。

解法一：由正弦定理可知： $\frac{b}{b+c} = \frac{\sin B}{\sin B + \sin C} = \frac{\sin B}{\sin B + \sin(\pi - 3B)} = \frac{\sin B}{\sin B + 3\sin B - 4\sin^3 B} = \frac{1}{4\cos^2 B} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ ，故选 B。

解法二：由倍角定理得 $\angle A = 2\angle B \Rightarrow a^2 = b(b+c) \Rightarrow \frac{b}{b+c} = \frac{b^2}{a^2} = \left(\frac{\sin B}{\sin A}\right)^2 = \frac{1}{4\cos^2 B} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ ，故选 B。

12. B 【解析】过点 D 分别作 AB 和 AC 的垂线，垂足分别为 E, F ，因为由 $BD \cdot \sin B = CD \cdot \sin C$ ，可得： $DE = DF$ ，则 AD 为 $\angle BAC$ 的平分线，所以 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = 2$ 。

解法一：又 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$ ，即 $\frac{8+4-AB^2}{2 \times 2 \times 2\sqrt{2}} = -\frac{2+4-AC^2}{2 \times 2 \times \sqrt{2}}$ ，所以解得 $AC = 2$ ，

所以在 $\triangle ABC$ 中， $\cos \angle BAC = \frac{4^2+2^2-(3\sqrt{2})^2}{2 \times 4 \times 2} = \frac{1}{8}$ ，所以 $\sin \angle BAC = \frac{3\sqrt{7}}{8}$ ，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{3\sqrt{7}}{2}$ 。故选 B。

解法二：根据斯库顿定理， $AD^2 = AB \cdot AC - CD \cdot BD \Rightarrow AB \cdot AC = 2b^2 = AD^2 + CD \cdot BD = 8$ ，根据余弦定理，所以 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{1}{8}$ ，所以 $\sin \angle BAC = \frac{3\sqrt{7}}{8}$ ，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{3\sqrt{7}}{2}$ 。故选 B。

13. 【解析】如图所示，则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}ac\sin 120^\circ = \frac{1}{2}a \cdot 2\sin 60^\circ + \frac{1}{2}c \cdot 2\sin 60^\circ$ ，即 $ac = 2a + 2c$ ，得 $\frac{2}{a} + \frac{2}{c} = 1$ ，得 $4a + c = (4a + c)\left(\frac{2}{a} + \frac{2}{c}\right) = \frac{2c}{a} + \frac{8a}{c} + 10 \geq 2\sqrt{\frac{2c}{a} \cdot \frac{8a}{c}} + 10 = 8 + 10 = 18$ ，当且仅当 $\frac{2c}{a} = \frac{8a}{c}$ ，即 $c = 2a$

时取等号；所以 $4a + c$ 的最小值为 18。故答案为 18。

14. 【解析】解法一：根据题意，在 $\triangle ABC$ 中， $b = 6, c = 4, A = 2B$ ；由正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ ，即 $\frac{a}{2\sin B \cos B} = \frac{6}{\sin B}$ ，变形可得 $\cos B = \frac{a}{12}$ ，又由余弦定理可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 - 20}{8a}$ ，则有 $\frac{a^2 - 20}{8a} = \frac{a}{12}$ ，解可得 $a = 2\sqrt{15}$ 。

解法二：由倍角定理得： $A = 2B \Rightarrow a^2 = b(b+c) = 60 \Rightarrow a = 2\sqrt{15}$

15. 【解析】解法一：因为 $\angle C = 90^\circ$ ，内角 A 的平分线 AD 的长为 7，则 $\sin B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \frac{7}{18}$ ，

所以 $\cos A = \frac{7}{18}$ ，可得： $2\cos^2 \frac{A}{2} - 1 = \frac{7}{18}$ ，解得： $\cos \frac{A}{2} = \frac{5}{6}$ ，所以 $\cos \angle CAD = \frac{5}{6}$ ，所以 $\cos \angle DAB = \frac{5}{6}$ ， $\sin \angle DAB = \sqrt{1 - \cos^2 \angle DAB} = \frac{\sqrt{11}}{6}$ ，又因为 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{5\sqrt{11}}{18}$ ，所以 $\sin \angle ADB = \sin(\angle B + \angle DAB) = \sin B \cos \angle DAB + \cos B \sin \angle DAB = \frac{7}{18} \times \frac{5}{6} + \frac{5\sqrt{11}}{18} \times \frac{\sqrt{11}}{6} = \frac{5}{6}$ ，所以在 $\triangle ADB$ 中，由正弦定理 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{AD}{\sin \angle B}$ ，可得： $\frac{AB}{\frac{5}{6}} = \frac{7}{\frac{7}{18}}$ ，解得： $AB = 15$ 。故答案为 $\frac{15}{6}$ ，15。

解法二：令 $\angle CAD = \angle DAB = \alpha$ ，则 $\frac{\sin 2\alpha}{AD} = \frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \alpha}{c} \Rightarrow \frac{2\cos \alpha}{7} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ ，由于 $b = 7\cos \alpha, c = \frac{b}{\sin B} = \frac{7\cos \alpha}{\frac{7}{18}} = 18\cos \alpha$ ，故 $\cos \alpha = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{7\cos \alpha} + \frac{1}{18\cos \alpha}\right) \Rightarrow \cos \alpha = \frac{15}{6}$ ，15。

解法二：令 $\angle CAD = \angle DAB = \alpha$ ，则 $\frac{\sin 2\alpha}{AD} = \frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \alpha}{c} \Rightarrow \frac{2\cos \alpha}{7} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ ，由于 $b = 7\cos \alpha, c = \frac{b}{\sin B} = \frac{7\cos \alpha}{\frac{7}{18}} = 18\cos \alpha$ ，故 $\cos \alpha = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{7\cos \alpha} + \frac{1}{18\cos \alpha}\right) \Rightarrow \cos \alpha = \frac{15}{6}$ ，15。

$$= \frac{5}{6}, AB = 18\cos\alpha = 15.$$

16. 【解析】解法一：因为 $BC = 2\sqrt{3}$, $A = 60^\circ$,

$$S_{\triangle ABC} = 2\sqrt{3} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2},$$

所以解得： $AB \cdot AC = 8$ ①，因为由余弦定理

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A, \text{ 可得：}$$

$$12 = AB^2 + AC^2 - AB \cdot AC = (AB + AC)^2 - 3AB \cdot AC = (AB + AC)^2 - 3 \times 8,$$

所以解得： $AB + AC = 6$ ② 所以由①②联立解得：

$$\begin{cases} AB = 4 \\ AC = 2 \end{cases}, \text{ 或}$$

$$\begin{cases} AB = 2 \\ AC = 4 \end{cases} \text{ (由于 } AB > AC, \text{ 舍去). 所以 } \cos B =$$

$$\frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{16 + 12 - 4}{2 \times 4 \times 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 可得 } \sin B =$$

$$\sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{1}{2}, \text{ 因为 } AM \text{ 为角平分线, 可得}$$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BM}{MC} = \frac{4}{2}, \text{ 且 } BM + MC = 2\sqrt{3}, \text{ 所以解得:}$$

$$BM = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \text{ 所以在 } \triangle ABM \text{ 中, 由余弦定理可}$$

$$\text{得: } AM = \sqrt{AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos B} =$$

$$\sqrt{16 + \frac{48}{9} - 2 \times 4 \times \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}. \text{ 故答案为}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

解法二：根据灵动椭圆焦点三角形面积公式可

$$\text{得: } S_{\triangle ABC} = 2\sqrt{3} = \frac{1}{4}[(b+c)^2 - a^2] \tan \frac{A}{2} \Rightarrow$$

$$b+c=6, \text{ 再根据万能辅助角公式 } b+c=6 =$$

$$\frac{a}{\sin A} \cdot 2\cos \frac{A}{2} \sin \left(B + \frac{A}{2} \right) \Rightarrow \sin \left(B + 30^\circ \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

$$B = 30^\circ (B \text{ 为小角}) \Rightarrow \sin B = \frac{1}{2}, \text{ 易知 } C = 90^\circ,$$

$AC = 2, AB = 4$, 根据角平分线张角定理

$$\cos \frac{\angle BAC}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{AM}{AB} + \frac{AM}{AC} \right) \Rightarrow AM = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

17. 【解析】解法一：因为 $A : B = 1 : 2$, 即 $B = 2A$,

所以 $B > A$, 所以 $AC > BC$, 因为角平分线 CD 把三角形面积分成 $5 : 3$ 两部分, 所以由角平分线定理得： $BC : AC = BD : AD = 3 : 5$, 所以由

正弦定理 $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$, 得 $\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{3}{5}$, 整理得

$$\frac{\sin A}{\sin 2A} = \frac{\sin A}{2\sin A \cos A} = \frac{3}{5}, \text{ 则 } \cos A = \frac{5}{6}. \text{ 故答案}$$

$$\text{为 } \frac{5}{6}.$$

解法二：根据倍角定理 $B = 2A \Rightarrow b^2 = a(a+c)$, 角平分线 CD 把三角形面积分成 $5 : 3$ 两部分, 所以由角平分线定理得： $a : b = 3 : 5$, 所以

$$a : b : c = 3 : 5 : \frac{16}{3}, \text{ 根据余弦定理可知: } \cos A =$$

$$\frac{5}{6}. \text{ 故答案为 } \frac{5}{6}.$$

18. 【解析】解法一： $\triangle ABC$ 中, 角 A 的平分线交

BC 于点 D , $BD = 2CD = 2$, 如图所示; 则 $CD = 1$, 由三角形内角平分线定理得 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} = 2$,

设 $AC = x$, $\angle BAC = 2\alpha$, 则 $AB = 2x$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$;

$$\text{由余弦定理得, } 3^2 = 4x^2 + x^2 - 2 \cdot 2x \cdot x \cdot \cos 2\alpha, \text{ 即 } 9 = 5x^2 - 4x^2 \cos 2\alpha, \text{ 解得 } x^2 = \frac{9}{5 - 4\cos 2\alpha};$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot x \cdot \sin 2\alpha = x^2 \sin 2\alpha =$$

$$\frac{9 \cdot \frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha}}{5 - 4 \cdot \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}} = \frac{18\tan\alpha}{1 + 9\tan^2\alpha} =$$

$$\frac{18}{\frac{1}{\tan\alpha} + 9\tan\alpha} \leq \frac{18}{2\sqrt{\frac{1}{\tan\alpha} \cdot 9\tan\alpha}} = 3, \text{ 当且仅当}$$

$\tan\alpha = \frac{1}{3}$ 时“=”成立; 所以 $\triangle ABC$ 面积的最大

值为 3 . 故答案为 3 .

解法二：根据斯库顿定理, $AD^2 = AB \cdot AC - CD \cdot BD = 2AC^2 - 2$, 令 $AC = x$, 作 $AE \perp BC$ 于

E , 设 $EC = y$, 则 $AD^2 - DE^2 = AC^2 - EC^2 \Rightarrow y = \frac{3 - x^2}{2}$, $AE^2 = x^2 - y^2 = -\frac{x^4}{4} + \frac{5x^2}{2} - \frac{9}{4} \leq 4$, 当

仅当 $x^2 = 5$ 时等号成立, 故 $S_{\triangle ABC}$ 最大值为 $\frac{3 \times 2}{2} = 3$. 故答案为 3 .

19. 【解析】(1) 证明：根据题意, 在 $\triangle ABC$ 中, a

+2acosB = c, 由正弦定理知 $\sin A + 2\sin A \cos B = \sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 即 $\sin A = \cos A \sin B - \sin A \cos B = \sin(B-A)$. 因为 $A, B \in (0, \pi)$, 所以 $B-A \in (-\pi, \pi)$, 且 $A+(B-A) = B \in (0, \pi)$, 所以 $A+(B-A) \neq \pi$, 所以 $A = B-A, B = 2A$; (2) 由(1)知 $A = \frac{B}{2}, C = \pi - A - B = \pi - \frac{3B}{2}$. 由 $\triangle ABC$ 为锐角

$$\text{三角形得} \begin{cases} 0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2} \\ 0 < B < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \pi - \frac{3B}{2} < \frac{\pi}{2} \end{cases}, \text{得} \frac{\pi}{3} < B < \frac{\pi}{2}, \text{则}$$

$0 < \cos B < \frac{1}{2}$, 由 $a + 2a \cos B = 2$ 得 $a = \frac{2}{1+2\cos B}$, 又由 $0 < \cos B < \frac{1}{2}$, 则 $a = \frac{2}{1+2\cos B} \in (1, 2)$.

20. 【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 2\angle B, \angle C = \pi - \frac{3\angle A}{2}$ 且 $\angle A \in (0, \pi)$, 由正弦定理 $\sqrt{2} = \frac{a}{c} =$

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sin A}{\sin \frac{3A}{2}} = \frac{2\sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2} \cos A + \cos \frac{A}{2} \sin A} =$$

$$\frac{2\sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2} \cos A + 2\sin \frac{A}{2} \cos^2 \frac{A}{2}} = \frac{2\cos \frac{A}{2}}{4\cos^2 \frac{A}{2} - 1}, \text{解}$$

$$\text{方程} 4\cos^2 \frac{A}{2} - \sqrt{2}\cos \frac{A}{2} - 1 = 0 \text{ 得} \cos \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(舍负), 所以, $\angle A = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

$$(2) \text{解法一: } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{3c^2 - 4}{2\sqrt{2}c^2}, S_{\triangle ABC} =$$

$$\left(\frac{1}{2}ac\sin B\right)^2 = \frac{1}{4}a^2c^2\sin^2 B = \frac{1}{4}a^2c^2(1 - \cos^2 B) = \frac{1}{4} \times 2c^4 \times \frac{-c^4 + 24c^2 - 16}{8c^4} = \frac{-(c^2 - 12)^2}{16} +$$

8, 所以当 $c^2 = 12$ 即 $c = 2\sqrt{3}$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值为 8, 此时 $S_{\triangle ABC} = 2\sqrt{2}$.

解法二: 过点 B 作角 B 平分线 BM, 由角平分线定理, $\sqrt{2} = \frac{a}{c} = \frac{CM}{AM} = \frac{\sqrt{2}x}{x}$, 则 $x = \frac{2}{\sqrt{2}+1} =$

$2\sqrt{2}-2$. 由阿波罗尼奥斯圆定义, 点 B 在以内外角平分线的分点 M, N 为直径的圆上, $\triangle ABC$ 面积最大时, 点 B 最高. 根据勾股定

$$\text{理: } \begin{cases} c^2 - R^2 = (R-x)^2 \\ 2c^2 - R^2 = (R+\sqrt{2}x)^2 \end{cases}, \text{所以}$$

$$\begin{cases} c^2 - R^2 = R^2 - 2xR + x^2 \\ 2c^2 - R^2 = 2x^2 + 2\sqrt{2}xR + R^2 \end{cases} \text{ 所以 } 2R^2 =$$

$$2\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)xR, \text{ 所以 } R = \sqrt{2}(\sqrt{2}+1)x = 2\sqrt{2}.$$

所以 $\triangle ABC$ 面积最大为 $2\sqrt{2}$, 此时 $c = 2\sqrt{3}$.

专题 6 新三板斧之斯特瓦尔特定理到极化恒等式

达标训练

1. B 【解析】解法一: 设 $AD = t$, 可得 $BD = 2t$, $BC = \sqrt{4t^2 - 25}$, 在直角三角形 BCD 中, 可得

$$\cos B = \frac{\sqrt{4t^2 - 25}}{2t}, \text{ 在三角形 ABC 中, 可得 } \cos B =$$

$$\frac{4t^2 - 25 + 9t^2 - 75}{2 \cdot 3t \cdot \sqrt{4t^2 - 25}}, \text{ 即为 } \frac{\sqrt{4t^2 - 25}}{2t} = \frac{4t^2 - 25 + 9t^2 - 75}{2 \cdot 3t \cdot \sqrt{4t^2 - 25}},$$

即 $2(4t^2 - 25) = 9t^2 - 75$, 解得 $t = 5$, 可得 $AD = 5$, 故选 B.

解法二: 设 $AD = t$, 可得 $BD = 2t, BC = \sqrt{4t^2 - 25}$, 由斯特瓦尔特定理得, $CD^2 = 25 = \frac{AC^2 \cdot BD + BC^2 \cdot AD}{AB} - AD \cdot DB = \frac{75 \times 2t + (4t^2 - 25) \cdot t}{3t} - 2t^2 \Rightarrow t = 5$, 故选 B.

2. B 【解析】解法一: $\triangle ABC$ 中, 因为 $\angle A = \frac{\pi}{4}$,

BC 边上的中线 AD 长为 $\sqrt{2}, \vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$,

$$\text{设 } AB = c, AC = b, \text{ 平方可得 } 2 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}) =$$

$$\frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2cb \cdot \sin \frac{\pi}{4}), \text{ 化简可得, } c^2 + b^2 +$$

$$\sqrt{2}bc = 8 \geq 2bc + \sqrt{2}bc, \text{ 所以 } bc \leq \frac{8}{2+\sqrt{2}} =$$

$$4(2-\sqrt{2}), \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 的面积 } S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \frac{\pi}{4} \leq$$

$$\frac{1}{2} \cdot 4(2-\sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}-2, \text{ 故选 B.}$$

解法二: 极化恒等式 + 中线 $\geq$ 高, 由于 AD 为中

线, 故 $AD \geq h$ 恒成立, 当仅当 $AB = AC$ 时等号成立, 此时有 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$, 且 $AD =$

$$AB \cos \angle BAD = AB \cos \frac{\pi}{8} \Rightarrow 2 = AB^2 \cdot \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} \Rightarrow$$

$$AB^2 = 8 - 4\sqrt{2}, \triangle ABC \text{ 面积的最大值为 } S_{\max} =$$

$$\frac{AB^2 \sin \frac{\pi}{4}}{2} = 2\sqrt{2} - 2, \text{ 故选 B.}$$

3. D 【解析】设 $BD = x$, 则 $AD = 3x$, $AC = 2 - 3x$,

$BC = 2 - x$, 解法一: $\cos \angle ADC = -\cos \angle BDC$,

由余弦定理可得: $\frac{9x^2 + 2 - (2 - 3x)^2}{2 \times \sqrt{2} \times 3x} =$

$$-\frac{x^2 + 2 - (2 - x)^2}{2 \times \sqrt{2} \times x}, \text{ 解得 } x = \frac{1}{3}, \text{ 故 } AD = 1, AC$$

$$= 1, \text{ 所以 } \cos A = \frac{AD^2 + AC^2 - CD^2}{2AD \times AC} = 0. \text{ 故选 D.}$$

解法二: 根据斯特瓦尔特定理 $CD^2 = 2 = \frac{BC^2 \cdot AD + AC^2 \cdot BD}{AB} - BD \cdot DA =$

$$\frac{(2-x)^2 \cdot 3x + (2-3x)^2 \cdot x}{4x} - 3x^2 \text{ 所以 } x = \frac{1}{3},$$

$$\text{所以 } \cos A = \frac{AD^2 + AC^2 - CD^2}{2AD \times AC} = 0. \text{ 故选 D.}$$

4. 【解析】由正弦定理可得: $bc + a^2 = b^2 + c^2$, 所以

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}, \text{ 又 } A \in (0, \pi), \text{ 所以}$$

$$A = \frac{\pi}{3}, \text{ 解法一: 由 } BD = 2DC, \text{ 可得 } \vec{BD} = 2\vec{DC},$$

$$\text{所以 } \vec{AD} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}, \text{ 两边平方, 可得 } \vec{AD}^2 =$$

$$\frac{1}{9}c^2 + \frac{4}{9}b^2 + \frac{4}{9}bccosA = \frac{1}{9}c^2 + \frac{4}{9}b^2 + \frac{2}{9}bc =$$

$$\frac{1}{9}(c+2b)^2 - \frac{2}{9}bc \geq \frac{1}{9}(c+2b)^2 - \frac{1}{9}\left(\frac{2b+c}{2}\right)^2 =$$

$$\frac{4}{9}, \text{ 当且仅当 } c = 2b = 2 \text{ 时取等号, 所以可得}$$

$$AD_{\min} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

解法二: 斯特瓦尔特定理 + 余弦定理, $AD^2 = \frac{c^2 \cdot CD + b^2 \cdot BD}{BC} - BD \cdot DC \Rightarrow \frac{2}{3}b^2 + \frac{1}{3}c^2 -$

$$\frac{2}{9}a^2, \text{ 再根据余弦定理, } c^2 + b^2 - a^2 = 2bccosA =$$

$$bc, \text{ 得: } a^2 = c^2 + b^2 - bc, \text{ 所以 } AD^2 = \frac{2}{3}b^2 +$$

$$\frac{1}{3}c^2 - \frac{2}{9}a^2 = \frac{4}{9}b^2 + \frac{1}{9}c^2 + \frac{2}{9}bc = \frac{1}{9}(c+2b)^2 -$$

$$\frac{2}{9}bc \geq \frac{1}{9}(c+2b)^2 - \frac{1}{9}\left(\frac{2b+c}{2}\right)^2 = \frac{4}{9}, \text{ 当且仅}$$

当 $c = 2b = 2$ 时取等号, 所以可得 $AD_{\min} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

解法三: 倍长定比分线, 如图所示, 延长 AD , 过 C 作 AB 平行线交 AD 延长线于 E , 易知 $CE =$

$$\frac{c}{2}, DE = \frac{AD}{2}, \angle ACE = 120^\circ, \text{ 根据余弦定理,}$$

$$AC^2 + CE^2 + AC \cdot CE = b^2 + \frac{c^2}{4} + \frac{bc}{2} = \left(\frac{3}{2}AD\right)^2 \geq$$

$$\left(b + \frac{c}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(b + \frac{c}{2}\right)^2 = 3, \text{ 当且仅当 } c = 2b =$$

2 时取等号, 所以可得 $AD_{\min} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

5. 【解析】解法一: 设 $BD = CD = x$, $AB = y$, 根据

$$\text{余弦定理有 } \begin{cases} \sqrt{3}xy = x^2 + y^2 - 1 \\ 2\sqrt{3}xy = 4x^2 + y^2 - 4 \end{cases}, \text{ 可得 } 2x =$$

$$\sqrt{3}y, \text{ 回代可得: } x = \sqrt{3}, y = 2, \text{ 可得: } S_{\triangle ABC} =$$

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABD = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}.$$

解法二: 由中线定理得: $AD^2 + BD^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} \Rightarrow$

$$AB^2 = 2BD^2 - 2, \text{ 根据余弦定理可得: } AB^2 + BD^2$$

$$- AD^2 = 2AB \cdot BD \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BD = \sqrt{3}, \text{ 可得 } S_{\triangle ABC} =$$

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABD = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}.$$

6. 【解析】解法一: 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AC 边上的

点, 且 $AB = AD$, $BD = \frac{\sqrt{6}}{2}AD$, 则在 $\triangle ABD$ 中,

$$\text{利用余弦定理可得 } \cos A = \frac{AD^2 + AB^2 - BD^2}{2AD \cdot AB} =$$

$$\frac{AD^2 + AD^2 - \left(\frac{\sqrt{6}}{2}AD\right)^2}{2AD \cdot AD} = \frac{1}{4}, \text{ 由于 } 0 < A < \pi, \text{ 则}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}, \text{ 在 } \triangle ABC \text{ 中, 利用正}$$

弦定理 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, $AB = AD$, $BC = 2AD$, 解得:

$$\sin C = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

解法二: 根据斯特瓦尔特定理, 令 $AD = AB = x$,

$$\text{则 } BD = \frac{\sqrt{6}}{2}x, BC = 2x, CD = mx, AC =$$

$$(m+1)x, BD^2 = \frac{3}{2}x^2 = \frac{x^2 \cdot mx + 4x^2 \cdot x}{(m+1)x} - mx^2$$

$$\Rightarrow m = 1 \text{ 或 } m = -\frac{5}{2} \text{ (舍)}, \cos C =$$

$$\frac{(2x)^2 + (2x)^2 - x^2}{2 \cdot 2x \cdot 2x} = \frac{7}{8}, \text{ 则 } \sin C = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

7. 【解析】(1) 因为向量 $m = (2a - c, b)$ 与向量 $n = (\cos C, \cos B)$ 共线. 所以 $(2a - c) \cos B - b \cos C = 0$. 即 $2 \sin A \cos B = \sin(B + C) = \sin A$. 因为 $\sin A \neq 0$, 所以 $\cos B = \frac{1}{2}$. 因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$; (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 3\sqrt{7}$, $a = 3$, $B = \frac{\pi}{3}$, 由余弦定理可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{9 + c^2 - 63}{2 \times 3 \times c} = \frac{1}{2}$. 所以 $c^2 - 3c - 54 = 0$, 解得 $c = 9$, (负值舍去)

因为 $\vec{AD} = 2\vec{DC}$, 所以 $DC = \frac{1}{3}b = \sqrt{7}$, 在 $\triangle CBD$ 中, 由余弦定理 $BD^2 = CB^2 + CD^2 - 2CB \cdot CD \cdot \cos C = 10$. 所以 $BD = \sqrt{19}$.

8. 【解析】(1) 因为 $b = 4\sqrt{2} < 6 = c$, 所以 B 为锐角. 因为 $\sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{1}{3}$. 所以 $(4\sqrt{2})^2 = 6^2 + a^2 - 12a \times \frac{1}{3}$, 化为 $a^2 - 4a + 4 = 0$, 解得 $a = 2$. 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 4\sqrt{2}$; (2) $\vec{BD} = 2\vec{DC}$, $AD = 3\sqrt{2}$, 设 $CD = x$, 则 $BD = 2x$. 在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 中, 分别利用余弦定理可得: $\cos B = \frac{6^2 + 4x^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 6 \times 2x} = \frac{6^2 + (3x)^2 - (4\sqrt{2})^2}{2 \times 6 \times 3x}$, 解得 $x = \frac{\sqrt{69}}{3}$. 所以 $BC = \sqrt{69}$.

专题7 新三板斧之托勒密定理

达标训练

1. A 【解析】根据 $\cos \frac{A}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{|AD|}{b} + \frac{|AD|}{c} \right) = \frac{3\sqrt{2}}{8} \Rightarrow \cos A = -\frac{7}{16}$, 故选 A.
2. D 【解析】解法一: 因为 $A = 2B$, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, $b = 3$, 所以 $a = 6 \cos B$, 所以 $a = 6 \cdot \frac{a^2 + 1 - 9}{2a}$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, 故选 D.
解法二: 根据倍角定理: $A = 2B \Rightarrow a^2 = b(b + c) = 12$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, 故选 D.

3. B 【解析】根据倍角定理, 锐角 $\triangle ABC$ 中, 因为 $b^2 = c^2 + ac$, 所以 $B = 2C$, 所以 $b > c$, 可得: $\frac{b}{c} > 1$, 又因为 $A + B + C = \pi$, A, B, C 均为锐角, 由于: $3C + A = \pi$, 所以 $0 < 2C < \frac{\pi}{2}$, $0 < C < \frac{\pi}{4}$. 再根据 $\frac{\pi}{2} < 3C$, 可得 $\frac{\pi}{6} < C$, 所以 $\frac{\pi}{6} < C < \frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3} < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{b}{c} < \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2$, 综上

可得, $1 < \frac{b}{c} < 2$, 故 $\frac{b}{c}$ 的取值范围是为 (1, 2). 故选 B.

4. A 【解析】解法一: 如图, 设 $MC = x$, 则 $BM = 2x$, $BC = 3x$, $\cos \angle AMC = \frac{16 + x^2 - 49}{2 \times 4 \times x} = \frac{x^2 - 33}{8x}$, $\cos \angle AMB = \frac{16 + 4x^2 - 36}{2 \times 4 \times 2x} = \frac{x^2 - 5}{4x}$, 因为 $\angle AMC + \angle AMB = \pi$, 所以 $\cos \angle AMC + \cos \angle AMB = 0$, 所以 $3x^2 = 43$, 所以 $x = \frac{\sqrt{129}}{3}$, 所以 $BC = 3x = \sqrt{129}$. 故选 A.

解法二: 根据斯特瓦尔特定理, $AM^2 = 16 = \frac{AB^2 \cdot MC + AC^2 \cdot BM}{BC} - BM \cdot MC = \frac{36x + 49 \cdot 2x}{3x} - 2x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{129}}{3}$ 所以 $BC = 3x = \sqrt{129}$. 故选 A.

5. B 【解析】所以

$$\begin{cases} b^2 + c^2 = 2 \left(|AD|^2 + \frac{a^2}{4} \right) = 20 \Rightarrow a = 2\sqrt{3} \\ \vec{bc} = bccosA = |AD|^2 - \frac{a^2}{4} = 4 \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 故}$$

选 B.

6. 【解析】由题意得 $\frac{1}{2} a c \sin 120^\circ = \frac{1}{2} a \sin 60^\circ + \frac{1}{2} c \sin 60^\circ$, 即 $ac = a + c$, 得 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 1$, 得 $4a + c = (4a + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = \frac{c}{a} + \frac{4a}{c} + 5 \geq 2\sqrt{\frac{c}{a} \cdot \frac{4a}{c}} + 5 = 4 + 5 = 9$, 当且仅当 $\frac{c}{a} = \frac{4a}{c}$, 即

$c=2a$ 时, 取等号.

7. 【解析】设 $AD=x$, 由 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$ 可得 $2bc = b+c \geq 2\sqrt{bc} \Rightarrow bc \geq 1$, 又 $a=1$, $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \geq \frac{2bc-1}{2bc} \geq \frac{1}{2}$, 所以 $A \in (0, \frac{\pi}{3}]$, 所以 $\frac{A}{2} \in (0, \frac{\pi}{6}]$, 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 得 $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}cx\sin \frac{A}{2} + \frac{1}{2}bc\sin \frac{A}{2}$, 所以 $x = \frac{2bc}{c+b}\cos \frac{A}{2} = \frac{2}{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}}\cos \frac{A}{2} = \cos \frac{A}{2} \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$.

8. 【解析】 $S = \frac{1}{2}bc\sin A = b^2\sin A$, 可知 $c=2b$, 即 $\frac{c}{b} = 2$. 由角分线定理可知, $BD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $CD = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos \frac{A}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{|AD|}{b} + \frac{|AD|}{c} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2b}$ (角平分线张角定理); 在等腰 $\triangle ABD$ 中, $\cos \frac{A}{2} = \frac{b}{|AD|} = \frac{\sqrt{3}b}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2b}$, 解得 $b=1$.

9. 【解析】因为由题意可得: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac\sin 150^\circ = \frac{1}{4}ac = \sqrt{3}$, 所以解得 $ac = 4\sqrt{3}$, 设 $BD=x$, 根据张角定理得 $\frac{1}{2x} = \frac{1}{2c} + \frac{\sqrt{3}}{2a}$, 可得 $x = \frac{4\sqrt{3}}{a+\sqrt{3}c}$, 当且仅当 $a = \sqrt{3}c$ 时, 设 $BD=x$, 根据张角定理得 $\frac{1}{2x} = \frac{1}{2c} + \frac{\sqrt{3}}{2a}$, 可得: $x = \frac{4\sqrt{3}}{a+\sqrt{3}c}$, 当且仅当 $a = \sqrt{3}c$ 时 x 最得最大值, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, $c = 2$, 所以由余弦定理可得: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC = 2^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 28$, 所以解得: $AC = 2\sqrt{7}$.

10. 【解析】设 $AD=x$, 由 $S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ABC}$, 即为 $\frac{1}{2}cx \cdot \sin \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}bx \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$, 可得 $(b+c)x = 8\sqrt{3}$, $bc = 8$, 由 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos \frac{\pi}{3} = (b+c)^2 - 3bc$, 即为 $12 = (b+c)^2 - 24$, 可得 $b+c=6$, 可得 $x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

11. 【解析】解法一: 因为 $b=2, c=3, C=2B$, 所以由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 可得 $\frac{2}{\sin B} = \frac{3}{\sin C}$, 可得 $\frac{2}{\sin B} = \frac{3}{\sin 2B} = \frac{3}{2\sin B \cos B}$, 所以可得 $\cos B = \frac{3}{4}$, 可得 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 所以可得 $\sin C = \sin 2B = 2\sin B \cos B = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos C = \cos 2B = 2\cos^2 B - 1 = \frac{1}{8}$, 所以 $\sin A = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$, 所以 $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{15\sqrt{7}}{16}$.

解法二: 根据倍角定理, $b=2, c=3, C=2B \Rightarrow c^2 = b(b+a) \Rightarrow a = \frac{5}{2}$, 令 $p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{15}{4}$, 再根据海伦公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{\frac{15}{4} \times \frac{5}{4} \times \frac{7}{4} \times \frac{3}{4}} = \frac{15\sqrt{7}}{16}$.

12. 【解析】解法一: $AB=3AC$, 且 $AD=kAC$, 可设 $AC=t$, 则 $AB=3t, AD=kt, \angle BAD = \alpha, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$, 即为 $\frac{1}{2}t \cdot 3t \cdot \sin 2\alpha = \frac{1}{2}t \cdot kt \cdot \sin \alpha + \frac{1}{2} \cdot kt \cdot 3t \cdot \sin \alpha$, 化为 $3\sin 2\alpha = 6\sin \alpha \cos \alpha = 4k\sin \alpha$, $\sin \alpha > 0$, 即为 $k = \frac{3}{2}\cos \alpha$, 由 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 可得 $0 < \cos \alpha < 1$, 可得 k 的范围是 $(0, \frac{3}{2})$.

解法二: 根据角平分线张角定理得: $\cos \frac{\angle BAC}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{k}{3} + k \right) = \frac{2}{3}k$, 因为 $\cos \frac{\angle BAC}{2} \in (0, 1)$, 所以 $0 < \frac{2k}{3} < 1$, 所以

$$k \in \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

13. 【解析】取 AC 中点 D , 由 $|\vec{BC} - \vec{BA}| = 3\sqrt{2}$, 得 $|\vec{AC}| = b = 3\sqrt{2}$, $AB \cdot BC \cdot \cos B = a \cos B = ac = 4$, 根据极化恒等式得 $ac = 4 = |BD|^2 - \frac{b^2}{4} = |BD|^2 - \frac{9}{2} \Rightarrow |BD| = \frac{\sqrt{34}}{2}$, 由于 $|BD| = \frac{\sqrt{34}}{2} \geq h$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bh \leq \frac{1}{2}b|BD| = \frac{3}{2}\sqrt{17}$.

14. 【解析】因为 $AB = 1$, $AD = 5$, $\angle ABC = 45^\circ$, 所以在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理可得: $\sin \angle ADB = \frac{AB \cdot \sin \angle ABC}{AD} = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 所以 $\sin \angle ADC = \sin \angle ADB = \frac{\sqrt{2}}{10}$. 因为在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理 $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos \angle ABC$, 可得: $25 = 1 + BD^2 - 2 \times 1 \times BD \times \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即: $BD^2 - \sqrt{2}BD - 24 = 0$, 所以解得 $BD = 4\sqrt{2}$, 或 $-3\sqrt{2}$ (舍去), 因为 $|AB|^2 + |AC|^2 = 2(|AD|^2 + |BD|^2)$, 所以 $|AC|^2 = 113$.

15. 【解析】根据题意, $\triangle ABC$ 中, $\frac{1}{2} \sin B = \cos^2 \frac{C}{2}$, 则有 $\frac{1}{2} \sin B = \frac{1 + \cos C}{2}$, 变形可得 $\sin B = 1 + \cos C$, 则有 $\cos C = \sin B - 1 < 0$, 则 C 为钝角, B 为锐角; 又由 $A = \frac{\pi}{6}$, 则 $B + C = \frac{5\pi}{6}$, $\sin B = 1 + \cos C \Rightarrow \sin\left(\frac{5\pi}{6} - C\right) = 1 + \cos C \Rightarrow \cos\left(C + \frac{\pi}{3}\right) = -1$, C 为钝角, 则 $C = \frac{2\pi}{3}$, $B = \frac{5\pi}{6} - C = \frac{\pi}{6}$, 则 $\triangle ABC$ 中, $A = B = \frac{\pi}{6}$, 则有 $AC = BC$, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 设 D 为 BC 中点, $|AD| = \sqrt{7}$, 设 $|AC| = x$, $|CD| = \frac{x}{2}$, $|AB| = \sqrt{3}x$, 根据中线定理可得: $|AC|^2 + |AB|^2 = 2(|AD|^2 + |CD|^2)$, 解可得 $x = 2$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AC \times BC \times \sin C = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$.

16. 【解析】设 $CD = x$, 则 $BD = 2x$, 在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理可得: $\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle ADB}$, 即

$$\frac{2x}{\sin \angle BAD} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin \angle ADB}, \text{ 在 } \triangle ACD \text{ 中, 由正弦定理可得: } \frac{CD}{\sin \angle CAD} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}, \text{ 即 } \frac{2}{\sin \angle ADC} = \frac{x}{\frac{1}{2}} = 2x, \text{ 又 } \sin \angle ADB = \sin \angle ADC, \text{ 所以}$$

$$\sin \angle BAD = \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ 因为 } \triangle ABC \text{ 是锐角三角形, 所以 } \angle BAD = \frac{\pi}{4}, \text{ 所以 } \sin \angle BAC = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}, \text{ 所以 } \triangle ABC \text{ 的面积为}$$

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} = \sqrt{3} + 1.$$

解法二: 倍长定比分线, 如图, 延长 AD , 过 C 作 AB 平行线交 AD 延长线于 E , 易知 $CE = \frac{c}{2} = \sqrt{2}$, $DE = \frac{AD}{2}$, $\angle DAC = 30^\circ$, 根据余弦定理得 $AC^2 + AE^2 - \sqrt{3}AC \cdot AE = CE^2 \Rightarrow AE^2 - 2\sqrt{3}AE + 2 = 0 \Rightarrow AE = \sqrt{3} + 1$, 或 $AE = \sqrt{3} - 1$ (舍), 所以 $S_{\triangle ABC} = 3S_{\triangle ACD} = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}AE \times AC \sin 30^\circ = \sqrt{3} + 1$.

17. 【解析】解法一: 在 $\triangle ABC$ 中, $AC^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3} \cos \theta = 4 - 2\sqrt{3} \cos \theta$, 设 $\angle ACB = \alpha$, 则 $\frac{1}{\sin \alpha} = \frac{AC}{\sin \theta}$, 即 $AC \sin \alpha = \sin \theta$, 在 $\triangle BCD$ 中, $BD^2 = AC^2 + (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}AC \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = 7 - 2\sqrt{3} \cos \theta + 2\sqrt{3}AC \sin \alpha$, 所以, $BD = \sqrt{7 + 2\sqrt{3}(\sin \theta - \cos \theta)} = \sqrt{7 + 2\sqrt{6} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}$, 其中, $\theta \in (0, \pi)$ $BD^2 = 7 + 2\sqrt{6} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leq 7 + 2\sqrt{6} = (\sqrt{6} + 1)^2$, 当且仅当 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 时等号成立, 所以, $BD \leq \sqrt{6} + 1$.

解法二：广义托勒密定理， $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$ ，当且仅当四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，取得等号，设 $AC = CD = t$ ， $AD = \sqrt{2}t$ ，则 $BD \cdot t \leq t + \sqrt{3} \times \sqrt{2}t$ ，可得 $BD \leq \sqrt{6} + 1$ ，当且仅当四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形， BD 取得最大值 $\sqrt{6} + 1$ 。

18. 【解析】解法一：由余弦定理得 $AB^2 = 1 + 4 - 2 \times 1 \times 2 \times \cos\theta = 5 - 4\cos\theta$ ，所以 $AB = \sqrt{5 - 4\cos\theta}$ ，所以 $AC = \sqrt{5 - 4\cos\theta}$ ，由正弦定理得 $\frac{AB}{\sin\theta} = \frac{OB}{\sin\angle OAB}$ ，即 $\sin\angle OAB = \frac{OB\sin\theta}{AB} = \frac{\sin\theta}{\sqrt{5 - 4\cos\theta}}$ ，所以 $\cos\angle OAB = \frac{2 - \cos\theta}{\sqrt{5 - 4\cos\theta}}$ ，所以 $\cos\angle OAC = \cos\left(\angle OAB + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2 - \cos\theta}{2\sqrt{5 - 4\cos\theta}} - \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{2\sqrt{5 - 4\cos\theta}}$ ，由余弦定理得： $OC^2 = 4 + 5 - 4\cos\theta - 2 \times 2 \times \sqrt{5 - 4\cos\theta} \times \left(\frac{2 - \cos\theta}{2\sqrt{5 - 4\cos\theta}} - \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{2\sqrt{5 - 4\cos\theta}}\right) = 5 + 2\sqrt{3}\sin\theta - 2\cos\theta = 5 + 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ ，因为 $\theta \in (0, \pi)$ ，所以当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时， OC 最大， OC 的最大值为 3。

解法二：广义托勒密定理， $OC \cdot AB \leq AC \cdot OB + AO \cdot BC$ ，当且仅当四边形 $OABC$ 为圆内接四边形，取得等号，设 $AB = AC = BC = t$ ，则 $OC \cdot t \leq t + 2t$ ，可得 $OC \leq 3$ ，此时 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 。

19. 【解析】解法一：如图 1，作 $AE \perp CD$ 交 CD 于 E ，令 $AE = y$ ， $DE = x$ ， $\angle ACD = \theta$ ，则 $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot |CD| \cdot |BC| \sin(\theta + 60^\circ)$ ， $|CA| = |CB| \Rightarrow S_{\triangle BCD} = 2|CA| \sin(\theta + 60^\circ) = |CA|(\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta) = y + \sqrt{3}(4 - x) = 4\sqrt{3} + (y - \sqrt{3}x)$ ，由于 $x^2 + y^2 = 4$ ，故令 $\angle ADC = \alpha$ ， $y - \sqrt{3}x = 2\sin\alpha - 2\sqrt{3}\cos\alpha = 4\sin(\alpha - 60^\circ) \leq 4$ ，当且仅当 $\alpha = 150^\circ$ 时等号成立，则 $S_{\triangle BCD} \leq 4\sqrt{3} + 4$ 。

图 1

解法二：根据 $\triangle ABC$ 特征旋转，印证了初中数学几何证明的一种方法，遇等腰，即旋转。如图 2，将 $\triangle ADC$ 绕 C 顺时针旋转 60° 得到 $\triangle BEC$ ，易知 $\triangle EDC$ 为等边三角形，作 $EF \perp DC$ 于 F ，则 $EF = 2\sqrt{3}$ ， $EB = 2$ ，故当且仅当 B, E, F 三点共线时， $\triangle BDC$ 的高取得最大值 $2 + 2\sqrt{3}$ ，此时 $S_{\triangle BCD} = 4 + 4\sqrt{3}$ 。

图 2

解法三：如图 3，取 AC, CD 中点 F, E ，在四边形 $EFBC$ 中，根据托勒密定理 $BF \cdot EC + EF \cdot BC \geq BE \cdot CF$ ，令 $BC = a$ ，则有 $1 \cdot a + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \geq \frac{1}{2}a \cdot BE \Rightarrow h \leq BE \leq 2 + 2\sqrt{3} \Rightarrow S_{\triangle BCD} \leq 4 + 4\sqrt{3}$ 。

图 3

20. $4 + \frac{5}{3}\sqrt{3}$
21. 【解析】(1) 因为 $AP = \sqrt{3}$ ， $PC = \sqrt{7}$ ， $\angle CAP = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$ ，在 $\triangle PAC$ 中，由余弦定理知： $PC^2 = AP^2 + AC^2 - 2AP \cdot AC \cos\angle CAP$ ，即 $7 = 3 + AC^2 - 2 \times \sqrt{3} \times AC \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，解得 $AC = 4$ ，(负值舍去)，所以在 $\triangle PAB$ 中， $PB = \frac{AB}{\sin\angle APB}$ ，在 $\triangle PAC$ 中， $\frac{PC}{\frac{1}{2}} = \frac{AC}{\sin\angle APC} \Rightarrow PC = \frac{AC}{2\sin\angle APC} \Rightarrow \sin\angle APC = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ，由于 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ACP}$ ，故 $\frac{\sin\angle CAB}{AP} = \frac{\sin\angle CAP}{AB} + \frac{\sin\angle PAB}{AC}$ ，所以 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2AB} + \frac{1}{AC} = \frac{1}{2PB\sin\angle APB} + \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4PB} + \frac{1}{4}$ ，所

以 $PB = \sqrt{7}$;

(2) 设 $\angle APB = \theta$, 由 (1) 得, 所以 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2AB} +$

$\frac{1}{AC} = \frac{1}{2PB\sin\theta} + \frac{1}{2PC\sin\theta} \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{PB} + \frac{1}{PC}$, 于是

$\frac{2}{PB} + \frac{1}{PC} = \frac{2}{PB} + \sin\theta - \frac{1}{PB} = \frac{1}{PB} + \sin\theta$, 因为 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\frac{1}{PB} = \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta$, 所以 $\frac{2}{PB} + \frac{1}{PC} = \frac{2}{PB} +$

$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta + \sin\theta = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$, 由题意

知, $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3} < \theta + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$, 可得:

$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$, 即 $\frac{2}{PB} + \frac{1}{PC}$ 的取值范围为 $\left(1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$.

22. 【解析】解法一: 因为 $2AB = 3AC$, 令 $AB = 3t$,

则 $AC = 2t$, $\triangle ABC$ 中, $\cos \angle BAC = \cos 60^\circ =$

$\frac{9t^2 + 4t^2 - 49}{2 \cdot 3t \cdot 2t} = \frac{1}{2}$, 所以 $t = \sqrt{7}$, $AB = 3\sqrt{7}$,

$AC = 2\sqrt{7}$, 由余弦定理可知 $\cos B = \frac{63 + 49 - 28}{2 \times 7 \times 3\sqrt{7}} =$

$\frac{2\sqrt{7}}{7}$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{21}}{7}$, $\sin \angle APB =$

$\sin[\pi - (\angle B + \angle BAP)] = \sin(B + 30^\circ) = \sin B \cdot$

$\cos 30^\circ + \cos B \cdot \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{21}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{7}}{7} \cdot \frac{1}{2} =$

$\frac{5\sqrt{7}}{14}$. 由正弦定理可知 $\frac{AP}{\sin B} = \frac{AB}{\sin \angle APB}$, 即 $\frac{AP}{\frac{\sqrt{21}}{7}} =$

$\frac{3\sqrt{7}}{5\sqrt{7}}$, 求得 $AP = \frac{6\sqrt{21}}{5}$.

解法二: 因为 $2AB = 3AC$, 令 $AB = 3t$, 则 $AC =$

$2t$, $\triangle ABC$ 中, $\cos \angle BAC = \cos 60^\circ =$

$\frac{9t^2 + 4t^2 - 49}{2 \cdot 3t \cdot 2t} = \frac{1}{2}$, 所以 $t = \sqrt{7}$, $AB = 3\sqrt{7}$, $AC =$

$2\sqrt{7}$, 令 $AP = x$, 由 $S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ACP} = S_{\triangle ABC}$, 即

为 $\frac{1}{2}cx \cdot \sin \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}bx \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3}$,

可得 $(b+c)x = 5\sqrt{7}x = 42\sqrt{3}$, $x = \frac{6\sqrt{21}}{5}$.

23. 【解析】(1) 因为 $a = 3$, $b = 2\sqrt{6}$, $B = 2A$. 所以

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{b}{2\sin A \cos A}$, 所以 $\cos A = \frac{b}{2a} = \frac{2\sqrt{6}}{2 \times 3} =$

$\frac{\sqrt{6}}{3}$; (2) 因为 $A \in (0, \pi)$, 可得 $\sin A =$

$\sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 因为 $B = 2A$, 所以 $\cos B =$

$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin B =$

$\sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 因为 $A + B + C = \pi$, 所以

$\cos C = -\cos(A + B) = \sin A \sin B - \cos A \cos B =$

$\frac{\sqrt{6}}{9}$, 所以 $\cos B > \cos C$, 又因为函数 $y = \cos x$ 在

$(0, \pi)$ 上单调递减, 且 $B, C \in (0, \pi)$, 所以

$\angle B < \angle C$.

24. 【解析】(1) 证明: 由 $\sin(B + C) = \frac{2S}{a^2 - c^2}$, 即

$\sin A = \frac{2S}{a^2 - c^2}$, 所以 $\sin A = \frac{bc \sin A}{a^2 - c^2}$, $\sin A \neq 0$, 所

以 $a^2 - c^2 = bc$, 因为 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, 所

以 $a^2 - c^2 = b^2 - 2bccosA$, 所以 $b^2 - 2bccosA = bc$,

所以 $b - 2ccosA = c$, 所以 $\sin B - 2\sin C \cos A = \sin C$,

所以 $\sin(A + C) - 2\sin C \cos A = \sin C$, 所以 $\sin A \cos C$

$- \cos A \sin C = \sin C$, 所以 $\sin(A - C) = \sin C$, 因为

$A, B, C \in (0, \pi)$, 所以 $A = 2C$; (2) 因为 $A =$

$2C$, 所以 $B = \pi - 3C$, 所以 $\sin B = \sin 3C$. 因为

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 且 $b = 2$, 所以 $a = \frac{2\sin 2C}{\sin 3C}$, 所以 $S =$

$\frac{1}{2} ab \sin C = \frac{2\sin 2C \sin C}{\sin(2C + C)} = \frac{2\sin 2C \sin C}{\sin 2C \cos C + \cos 2C \sin C} =$

$\frac{2\tan 2C \tan C}{\tan 2C + \tan C} = \frac{4\tan C}{3 - \tan^2 C} = \frac{4}{\frac{3}{\tan C} - \tan C}$, 因为 $\triangle ABC$

为锐角三角形, 所以 $\begin{cases} A = 2C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \\ B = \pi - 3C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \\ C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$, 所以

$C \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $\tan C \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$, 因为 $S =$

$\frac{4}{3 - \tan C} - \tan C$ 为增函数, 所以 $S \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2 \right)$.

25. 【解析】(1) 由题意 $\sin A = \sin(135^\circ - C) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 $\frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 由正弦定理可得 $BC = \frac{\sqrt{5}\sin A}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{5} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3$; (2) 由正弦定理可得 $AB = \frac{\sqrt{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{2}$, 所以 $2\left[\left(\frac{|AB|}{2} \right)^2 + |CD|^2 \right] = |AC|^2 + |BC|^2$ 所以 $CD = \sqrt{5}$.

26. 【解析】(1) 在 $\triangle ABD$ 中, $\frac{AB}{\sin \angle BDA} = \frac{BD}{\sin \frac{\pi}{6}}$, 在 $\triangle ACD$ 中, $\frac{AC}{\sin \angle CDA} = \frac{CD}{\sin \frac{\pi}{6}}$, 相除得 $AC = 2AB$. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \frac{\pi}{3} = 3AB^2 = 9$, 所以 $AB = \sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{3}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$; (2) 因为 $\vec{AD} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2}$, 所以 $\begin{cases} \vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| = |AD|^2 - |BD|^2 \\ |AB|^2 + |AC|^2 = 2(|AD|^2 + |BD|^2) \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| = 9 \\ |AB|^2 + |AC|^2 = 18 \end{cases}$ 所以 $(AB - AC)^2 = 0$ 即: $AB = AC$, 又 $\angle C = 60^\circ$, 所以三角形 ABC 为等边三角形.

27. 【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC$, 所以 $AC^2 = 1 + 3 - 2\sqrt{3} \cos 30^\circ = 1$, 所以 $AC = 1$ 在 $\triangle ACD$ 中, $AD^2 = AC^2 + DC^2 - 2AC \cdot DC \cos \theta = 4 - 2\sqrt{3} \cos \theta$, 因为 $\frac{AC}{\sin \theta} = \frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{1}{\sin \angle ACB}$, 所以 $\sin \angle ACB = \frac{\sin \theta}{x}$. 在 $\triangle BCD$ 中, $BD = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3}x)^2 - 2\sqrt{3} \cdot (\sqrt{3}x) \cos \left(\frac{\pi}{2} + \angle ACB \right)} =$

$\sqrt{3 + 3x^2 + 6x \sin \angle ACB} = \sqrt{3 + 12 - 6\sqrt{3} \cos \theta + 6x \frac{\sin \theta}{x}} = \sqrt{15 - 6\sqrt{3} \cos \theta + 6 \sin \theta} = \sqrt{15 + 12 \left(\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right)} = \sqrt{15 + 12 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)}$, 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $\theta - \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right)$, 当 $\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 时 BD 取到最大值 $3\sqrt{3}$.

解法二: 由于此题属于解答题, 广义托勒密定理不能写在答题卷上, 但此题可以很快算出结果, 就是 $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC \Rightarrow BD \cdot AC \leq \sqrt{3}AC + AC \cdot 2\sqrt{3} \Rightarrow BD \leq 3\sqrt{3}$.

28. 【解析】(1) 右 = $\frac{1 - \cos A}{\sin A} = \frac{1 - (1 - 2\sin^2 \frac{A}{2})}{2\sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} =$

$\frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos \frac{A}{2}} = \tan \frac{A}{2} =$ 左; (2) ①原式 $\frac{1 - \cos A}{\sin A} +$

$\frac{1 - \cos B}{\sin B} + \frac{1 - \cos C}{\sin C} + \frac{1 - \cos D}{\sin D} = \frac{2}{\sin A} + \frac{2}{\sin B}$, 连接 AC , 在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ACB$ 中, 所以 $AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = AD^2 + DC^2 - 2AD \cdot DC \cos D$, 所以 $36 + 9 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos B = 25 + 16 + 2 \times 5 \times 4 \times \cos B$, 所以 $4 = 76 \cos B$, 所以 $\cos B = \frac{1}{19}$, 因

为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B = \frac{6\sqrt{10}}{19}$. 连接 BD , 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle DBC$ 中 $AD^2 + AB^2 - 2AD \cdot AB \cdot \cos A = CD^2 + CB^2 - 2CD \cdot CB \cdot \cos C$, 所以 $\cos A = \frac{3}{7}$, 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $\sin A = \frac{2\sqrt{10}}{7}$, 所以原式 = $\frac{2}{\sin A} + \frac{2}{\sin B} = \frac{4\sqrt{10}}{3}$.

②在 $\triangle ACB$ 和 $\triangle ACD$ 中, 由 $AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2AD \cdot DC \cos D$, 所以 $36 + 9 - 2 \times 6 \times 3 \times \cos B = 25 + 16 - 2 \times 5 \times 4 \times \cos D$, 所以 $1 - 9 \cos B = -10 \cos D$, 因为 $S = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B + \frac{1}{2} AD \cdot DC \cdot \sin D = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times \sin B + \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \times \sin D = 9 \sin B + 10 \sin D$, 所以 $\begin{cases} 1 - 9 \cos B = -10 \cos D \\ S - 9 \sin B = 10 \sin D \end{cases}$, 平方相加 $1 + S^2 = 81 + 100 - 180 \cos(B + D)$ 所以 $S^2 = 180 - 180 \cos(B + D)$, 当且仅当 $B + D = \pi$ 时, S^2 取最大值 360, 所以面积的最大值为 $6\sqrt{10}$.

第4章 天龙八部定五湖 圆锥曲线满分路

专题1 焦长与焦比体系

同步训练1

1. C 【解析】 $S_{\triangle AF_1F_2} = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha} \cdot 2c \sin \alpha \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$,
故选 C.

2. A 【解析】解法一: 由 $|AF| = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha} = 2$,
 $|BF| = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha} = \frac{6}{5}$, $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{4}{3}$.

解法二: 由 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{a - c \cos \alpha}{b^2} + \frac{a + c \cos \alpha}{b^2}$
 $= \frac{2a}{b^2} = \frac{4}{3}$, 故选 A.

3. 【解析】易知 $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 故 $S_{A_0B} =$
 $\frac{ab^2 c \sin \alpha}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} = \frac{5}{3}$, 故答案为 $\frac{5}{3}$.

4. 【解析】 $|AB| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$, $|F_1A| +$
 $|F_1B| = 4a - |AB| = \frac{8\sqrt{2}}{3}$, 故答案为 $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

5. 【解析】由 $|MF| = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha}$, $|NF_1| = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha}$,
 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $b = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. $\frac{|MF|}{|NF|} = \frac{9 + 4\sqrt{2}}{7}$
或 $\frac{9 - 4\sqrt{2}}{7}$.

6. 【解析】(1) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$;

(2) $\frac{1}{|F_1A|} + \frac{1}{|F_1B|} = \frac{a - c \cos \alpha}{b^2} + \frac{a + c \cos \alpha}{b^2} =$
 $\frac{2a}{b^2} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

7. 【解析】(1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) $S_{A_0B} = \frac{ab^2 c \sin \alpha}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{2} \sin \alpha}{2 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{2} \sin \alpha}{1 + \sin^2 \alpha} =$
 $\frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{\sin \alpha} + \sin \alpha} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当仅当 $\alpha = 90^\circ$, S_{A_0B} 最大,

$l: x = 1$.

8. 【解析】(1) 因为 $AC \perp BD$, 所以 P 是以 F_1F_2 为
直径的圆, 所以 $x_0^2 + y_0^2 = 1$, 所以 $\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{2} \leq \frac{x_0^2}{2}$

$$+ \frac{y_0^2}{2} = \frac{1}{2};$$

(2) 设 BD 与 x 轴的夹角为 α , 则 AC 与 x 轴的夹
角为 $90^\circ - \alpha$.

$$S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} \cdot$$

$$\frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{2} \cdot \frac{48}{6 + \left(\frac{\sin 2\alpha}{2}\right)^2} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{48}{6 + \frac{1}{4}} = \frac{96}{25}.$$

同步训练2

9. B 【解析】 $|MF_2| + |NF_2| - |MN| = |MF_2| +$
 $|NF_2| - (|MF_1| + |NF_1|) = |MF_2| - |MF_1| +$
 $|NF_2| - |NF_1| = 4a = 8$, 故选 B.

10. D 【解析】 $\tan \alpha = 2$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $a^2 - c^2 \cos^2 \alpha <$
 $0 \Rightarrow e > \frac{1}{\cos \alpha}$, $e > \sqrt{5}$, 故选 D.

11. C 【解析】解法一: 直线 l 与右支有且只有一个
交点, 则此直线斜率的绝对值小于等于渐近线的
斜率, 即 $\frac{b}{a} \geq \sqrt{3}$, $\frac{b}{a} \geq \sqrt{3}$, $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} =$
 $1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2 \geq 4$, 所以 $e \geq 2$, 故选 C.

解法二: 当直线与双曲线交于两支时, $a^2 -$
 $c^2 \cos^2 \alpha < 0 \Rightarrow e > \frac{1}{\cos \alpha} = 2$, 由于与渐近线平行的
直线也与双曲线有仅有一个交点, 故 $e = 2$ 时
也成立, 故选 C.

12. 【解析】 $C_{ABF_2} = 4a + 2l = 16 + 12 = 28$. 故答案
为 28.

13. 【解析】 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, $C_{ABF_2} = 4a + 2l = 8 + 10 =$
18, 故答案为 18.

14. 【解析】 $\tan \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $|AB| =$
 $\left| \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} \right| = \left| \frac{2 \times 3 \times 4^2}{9 - 25 \times \frac{1}{2}} \right| = \frac{192}{7}$.

15. 【解析】(1) $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|AB| =$
 $\left| \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} \right| = \left| \frac{2 \times 1 \times 3}{1 - 4 \times \frac{3}{4}} \right| = 3$; (2) $C_{ABF_1} =$
 $4a + 2|AB| = 4 + 2 \times 3 = 10$.

16. 【解析】 $a = b = 2$, $c = 2\sqrt{2}$, $e = \sqrt{2}$, 焦点到准线
的距离 $p = \frac{b^2}{c} = \sqrt{2}$, 由于直线倾斜角为 150° ,

所以 $\theta = 30^\circ$, 注意到 P, Q 在双曲线两支上, 由焦长公式极坐标式 $|PF| \cdot |FQ| = \frac{ep}{e \cos \theta - 1}$.

$$\frac{ep}{e \cos \theta + 1} = \frac{e^2 p^2}{e^2 \cos^2 \theta - 1} = 8 \frac{4}{2 \times \frac{3}{4} - 1} = 8.$$

17. 【解析】(1) 联立 $\begin{cases} y = x + 1 \\ \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow (b^2 - 2)x^2 - 4x - 2 - 2b^2 = 0, \Delta = 16 - 4(b^2 - 2)(-2 - 2b^2) \geq 0$, 解得 $b \geq 1$ 或 $b \leq -1$ (舍), 所以 $e = \frac{c}{a} =$

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{2 + b^2}}{\sqrt{2}} \geq \frac{\sqrt{6}}{2};$$

(2) 由于 $\vec{FP} = \frac{1}{5}\vec{FQ}$, 故 P, Q 分别位于双曲线两支上, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c \cos \alpha - a > 0$, 则 $\frac{b^2}{c \cos \alpha - a} = \frac{5b^2}{c \cos \alpha + a} \Rightarrow e \cos \alpha = \frac{5 + 1}{5 - 1} = \frac{3}{2} \Rightarrow e = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = 3, b = \sqrt{7}$, 所以 $C: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{7} = 1$.

18. 【解析】(1) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 设 BD 与 x 轴的夹角为 α , 则 AC 与 x 轴的夹角为 $90^\circ - \alpha$.

$$S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2 \cos^2 \alpha|} \cdot \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2 \sin^2 \alpha|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{36}{|-3 + 4 \cdot \left(\frac{\sin 2\alpha}{2}\right)^2|} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{36}{|-3 + 1|} = 9.$$

同步训练 3

19. A 【解析】因为 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos 60^\circ} = 3$, 所以 $p = 3(1 - \cos 60^\circ) = \frac{3}{2}$, 所以 $y^2 = 2px = 3x$. 故选 A.
20. C 【解析】 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} \geq 2p$, 故选 C.
21. C 【解析】因为 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha} = 5$, 所以 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha} = \frac{2}{1 + \frac{3}{5}} = \frac{5}{4}$, 故选 C.
22. C 【解析】因为 $p = \frac{1}{2}$, 且 $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$,

所以 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha} = 1$, 故选 C.

23. C 【解析】因为 $|AF| = |AK|$, 且 $\angle FAK = 60^\circ$, 所以 AKF 为等边三角形, 所以 $S_{AKF} = \frac{\sqrt{3}}{4} |AF|^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{p}{1 - \cos 60^\circ}\right)^2 = 4\sqrt{3}$, 故选 C.
24. C 【解析】 $S_{ABEF} = S_{ABF} + S_{BEF} = \frac{\sqrt{3}}{4} |AF|^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} |AF|^2 = 6\sqrt{3}$, 故选 C.
25. C 【解析】因为 $\theta \geq \frac{\pi}{4}$. 所以 $\cos \theta \in \left(-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, $|PA| = \frac{p}{1 - \cos \theta} \in \left(\frac{1}{4}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 故选 C.
26. B 【解析】 $|FA| = \frac{p}{1 - \cos 60^\circ} = 2p$, 根据余弦定理: $|OA|^2 = |FA|^2 + |OF|^2 - 2|FA||OF| \cos 120^\circ = \frac{21}{4} p^2$, 所以 $|OA| = \frac{\sqrt{21}}{2} p$, 故选 B.
27. A 【解析】因为 A 为焦点, 所以 $|BC| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{8p}{3} = \frac{32}{3}$, 所以 $x_p + \frac{p}{2} = x_p + 2 = \frac{32}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{16}{3}$, 所以 $x_p = \frac{10}{3}$, 故选 A.
28. A 【解析】如图, 作 $QR \perp l$, 则 $|QF| = |QR|$, 因为 $\vec{PF} = 2\vec{FQ}$, 所以 $|PQ| = 3|QR|$, $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $|QF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha} = \frac{4}{1 - \frac{1}{3}} = 6$, 故选 A.

29. B 【解析】易知焦长 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{4}{\sin^2 \alpha} \geq 4$, 则 $|AB| = 4$ 时仅有有一条, 即 $\sin \alpha = 1$ 时, AB 为通径, 当 $|AB| \in [5, 2015]$ 时, $\sin \alpha \in (0, 1)$ 时, 有两解, 故存在 $2011 \times 2 = 4022$ 条弦, 故选 B.

30. 【解析】 $S_{AOB} = \frac{2P}{\sin \alpha} \cdot \frac{p \sin \alpha}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{p^2}{2 \sin \alpha} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

同步训练 4

31. D 【解析】如图所示，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，令 $x = -c$ ，得 $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) = \frac{b^4}{a^2}$ ，所以 $|AB| = 2|y| = \frac{2b^2}{a} = 3$ ，又 $\triangle ABF_2$ 的内切圆面积为 $\frac{9\pi}{16}$ ，内切圆半径为 $r = \frac{3}{4}$ ，由椭圆的定义可得 $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a$ ， $\triangle ABF_2$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot 4a$ ，即有 $a = 2c$ ，又 $3a = 2b^2$ ， $a^2 - b^2 = c^2$ ，解得 $a = 2$ ， $b = \sqrt{3}$ ， $c = 1$ ，则 $A\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ ， $F_2(1, 0)$ ，则直线 AF_2 的方程是 $y - 0 = -\frac{3}{4}(x - 1)$ ，即为 $3x + 4y - 3 = 0$ ，故选 D.

32. B 【解析】若 $|AF_1| : |AB| = 3 : 4$ ， $|BF_2| = 3|AF_2|$ ，则可设 $|AF_1| = 3m$ ， $|AB| = 4m$ ， $|AF_2| = \frac{1}{4}|AB|$ ，则 $|AF_2| = m$ ， $|BF_2| = 3m$ ，由双曲线的定义，得 $|AF_1| - |AF_2| = 2m = 2a$ ， $|BF_1| - |BF_2| = |BF_1| - 3m = 2a$ ，可得 $m = a$ ， $|BF_1| = 5a$ ，则此时满足 $|AF_1|^2 + |AB|^2 = |BF_1|^2$ ，所以 $\triangle ABF_1$ 是直角三角形，且 $\angle F_2AF_1 = 90^\circ$ ，所以由勾股定理，得 $|AF_1|^2 + |AF_2|^2 = |F_1F_2|^2$ ，即 $(3a)^2 + a^2 = (2c)^2$ ，可得 $10a^2 = 4c^2$ ，得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ ，故选 B.
33. A 【解析】解法一：如图，因为 $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$ ，且 $5|PF_1| = 4|QF_1|$ ，所以 $|PF_1| = 2c - 2a$ ， $|QF_1| = \frac{5}{4}|PF_1| = \frac{5}{2}c - \frac{5}{2}a$ ，所以 $|QF_2| = |PF_1| + 2a = \frac{5}{2}c - \frac{1}{2}a$ ，取 PF_1 的中点 M ，则 $F_2M \perp QP$ 。在 $\text{Rt}\triangle QMF_2$ 中， $|MF_2|^2 = (2c)^2 - (c - a)^2 = 3c^2 - a^2 +$

$$2ac, |QM|^2 = \left(\frac{5}{2}c - \frac{5}{2}a + c - a\right)^2 = \frac{49}{4}c^2 + \frac{49}{4}a^2 - \frac{49}{2}ac, |QF_2|^2 = \frac{25}{4}c^2 + \frac{1}{4}a^2 - \frac{5}{2}ac \Rightarrow 9c^2 - 20a + 11a^2 = 0 \Rightarrow a = c \text{ (舍去)} \text{ 或 } 9c = 11a,$$

所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{11}{9}$ ，故选 A.

解法二：因为 $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$ ，且 $5|PF_1| = 4|QF_1| \Rightarrow |QF_1| = \frac{5}{4}|PF_1|$ ，所以 $|PF_1| = 2c -$

$$2a, |QF_1| = \frac{\frac{5}{4} + 1}{2} \frac{b^2}{a} = \frac{9b^2}{8a}, |PF_1| = \frac{9b^2}{8a} \times \frac{4}{5} = \frac{9b^2}{10a}, \text{ 所以 } |PF_2| = |PF_1| + 2a \Rightarrow 2c = \frac{9b^2}{10a} + 2a = \frac{9c^2 - 9a^2}{10a} \Rightarrow 9c^2 - 20ac + 11a^2 = 0, \text{ 所以 } e = \frac{c}{a} = \frac{11}{9}, \text{ 故选 A.}$$

34. A 【解析】可得 $\triangle MNF_2$ 为等腰直角三角形，设 $|MF_2| = |NF_2| = m$ ，则 $|MN| = \sqrt{2}m$ ，由 $|MF_2| - |MF_1| = 2a$ ， $|NF_1| - |NF_2| = 2a$ ，两式相加可得 $|NF_1| - |MF_1| = |MN| = 4a$ ，即有 $m = 2\sqrt{2}a$ ，在直角三角形 HF_1F_2 中可得 $4c^2 = 4a^2 + (2a + 2\sqrt{2}a - 2a)^2$ ，化为 $c^2 = 3a^2$ ，即 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$ 。故选 A.

35. B 【解析】设 $|BF_2| = n$ ，由双曲线的定义可得， $|BF_1| = |BF_2| + 2a = n + 2a$ ，设 $|AF_2| = m$ ，有 $|AF_1| = m - 2a$ ，即 $|AB| = 4a + n - m$ ， $AB \perp BF_2$ ，可得 $(4a + n - m)^2 + n^2 = m^2$ ， $\cos \angle F_1AF_2 = -\frac{4}{5}$ 即有 $\cos \angle F_2AB = \frac{4}{5}$ ，

$\sin \angle F_2AB = \frac{n}{m} = \frac{3}{5}$, 解得 $n = 2a$, $m = \frac{10}{3}a$,

在直角三角形 BF_1F_2 中, $|F_1F_2|^2 = |BF_1|^2 + |BF_2|^2$, 即有 $4c^2 = (2a + n)^2 + n^2 = (4a)^2 + 4a^2$, 即有 $c^2 = 5a^2$, 即离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$. 故

选 B.

36. C 【解析】如图所示, 设双曲线的左焦点为 F' ,

连接 AF' , BF' . 因为 $\vec{AF} \cdot \vec{BF} = 0$, 所以 $AF \perp FB$, 所以四边形 $AFBF'$ 为矩形. 因此 $|AB| = |FF'|| = 2c$. 则 $|BF| = 2c \sin \theta$, $|AF| = 2c \cos \theta$.

因为 $|AF'| - |AF| = 2a$,

所以 $2c \sin \theta - 2c \cos \theta = 2a$. 即 $c(\cos \theta - \sin \theta) = -a$, 则 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4})}$,

因为 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12})$, 所以 $\theta - \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{6})$,

则 $\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) \in (0, \frac{1}{2})$, $\sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4}) \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 则 $\frac{1}{\sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4})} > \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$, 即 $e > \sqrt{2}$,

故双曲线离心率的取值范围是 $(\sqrt{2}, +\infty)$, 故选 C.

37. D 【解析】设 $AF_1 = m$, $AF_2 = n$. 如图所示, 由题

意可得: $\text{Rt} \triangle AF_1F_2 \sim \text{Rt} \triangle OMF_2$, 所以 $\frac{AF_1}{AF_2} =$

$\frac{OM}{OF_2} = \frac{1}{3}$. 则 $m + n = 2a$, $m^2 + n^2 = 4c^2$, $n = 3m$.

化为: $m^2 = \frac{2b^2}{3}$, $n^2 = 9m^2 = 6b^2$. 所以 $\frac{2b^2}{3} + 6b^2 =$

$4c^2$. 所以 $\frac{5(a^2 - c^2)}{3} = c^2$, 化为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{10}}{4}$. 故

选 D.

38. D 【解析】解法一: 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = \sqrt{3}x \end{cases}$, 消 y 可得

得 $(3a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 解得 $x = \pm \frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}$,

分别代入 $y = \pm \frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}$, 所以 $A(\frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}},$

$\frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}})$, $B(-\frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, -\frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}})$,

所以 $\vec{AF} = (\frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}} + c, \frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}})$, $\vec{BF} =$

$(c - \frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, -\frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}})$, 所以 $\vec{AF} \cdot$

$\vec{BF} = c^2 - \frac{a^2b^2}{3a^2 + b^2} - \frac{3a^2b^2}{3a^2 + b^2} = 0$, 所以 $c^2 =$

$\frac{4a^2b^2}{3a^2 + b^2}$ (*), 把 $b^2 = a^2 - c^2$ 代入 (*) 式并整

理得 $4a^2c^2 - c^4 = 4a^2(a^2 - c^2)$, 两边同除以 a^4

并整理得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$, 解得 $e^2 = 4 - 2\sqrt{3}$,

所以 $e = \sqrt{3} - 1$, 故选 D.

解法二: 如图, 易知 AF_1BF_2 为矩形, 且 $AO =$

$OF_1 = OF_2 = AF_2 = c$, 故 $AF_1 = \sqrt{3}c$, $e =$

$\frac{2c}{AF_1 + AF_2} = \sqrt{3} - 1$. 故选 D.

39. D 【解析】解法一: $PF_1 \perp PQ$ 且 $|PF_1| =$

$|PQ|$, 可得 $\triangle PQF_1$ 为等腰直角三角形, 设

$|PF_1| = t$, $|QF_1| = m$, 由椭圆的定义可得

$|PF_2| = 2a - t$, $|QF_2| = 2a - m$, 即有 $t = 4a -$

$t - m$, $m = \sqrt{2}t$, 则 $t = 2(2 - \sqrt{2})a$, 在直角三角

形 PF_1F_2 中, 可得 $t^2 + (2a - t)^2 = 4c^2$, $4(6 - 4\sqrt{2})a^2 + (12 - 8\sqrt{2})a^2 = 4c^2$, 化为 $c^2 = (9 - 6\sqrt{2})a^2$, 可得 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{6} - \sqrt{3}$, 故选 D.

解法二: 如图, 易知 $\angle PQF_1 = 45^\circ$, 则 $\lambda = \frac{S_{PF_1F_2}}{S_{QF_1F_2}} = \frac{b^2 \tan 45^\circ}{b^2 \tan \frac{Q}{2}} \Rightarrow \lambda \tan \frac{Q}{2} = 1$, 易知 $\tan \frac{Q}{2} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$, 故

$$\lambda = \sqrt{2} + 1, \text{ 则 } |PF_2| = \frac{\sqrt{2} + 2}{2} \cdot \frac{b^2}{a}, |PF_1| = \left(\frac{\lambda + 1}{2} + \frac{\lambda + 1}{2\lambda}\right) \frac{b^2}{a} = (\sqrt{2} + 1) \frac{b^2}{a}, \text{ 所以 } PF_1 : PF_2 :$$

$F_1F_2 = \sqrt{2} : 1 : \sqrt{3}$, 得 $e = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{6} - \sqrt{3}$, 故选 D.

40. B 【解析】设双曲线的另一个焦点为 E , 由题意可得在直角三角形 ABF 中, OF 为斜边 AB 上的中线, 即有 $|AB| = 2|OA| = 2|OF| = 2c$, 令 $|BF| = |AE| = m$, $|AF| = n$, $|CF| = 2n$, 由双曲线的定义有, $|CE| - |CF| = |AE| - |AF| = 2a$, 所以 $CE = 2n + 2a$, 在直角三角形 EAC 中, $m^2 + (3n)^2 = (2n + 2a)^2$, 代入 $2a = m - n$, 化简可得 $m = 4n$, 又 $m - n = 2a$ 得 $n = \frac{2}{3}a$, $m = \frac{8}{3}a$, 在直角三角形 EAF 中, $m^2 + n^2 = (2c)^2$, 即为 $\frac{4}{9}a^2 + \frac{64}{9}a^2 = 4c^2$, 可得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{17}}{3}$. 故选 B.

41. D 【解析】设 $|F_1B| = k (k > 0)$, 则 $|AF_1| = 3k$, $|AB| = 4k$, 所以 $|AF_2| = 2a - 3k$, $|BF_2| = 2a -$

k , 因为 $AB \perp AF_2$, 所以 $|BF_2|^2 = |AF_2|^2 + |AB|^2$, 故 $a = 3k$, 所以 $\triangle AF_1F_2$ 是等腰直角三角形, $\Rightarrow c = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, 椭圆 E 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 D.

42. A 【解析】 F_1, F_2 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 在 $\text{Rt} \triangle ABF_1$ 中, $|OF_1| = c$, 所以 $|AB| = 2c$, 在直角三角形 ABF_1 中, $\angle ABF_1 = \alpha$, 可得 $|AF_2| = 2c \cos \alpha$, $|BF_2| = 2c \cos \alpha$, 取左焦点 F_1 , 连接 AF_1, BF_1 , 可得四边形 AF_2BF_1 为矩形, 所以 $||BF_2| - |AF_2|| = |AF_1| - |BF_1| = 2c |\cos \alpha - \sin \alpha| = 2a$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{|\cos \alpha - \sin \alpha|} = \frac{1}{\sqrt{2} \left| \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) \right|}$, 因为 $\alpha = \frac{\pi}{12}$, 所以 $\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{12} \right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 所以 $e = \sqrt{2}$, 故选 A.

43. D 【解析】解法一: 由椭圆的焦点在 x 轴上, 由 F_1, H 是线段 MN 的三等分点, 则 H 为 NF_1 的中点, 所以 $NF_2 \perp F_1F_2$, 设 $N \left(c, \frac{b^2}{a} \right)$, 即 $N \left(c, \frac{4}{a} \right)$, 根据相似三角形的性质, $M \left(-2c, -\frac{2}{a} \right)$, 将 M 代入椭圆方程: $\frac{4c^2}{a^2} + \frac{4}{4a^2} = 1$, 由 $c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 4$, 解得: $a^2 = 5$, 所以 $\triangle F_2MN$ 的周长 $4a = 4\sqrt{5}$, 故选 D.

解法二: 因为 $|NF_1| = \frac{3}{2} \cdot \frac{b^2}{a}$, $|NF_2| = \frac{b^2}{a}$, 所以 $\frac{5}{2} \cdot \frac{b^2}{a} = 2a$, 所以 $a^2 = 5$, 所以 $\triangle F_2MN$ 的周长 $4a = 4\sqrt{5}$, 故选 D.

44. 【解析】解法一: 如图所示, 设 $|QF_2| = m$, $|PF_2| = n$, 则 $|QF_1| = 2a - m$, $|PF_1| = 2a - n$. 因为 $4|PF_1| = 3|PQ|$, 所以 $4(2a - n) = 3(m + n)$, 因为 $PF_1 \perp PQ$, 所以 $(2a - n)^2 + n^2 = 4c^2$, $(2a - n)^2 + (m + n)^2 = (2a - m)^2$.

$$\text{联立} \begin{cases} 4(2a - n) = 3(m + n) \\ (2a - n)^2 + n^2 = 4c^2 \\ (2a - n)^2 + (m + n)^2 = (2a - m)^2 \end{cases},$$

化为 $n=a$, 代入可得 $a^2=2c^2$. 解得 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解法二: 令 $|PQ|=4x$, $|PF_2|=m$, 则 $|QF_1|=5x$, $|PF_1|=3x$. $\lambda = \frac{S_{PF_1F_2}}{S_{QF_1F_2}} = \frac{b^2 \tan 45^\circ}{b^2 \tan \frac{Q}{2}}$
 $\Rightarrow \lambda \tan \frac{Q}{2} = 1$, 易知 $\tan \frac{Q}{2} = \frac{1}{3}$, 故 $\lambda = 3$, 则 $|PF_2| = \frac{4}{2} \cdot \frac{b^2}{a}$, $|PQ| = 4x = \frac{8}{3} \cdot \frac{b^2}{a} \Rightarrow x = \frac{2b^2}{3a}$, $|PF_1| = 3x = \frac{2b^2}{a}$, $PF_1 : PF_2 : F_1F_2 = 1 : 1 : \sqrt{2}$, 得 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

45. 【解析】解法一: 如图, 由题意, $A(-c, -\frac{b^2}{a})$, $F_2(c, 0)$, $C(x, y)$, 因为 $\vec{AC} = 3 \vec{F_2C}$, 即为 $(x+c, y+\frac{b^2}{a}) = 3(x-c, y)$, 所以 $3y = y + \frac{b^2}{a}$, $x+c = 3x-3c$. 所以 $C(2c, \frac{b^2}{2a})$, 代入椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 可得 $\frac{4c^2}{a^2} + \frac{b^2}{4a^2} = 1$, 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 整理得 $5c^2 = a^2$, 解得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

解法二: 因为 $|AF_2| = \frac{3}{2} \cdot \frac{b^2}{a}$, $|AF_1| = \frac{b^2}{a}$, 所以 $\frac{5}{2} \cdot \frac{b^2}{a} = 2a$, 所以 $4a^2 = 5b^2 = 5a^2 - 5c^2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

46. 【解析】解法一: 由 $\vec{AF_1} \cdot \vec{F_1F_2} = 0$, 则 $AF_1 \perp$

F_1F_2 , 则 $A(-c, \frac{b^2}{a})$, 设 $B(x, y)$, $\vec{AF_2} = \lambda \vec{F_2B}$, 则 $(2c, -\frac{b^2}{a}) = \lambda(x-c, y)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 2c = \lambda(x-c) \\ -\frac{b^2}{a} = \lambda y \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} x = \frac{c(\lambda+2)}{\lambda} \\ y = -\frac{b^2}{a\lambda} \end{cases},$$

则 $B(\frac{c(\lambda+2)}{\lambda}, -\frac{b^2}{a\lambda})$, 将 B 代入椭圆方程: $\frac{c^2(\lambda+2)^2}{a^2\lambda^2} + \frac{b^2}{\lambda^2 a^2} = 1$, 整理得: $c^2(\lambda^2 + 4\lambda + 3) = a^2(\lambda^2 - 1)$, 由 $e = \frac{c}{a}$, 则 $\frac{1}{e^2} = \frac{\lambda^2 + 4\lambda + 3}{\lambda^2 - 1} = 1 + 4 \times \frac{1}{\lambda - 1}$, 由 $\lambda \in [2, 3]$, 则 $2 \leq \frac{1}{\lambda - 1} \leq 4$, 则 $3 \leq \frac{1}{e^2} \leq 5$, $e \in (0, 1]$, 则 $\frac{\sqrt{5}}{5} \leq e \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解法二: 因为 $|AF_2| = \frac{\lambda+1}{2} \cdot \frac{b^2}{a}$, $|AF_1| = \frac{b^2}{a}$, 所以 $\frac{\lambda+3}{2} \cdot \frac{b^2}{a} = 2a$, 所以 $4a^2 = (\lambda+3)b^2$, $\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2 = \frac{4}{\lambda+3} \in [\frac{2}{3}, \frac{4}{5}]$. 则 $\frac{\sqrt{5}}{5} \leq e \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$.

47. 【解析】(1) 如图, 因为 $F_2A = F_2B$, 所以 $\angle F_2AB = \angle F_2BA$, 因为 $F_2A = 2a = F_2D + DA = F_2D + F_1D$, 所以 $AD = F_1D$, 则 $\angle DAF_1 = \angle DF_1A$, 所以 $\angle DF_1A = \angle F_2BA$, 则 $F_1D \parallel BF_2$, 因为 $c=1$, 所以 $b^2 = a^2 - 1$, 则椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-1} = 1$, 取 $x=1$, 得 $y_D = \frac{a^2-1}{a}$, 则 $AD = 2a - \frac{a^2-1}{a} = \frac{a^2+1}{a}$. 又 $DF_1 = \frac{5}{2}$, 所以 $\frac{a^2+1}{a} = \frac{5}{2}$, 解得 $a=2(a>0)$. 所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 由 (1) 知, $D(1, \frac{3}{2})$, $F_1(-1, 0)$,

所以 $k_{BF_2} = k_{DF_1} = \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$, 则 $BF_2: y = \frac{3}{4}(x -$

1), 联立
$$\begin{cases} y = \frac{3}{4}(x-1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } 21x^2 - 18x - 39 =$$

0. 解得 $x_1 = -1$ 或 $x_2 = \frac{13}{7}$ (舍). 所以 $y_1 = -\frac{3}{2}$. 即点 E 的坐标为 $(-1, -\frac{3}{2})$.

48. 【解析】(1) 由题意设椭圆 E 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} +$

$\frac{y^2}{b^2} = 1$, 将点 $P(-1, \frac{3}{2})$ 代入椭圆方程得 $b^2 =$

3, 即椭圆 E 的标准方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 解法一: 结合题意, 设直线 l 方程为 $x = my + 1$, 点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且 $x_1 = my_1 +$

1, $x_2 = my_2 + 1$, 联立
$$\begin{cases} x = my + 1 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 消去 } x,$$

得 $(m^2 + \frac{4}{3})y^2 + 2my - 3 = 0$. 则 $y_1 + y_2 =$

$-\frac{2m}{m^2 + \frac{4}{3}}, y_1 y_2 = -\frac{3}{m^2 + \frac{4}{3}}$, 则 $|AB| =$

$\sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = \frac{4(1+m^2)}{m^2 + \frac{4}{3}}$, 原点 O 到直线

l 距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$, 则 $\triangle OAB$ 的面积 $S =$

$$\frac{1}{2} d \times |AB| = 2 \sqrt{\frac{1+m^2}{[(m^2+1) + \frac{1}{3}]^2}} =$$

$$\frac{2}{\sqrt{(m^2+1) + \frac{1}{9(m^2+1)} + \frac{2}{3}}}, \text{ 令 } t = m^2 + 1 \geq$$

1, 则 $(m^2+1) + \frac{1}{9(m^2+1)} = t + \frac{1}{9t} \geq \frac{10}{9}$ (当 $t =$

1 时取等号), 则 $S \leq \frac{3}{2}$, 即 $\triangle OAB$ 的面积 S 的

最大值为 $\frac{3}{2}$.

解法二: 根据焦长公式, $S_{\triangle AOB} = \frac{|AB|h_2}{2} =$

$$\frac{ab^2 \csc \alpha}{b^2 + c^2 \sin^2 \alpha} = \frac{6}{\frac{3}{\sin \alpha} + \sin \alpha} \leq \frac{3}{2}, \text{ 当 } \sin \alpha = 1 \text{ 时}$$

等号成立.

49. 【解析】(1) 根据题意可得: $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{4}{a^2} +$

$\frac{2}{b^2} = 1, a^2 = b^2 + c^2$, 解得: $a^2 = 8, b = 2$. 故

椭圆 C 的标准方程为: $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$;

(2) 解法一: 由(1)知 $F(2, 0)$, 当直线 l 的斜率不存在时, $S_1 = S_2$, 于是 $|S_1 - S_2| = 0$; 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 $l: y = k(x-2)$ ($k \neq 0$), 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 联立

$$\begin{cases} y = k(x-2) \\ \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (1+2k^2)x^2 - 8k^2x + 8k^2 - 8 =$$

0. 所以 $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{1+2k^2}, x_1 x_2 = \frac{8k^2 - 8}{1+2k^2}$, 于是

$$|S_1 - S_2| = \frac{1}{2} \times 4 \sqrt{2} \times |y_1 + y_2| =$$

$$2\sqrt{2} |k(x_1 + x_2) - 4k| = 2\sqrt{2} \left| k \times \frac{8k^2}{1+2k^2} - 4k \right| =$$

$$\frac{8\sqrt{2} |k|}{1+2k^2} = \frac{8\sqrt{2}}{\frac{1}{|k|} + 2|k|} \leq \frac{8\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 4. \text{ 当且仅当 } k =$$

$\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 此时 $|S_1 - S_2|$ 的最大值为

4. 综上, $|S_1 - S_2|$ 的最大值为 4.

解法二: 根据焦长公式 $|S_1 - S_2| = (|MF_1| - |MF_2|) \cdot 2a \sin \alpha = 2\sqrt{2} \cdot (\frac{4}{2\sqrt{2} - 2\cos \alpha}$

$$- \frac{4}{2\sqrt{2} + 2\cos \alpha}) \cdot \sin \alpha = \frac{8\sqrt{2} \sin \alpha \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} =$$

$$\frac{8\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} \leq 4, \text{ 当且仅当 } k^2 = \tan^2 \alpha = \frac{1}{2} \text{ 等号}$$

成立.

50. 【解析】(1) 依题意有
$$\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ a^2 = b^2 + c^2 \\ \frac{1}{2}(a-c)b = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} a = \sqrt{2} \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$, 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 设 $\triangle F_2MN$ 的内切圆半径为 r , $\triangle F_2MN$ 的周长为 $|MF_1| + |MF_2| + |NF_1| + |NF_2| = 4a = 4\sqrt{2}$, 所以 $S_{\triangle F_2MN} = \frac{1}{2} \times 4a \cdot r = 2\sqrt{2}r$.

解法一: 根据题意知, 直线 l 的斜率不为零, 可设直线 l 的方程为 $x = my - 1$, 由

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}, \text{得 } (m^2 + 2)y^2 - 2my - 1 = 0,$$

$$\Delta = (2m)^2 + 4(m^2 + 2) > 0, m \in R, y_1 + y_2 = \frac{2m}{m^2 + 2}, y_1 y_2 = \frac{-1}{m^2 + 2}, \text{所以 } S_{\triangle F_2MN} = \frac{1}{2} |F_1F_2| |y_1 - y_2| = |y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}\sqrt{m^2 + 1}}{m^2 + 2}, \text{令 } t = \sqrt{m^2 + 1}, \text{则 } t \geq 1,$$

$$\text{所以 } S_{\triangle F_2MN} = \frac{2\sqrt{2}t}{t^2 + 1} = \frac{2\sqrt{2}}{t + \frac{1}{t}}, \text{令 } f(t) = t + \frac{1}{t},$$

则当 $t \geq 1$ 时, $f'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} > 0$, $f(t)$ 单调递增, 所以 $f(t) \geq f(1) = 2$, $S_{\triangle F_2MN} \leq \sqrt{2}$, 即当 $t = 1$, $m = 0$ 时, $S_{\triangle F_2MN}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 此时 $2\sqrt{2}r_{\max} = \sqrt{2}$, $r_{\max} = \frac{1}{2}$. 所以 $\triangle F_2MN$ 内切圆半径的最大值为 $\frac{1}{2}$.

$$\text{解法二: 根据等面积法 } \frac{4a \cdot r}{2} = 2\sqrt{2}r = \frac{|MN| \cdot h}{2} =$$

$$\frac{2ab^2 \csc \alpha}{b^2 + c^2 \sin^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{2} \sin \alpha}{1 + \sin^2 \alpha} \Rightarrow r = \frac{1}{\frac{1}{\sin \alpha} + \sin \alpha} \leq \frac{1}{2}, \text{当}$$

且仅当 $\sin \alpha = 1$ 时等号成立.

51. 【解析】(1) 由题意可得 $c = 2$, 即 $a^2 - b^2 = 4$, 又 $\frac{3}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 解得 $a = \sqrt{6}$, $b = \sqrt{2}$, 则椭圆方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$;

(2) 解法一: 设直线 $AP: x = my - 2$, $BP: x = ny + 2$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $\vec{PF}_1 = 2\vec{F}_1A$,

可得 $y_0 = -2y_1$, $\vec{PF}_2 = \lambda_2 \vec{F}_2B$, 可得 $y_0 = -\lambda_2 y_2$, ($\lambda_2 > 1$), 联立 $x = my - 2$ 和 $x^2 + 3y^2 = 6$, 可得 $(3 + m^2)y^2 - 4my - 2 = 0$, $y_0 + y_1 = \frac{4m}{3 + m^2}$, $y_0 y_1 = -\frac{2}{3 + m^2}$, 同理可得 $y_0 + y_2 = -\frac{4n}{3 + n^2}$, $y_0 y_2 = -\frac{2}{3 + n^2}$, ①

由 $y_0 = -2y_1$, 可得 $-y_1 = \frac{4m}{3 + m^2}$, $-2y_1^2 = -\frac{2}{3 + m^2}$, 消去 y_1 , 可得 $m^2 = \frac{1}{5}$, 由 $y_0 > 0$,

可得 $m = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 可得 $P\left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$, 由 $y_0 =$

$-\lambda_2 y_2$, 代入 ① 可得 $(1 - \lambda_2)y_2 = -\frac{4n}{3 + n^2}$,

$-\lambda_2 y_2^2 = -\frac{2}{3 + n^2}$, 可得 $\frac{(1 - \lambda_2)^2}{\lambda_2} = \frac{8n^2}{3 + n^2}$, 又

$$n = \frac{1}{k_{PF_2}} = \frac{-\frac{7}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = -\frac{7}{\sqrt{5}}, \text{即有 } 8\lambda_2^2 - 65\lambda_2 + 8 =$$

0, 解得 $\lambda_2 = 8$ 或 $\frac{1}{8}$ (舍去), 所以 $\lambda_2 = 8$.

解法二: 根据焦比定理, $|PF_1| = \frac{\lambda_1 + 1}{2} \cdot \frac{b^2}{a}$,

$$|PF_2| = \frac{\lambda_2 + 1}{2} \cdot \frac{b^2}{a}, |PF_1| + |PF_2| =$$

$$\frac{\lambda_1 + \lambda_2 + 2}{2} \cdot \frac{b^2}{a} = 2a, \text{故 } \lambda_1 + \lambda_2 = 10, \text{所}$$

以 $\lambda_2 = 8$.

同步训练 5

52. A 【解析】解法一: 不妨取直线的斜率为 1, 因为右焦点 $F(2, 0)$, 所以直线 AB 的方程为

$$y = x - 2. \text{联立方程组 } \begin{cases} y = x - 2 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1 \end{cases}, \text{得 } 14x^2 -$$

$36x - 9 = 0$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 x_1

$$+ x_2 = \frac{18}{7}, x_1 x_2 = -\frac{9}{14}, y_1 + y_2 = x_1 + x_2 - 4 =$$

$$-\frac{10}{7}, \text{所以 } AB \text{ 中点坐标为 } \left(\frac{9}{7}, -\frac{5}{7}\right), \text{则}$$

AB 的中垂线方程为 $y + \frac{5}{7} = -\left(x - \frac{9}{7}\right)$, 令

$$y = 0, \text{得 } x = \frac{4}{7}, \text{所以点 } N \text{ 的坐标 } \left(\frac{4}{7}, 0\right).$$

因为 $|NF| = \sqrt{\left(\frac{4}{7}-2\right)^2} = \frac{10}{7}$, $|AB| = \sqrt{2}\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{2}\sqrt{\left(\frac{18}{7}\right)^2+4\times\frac{9}{14}} = \frac{30}{7}$, 因为 $|NF|:|AB| = \frac{1}{3}$, 故选 A.

解法二: 根据焦点弦中垂线定理 $|NF|:|AB| = \frac{e}{2} = \frac{1}{3}$, 故选 A.

53. 【解析】(1) 因为椭圆离心率为 $\frac{1}{2}$, 当 P 为 C 的短轴顶点时, $\triangle PF_1F_2$ 的面积有最大值 $\sqrt{3}$, 所

$$\text{以 } \begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \\ a^2 = b^2 + c^2 \\ \frac{1}{2} \times 2c \times b = \sqrt{3} \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} a = 2 \\ b = \sqrt{3} \\ c = 1 \end{cases}, \text{ 故椭圆 } C$$

的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 解法一: 设直线 PQ 的方程为 $y = k(x-1)$, 当 $k \neq 0$ 时, $y = k(x-1)$ 代入 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 得:

$$(3+4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0, \text{ 设 } P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), \text{ 线段 } PQ \text{ 的中点为 } N(x_0, y_0), x_0 = \frac{x_1+x_2}{2} = \frac{4k^2}{3+4k^2}, y_0 = \frac{y_1+y_2}{2}$$

$$= k(x_0-1) = \frac{-3k}{3+4k^2}, \text{ 即 } N\left(\frac{4k^2}{3+4k^2}, \frac{-3k}{3+4k^2}\right).$$

因为 $TN \perp PQ$, 则 $k_{TN} \cdot k_{PQ} = -1$, 所以

$$\frac{-3k}{3+4k^2} \cdot \frac{1}{k} = -1, \text{ 化简得 } 4k^2 - 8k + 3 = 0,$$

$$\text{解得 } k = \frac{1}{2} \text{ 或 } k = \frac{3}{2}.$$

解法二: (省去了前面的证明步骤) 如图,

$$|RF_2| = \frac{e}{2} |PQ| = \frac{1}{4} |PQ| = \frac{3}{3+\sin^2\alpha},$$

$$|OR| = 1 - \frac{1}{4} |PQ| = \frac{\sin^2\alpha}{3+\sin^2\alpha}, \text{ 易知: } \tan\alpha =$$

$$\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+3} = \frac{8\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+3} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \Rightarrow 8\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{8}$$

$4\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha$, 即 $4\tan^2\alpha - 8\tan\alpha + 3 = 0$; 解

$$\text{得: } \tan\alpha = \frac{1}{2} \text{ 或 } \tan\alpha = \frac{3}{2}, \text{ 即 } k = \frac{1}{2} \text{ 或 } k = \frac{3}{2}.$$

54. 【解析】(1) 由椭圆的焦点在 x 轴上, 设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 椭圆 C 的一个

顶点为 $(0, 1)$, 即 $b = 1$, 由 $e = \frac{c}{a} =$

$$\sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \text{ 解得: } a^2 = 5, \text{ 所以椭圆 } C \text{ 的}$$

标准方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$;

(2) 解法一: 由得 $F(2, 0)$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 设直线 l 的方程为 $y = k(x-2) (k \neq 0)$, 代入椭圆方程, 消去 y 可得 $(5k^2+1)x^2 - 20k^2x + 20k^2 - 5 = 0$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{20k^2}{5k^2+1}$,

$$x_1x_2 = \frac{20k^2-5}{5k^2+1}, \text{ 因为点 } C \text{ 与点 } A \text{ 关于 } x \text{ 轴对}$$

称, 所以 $C(x_1, -y_1)$ 假设存在 $N(t, 0)$, 使得

C, B, N 三点共线, 则 $\vec{BN} = (t-x_2, -y_2)$, $\vec{CN} = (t-x_1, y_1)$, 因为 C, B, N 三点共线,

所以 $\vec{BN} \parallel \vec{CN}$, 所以 $(t-x_2)y_1 + (t-x_1)y_2 = 0$,

即 $(y_1 + y_2)t = x_2y_1 + x_1y_2$, 所以 $t =$

$$\frac{k(x_1-2)x_2 + k(x_2-2)x_1}{k(x_2-2) + k(x_2-2)} = \frac{2x_1x_2 - 2(x_1+x_2)}{x_1+x_2-4} =$$

$$\frac{2 \cdot \frac{20k^2-5}{5k^2+1} - 2 \cdot \frac{20k^2}{5k^2+1}}{\frac{20k^2}{5k^2+1} - 4} = \frac{5}{2}. \text{ 所以存在定点}$$

$\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 使得 C, B, N 三点共线.

解法二: 参考本书专题 6, 这里不详述.

解法三: 平移构造齐次式, 参考本书的专题 6 和秒 2 的专题 9, 设 $N(x_0, 0)$, 将坐标系向右

平移 m 个单位, 可得椭圆方程为 $\frac{(x+x_0)^2}{5} + y^2$

$$= 1, \text{ 化简得 } \frac{x^2}{5} + y^2 + \frac{2}{5}x_0x + \frac{x_0^2}{5} - 1 = 0 \text{ ①, 由}$$

于 $A'B'$ 过定点 $(2-x_0, 0)$, 故可设 $A'B'$ 方程为

$mx + ny = 1$ ②, 易知 $m = \frac{1}{2 - x_0}$ ③, ②代入①, 构造齐次式方程, 得: $\frac{x^2}{5} + y^2 + \frac{2}{5}x_0x(mx + ny) + \left(\frac{x_0^2}{5} - 1\right)(mx + ny)^2 = 0$, 同除以 x^2 得: $\left[1 + n^2\left(\frac{x_0^2}{5} - 1\right)\right]k^2 + \left[\frac{2}{5}nx_0 + 2mn\left(\frac{x_0^2}{5} - 1\right)\right] + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}mx_0 + m^2\left(\frac{x_0^2}{5} - 1\right) = 0$, 根据对称性质可得 $k_1 + k_2 = 0$, 即 $\frac{2}{5}nx_0 + 2mn\left(\frac{x_0^2}{5} - 1\right) = 0$, 代入③得: $2x_0 - 5 = 0$, 所以存在定点 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 使得 C, B, N 三点共线.

(3) 解法一: 由 $0 \leq m \leq 2$, $\vec{MA} + \vec{MB} = (x_1 + x_2 - 2m, y_1 + y_2)$, $\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, 因为 $(\vec{MA} + \vec{MB}) \perp \vec{AB}$, 所以 $(\vec{MA} + \vec{MB}) \cdot \vec{AB} = 0$, 所以 $(x_1 + x_2 - 2m)(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)(y_1 + y_2) = 0$, 所以 $\frac{20k^2}{5k^2 + 1} - 2m - \frac{4k^2}{5k^2 + 1} = 0$, 所以 $k^2 = \frac{m}{8 - 5m}$, 所以 $k^2 = \frac{m}{8 - 5m} > 0$, 解得 $0 < m < \frac{8}{5}$, 所以当 $0 < m < \frac{8}{5}$ 时, 故 m 的范围为 $\left(0, \frac{8}{5}\right)$.

解法二: 根据几何性质可知 M 位于 AB 的中垂线上, $m = c - \frac{e}{2} |AB| = 2 - \frac{2}{1 + 4 \sin^2 \alpha} \in \left(0, \frac{8}{5}\right)$.

←←← 达标训练

1. A 【解析】设直线 l_1 的倾斜角为 θ , 则 l_2 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \theta$, 根据焦点弦长公式可得 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta}$, $|DE| = \frac{2p}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{2p}{\cos^2 \theta} = \frac{4}{\cos^2 \theta}$, 所以 $|AB| + |DE| = \frac{4}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{16}{\sin^2 2\theta}$, 因为 $0 < \sin^2 2\theta \leq 1$, 所以当 $\theta = 45^\circ$ 时, $|AB| + |DE|$ 的最小, 最小为 16, 故选 A.

2. D 【解析】由 $y^2 = 2px$, 得 $2p = 3$, $p = \frac{3}{2}$, $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{3}{\frac{1}{4}} = 12$, 所以 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |AB| \frac{p}{2}$

$$\cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \times 12 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{4}, \text{ 故选 D.}$$

3. B 【解析】设 Q 到 l 的距离为 d , 则 $|QF| = d$, 因为 $\vec{FP} = 4\vec{FQ}$, 所以 $|PQ| = 3d$, 故 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 根据几何意义可知 $|QF|$ 为焦点弦的短弦, 故 $|QF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha} = \frac{4}{1 + \frac{1}{3}} = 3$, 故选 B.

4. C 【解析】设直线 AB 的倾斜角为 $\alpha (0 < \alpha < \pi)$ 因为 $|AF| = 3$, 所以 $\frac{p}{1 - \cos \alpha} = 3 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\triangle AOB$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} \times |OF| \times |AB| \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2p}{\sin^2 \alpha} \times \sin \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 故选 C.

5. B 【解析】抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$, 设 AB 与抛物线对称轴的夹角为 α , 由于 $|BF| > |AF|$, 故 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$, $|BF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha}$, 又 $AB \perp AD$, 故 $|AF| = p \cos \alpha = \frac{p}{1 + \cos \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \sin^2 \alpha$, $|BF| = |AF| + 4 \Rightarrow 2p \cos \alpha = 4 \sin^2 \alpha \Rightarrow 2p = 4$, 则 $p = 2$, 故选 B.

6. C 【解析】由抛物线的定义, 得, $|AF| = \frac{p}{4} + \frac{p}{2} = 3$, 解得 $p = 4$, 所以 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha} = 3 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = 9$, 故选 C.

7. C 【解析】根据双曲线的定义, 可得 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 因为 $\triangle ABF_2$ 是等边三角形, 即 $|AF_2| = |AB|$, 所以 $|BF_1| = 2a$, 又因为 $|BF_2| - |BF_1| = 2a$, 所以 $|BF_2| = |BF_1| + 2a = 4a$, 由于双曲线与直线交于两支, 故 $|AF_1| = 3|BF_1| = 6a$, 根据焦长焦比定理可知 $6a = \frac{3-1}{2} \frac{b^2}{a} \Rightarrow b^2 = 6a^2$, 所

以双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6a^2} = 1$, 又 $A(1, \sqrt{3})$, 在双曲线上, 所以 $\frac{1}{a^2} - \frac{3}{6a^2} = 1$, 解得 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 2a \times 4a \times \sin 120^\circ = 2\sqrt{3}a^2 = \sqrt{3}$, 故选 C.

8. A 【解析】因为 $y^2 = 4x$, 焦点 $F(1, 0)$, $|AB| = |AF| - \frac{p}{2} = \frac{2}{1 - \cos\alpha} - 1$, $|CD| = |DF| - \frac{p}{2} = \frac{2}{1 + \cos\alpha} - 1$, 则 $|AB| \cdot |CD| = \frac{4}{\sin^2\alpha} - \frac{4}{\sin^2\alpha} + 1 = 1$. 综上所述, $|AB| \cdot |CD| = 1$, 故选 A.

9. B 【解析】如图, 作 AB 的中垂线交 y 轴于 N , AB 中点为 M , 令 AB 与 y 轴夹角为 α , $|AB| = \frac{4}{\sin^2\alpha}$, $|NF| = \frac{1}{2} |AB| = \frac{2}{\sin^2\alpha}$, $|NC| = \frac{|NF| + p}{\sin\alpha} = \frac{\frac{2}{\sin^2\alpha} + 2}{\sin\alpha}$, $|MN| = |NF| \sin\alpha = \frac{2}{\sin\alpha}$, 因为 $|MN| + |MC| = |NC|$, $|MC| = \frac{\sqrt{3}}{2} |AB| = \frac{2\sqrt{3}}{\sin^2\alpha}$, 所以 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $|AB| = 12$, 故选 B.

10. 【解析】过抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 所以 $|AF| = \frac{p}{1 + \cos\alpha} = \frac{1}{1 + \cos\alpha}$, 所以 $|AF| = \frac{5}{6}$. 故答案为 $\frac{5}{6}$.

11. 【解析】抛物线 $|AB| = \frac{25}{12} = \frac{2p}{\sin^2\alpha} = \frac{2}{\sin^2\alpha} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{1}{5}$. $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 设直线 AB 的倾斜角为 θ , 由抛物线的弦长公式 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2\theta} = \frac{4}{\sin^2\theta} = 8$, 解得: $\sin^2\theta = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 则直线的斜率 $k = 1$,

所以直线 l 的方程 $y = x - 1$;

(2) 由(1)可得 AB 的中点坐标为 $D(3, 2)$, 则直线 AB 的垂直平分线方程为 $y - 2 = -(x - 3)$, 即 $y = -x + 5$, 设所求圆的圆心坐标为 (x_0, y_0) ,

$$\text{则} \begin{cases} y_0 = -x_0 + 5 \\ (x_0 + 1)^2 = \frac{(y_0 - x_0 + 1)^2}{2} + 16 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = 11 \\ y_0 = -6 \end{cases},$$

因此, 所求圆的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 或 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$.

12. 【解析】(1) 因为 M 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直, 所以 M 的横坐标为 c , 当 $x = c$ 时, $y = \frac{b^2}{a}$, 即 $M\left(c, \frac{b^2}{a}\right)$, 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$, 即 $\tan \angle MF_1F_2 = \frac{\frac{b^2}{a}}{\frac{a}{2c}} = \frac{b^2}{2ac} = \frac{3}{4}$, 即 $b^2 = \frac{3}{2}ac = a^2 - c^2$, 即 $c^2 + \frac{3}{2}ac - a^2 = 0$, 则 $e^2 + \frac{3}{2}e - 1 = 0$, 即 $2e^2 + 3e - 2 = 0$, 解得 $e = \frac{1}{2}$ 或 $e = -2$ (舍去), 即 $e = \frac{1}{2}$;

(2) 由题意, 原点 O 是 F_1F_2 的中点, 则直线 MF_1 与 y 轴的交点 $D(0, 2)$ 是线段 MF_1 的中点, 设 $M(c, y)$, ($y > 0$), 则 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 即 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$, 解得 $y = \frac{b^2}{a}$, 因为 OD 是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线, 所以 $\frac{b^2}{a} = 4$, 由 $|MN| = 5|F_1N|$, 则 $|MF_1| = 4|F_1N|$, 则以 F_1 为极点的椭圆的极坐标方程 $\rho = \frac{ep}{1 - e\cos\theta}$, 即 $|MF_1| = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}$, $|NF_1| = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}$, 所以 $\frac{b^2}{a - c\cos\theta} = \frac{4b^2}{a + c\cos\theta} \Rightarrow e\cos\theta = \frac{3}{5}$, 所以 $|MF_1| = \frac{b^2}{a - c\cos\theta} = \frac{4}{1 - e\cos\theta} = 10$, 所以 $|MF_1| + |MF_2| = 2a \Rightarrow a = 7, b = 2\sqrt{7}$.

13. 【解析】(1) 由 C_1 方程可知 $F(0, 1)$, 因为 F 也是椭圆 C_2 的一个焦点, 所以 $a^2 - b^2 = 1$, 又因

为 C_1 与 C_2 的公共弦的长为 $2\sqrt{6}$, C_1 与 C_2 的图像都关于 y 轴对称, 所以易得 C_1 与 C_2 的公共点的坐标为 $(\pm\sqrt{6}, \frac{3}{2})$, 所以 $\frac{9}{4a^2} + \frac{6}{b^2} = 1$, 又因为 $a^2 - b^2 = 1$, 所以 $a^2 = 9, b^2 = 8$, 所以 C_2 的方程为 $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{8} = 1$;

(2) 设 AB 与 y 轴的夹角为 α , 根据焦长公式 (请用极坐标或者余弦定理证明) $|AF| = \frac{2}{1 - \cos\alpha}$, $|BF| = \frac{2}{1 + \cos\alpha}$, $|CF| = \frac{8}{3 + \cos\alpha}$, $|DF| = \frac{8}{3 - \cos\alpha}$, $|AC| = |BD| \Rightarrow |AF| - |CF| = |DF| - |BF|$, 即 $|AB| = |CD| \Rightarrow \frac{4}{\sin^2\alpha} = \frac{48}{8 + \sin^2\alpha} \Rightarrow \sin^2\alpha = \frac{8}{11} \Rightarrow k = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$, 即直线 l 的斜率为 $\pm \frac{\sqrt{6}}{4}$.

14. 【解析】(1) 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , $a = 1, c^2 = 1 + b^2$, 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 可得:

$A(c, b^2)$, 可得: $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2b^2 = 2c, 3b^4 = 4(a^2 + b^2)$, 即 $3b^4 - 4b^2 - 4 = 0, b > 0$, 解得 $b^2 = 2$.

所求双曲线方程为: $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 其渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{2}x$;

(2) $b = \sqrt{3}$, 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 可得 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$.

$(\vec{F_1A} + \vec{F_1B}) \cdot \vec{AB} = (\vec{F_1A} + \vec{F_1B}) \cdot (\vec{F_1B} + \vec{F_1A}) = 0$ 可得: $|F_1A| = |F_1B|$, 参考第 7 题, 可知 $|AB| = |AF_2| - |BF_2| = |AF_1| + 2a - |BF_1| + 2a = 4a = 4$, 根

据与两支双曲线相交的焦长公式, 可得 $\frac{2ab^2}{c^2 \cos^2\alpha - a^2} = 4a \Rightarrow \cos^2\alpha = \frac{5}{8} \Rightarrow k^2 = \frac{3}{5}, k = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$.

15. 【解析】(1) 由题意可知: $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$. 故 $\odot C$ 的半径为 2, 圆心为原点 O 关于直线 $x + y - 2 = 0$ 的对称点. 设圆心的坐标为 (m, n) .

$$\text{则 } \begin{cases} \frac{n}{m} = 1 \\ \frac{m}{2} + \frac{n}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = 2 \\ n = 2 \end{cases}.$$

所以圆 C 的方程为 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$;

(2) 由题意, 以 $(2, 0)$ 为极点, 化为极坐标方程, 则 C 的极坐标方程为 $\rho = 4\sin\theta$, 即 $b = 4\sin\theta$, E 的极坐标方程为 $\rho = \frac{ep}{1 - e\cos\theta}$, 故 $a =$

$$\frac{ep}{1 - e\cos\theta} + \frac{ep}{1 + e\cos\theta} = \frac{2\sqrt{5}}{1 + 4\sin^2\theta}, ab = \frac{8\sqrt{5}\sin\theta}{1 + 4\sin^2\theta} = \frac{8\sqrt{5}}{\frac{1}{\sin\theta} + 4\sin\theta}.$$

根据基本不等式可知 $\frac{1}{\sin\theta} + 4\sin\theta \geq 4$, 当且仅当 $\sin\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 直线 l 的方程为 $x \pm \sqrt{3}y - 2 = 0$.

16. 【解析】(1) 设 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0) (c > 0)$. 由题得 $|PF_2| = |F_1F_2|$, 即 $\sqrt{(a - c)^2 + b^2} = 2c$, 整理得 $2\left(\frac{c}{a}\right)^2 + \frac{c}{a} - 1 = 0$, 得 $\frac{c}{a} = -1$ (舍), 或 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $e = \frac{1}{2}$;

(2) 由(1)知 $a = 2c, b = \sqrt{3}c$, 可得 $\sin\alpha = \frac{b}{2c}$,

$$|AB| = \frac{2ab^2}{b^2 + c^2 \sin^2\alpha} = \frac{16}{5}c, \text{ 于是 } |MN| =$$

$$\frac{5}{8}|AB| = 2c. \text{ 圆心 } (-1, \sqrt{3}) \text{ 到直线 } PF_2 \text{ 的距}$$

$$\text{离 } d = \frac{|-1 - \sqrt{3} - \sqrt{3} - \sqrt{3}c|}{2}, \text{ 因为 } d^2 + \left(\frac{|MN|}{2}\right)^2$$

$$= 4^2, \text{ 所以 } \frac{3}{4}(2 + c)^2 + c^2 = 16, \text{ 整理得 } c =$$

$$-\frac{26}{7} \text{ (舍) 或 } c = 2. \text{ 所以椭圆方程为 } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12}$$

$$= 1.$$

17. 【解析】(1) 易知 $2a = 4$, 即 $a = 2$, $2a = c$, 即 $c = 1$, 又 $b^2 = a^2 - c^2$, 所以 $b^2 = 3$, 故椭圆 E 的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 设 $\triangle OAD$ 的面积为 S_1 , $\triangle OAC$ 的面积为 S_2 , $|S_1 - S_2| = |OA| \cdot ||CF| - |DF|| \sin\alpha \cdot \frac{1}{2} = ||CF| - |DF|| \sin\alpha$. 根据焦长公式

$$|CF| - |DF| = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha} - \frac{b^2}{a + c\cos\alpha} = \frac{2b^2c\cos\alpha}{b^2 + c^2\sin^2\alpha}, \quad |S_1 - S_2| = \frac{6\sin\alpha\cos\alpha}{3\cos^2\alpha + 4\sin^2\alpha} = \frac{6|\tan\alpha|}{3 + 4\tan^2\alpha} = \frac{6}{\frac{3}{|\tan\alpha|} + 4|\tan\alpha|}$$

$3|\tan\alpha| = \frac{4}{|\tan\alpha|}$, 即 $\tan\alpha = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立). 所以 $|S_1 - S_2|$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

18. 【解析】(1) 易知椭圆过点 $(\frac{2\sqrt{6}}{3}, 1)$, 所以 $\frac{8}{3a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ ①, 又 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ②, $a^2 = b^2 + c^2$ ③,

由①②③得 $a^2 = 4$, $b^2 = 3$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 设直线 AF_1 交椭圆另一点为 C , BF_2 交椭圆另一点为 D , 根据椭圆的对称性可知, $S_{ABDC} = 2S_{ABF_2F_1} = 2S_{ACF_2} \Rightarrow S_{ABF_2F_1} = S_{ACF_2} = \frac{2ab^2c\sin\alpha}{b^2 + c^2\sin^2\alpha} = \frac{12\sin\alpha}{3 + \sin^2\alpha} = \frac{12}{\sin\alpha + \frac{3}{\sin\alpha}} \leq \frac{12}{2\sqrt{3}}$, 由

于 $\sin\alpha + \frac{3}{\sin\alpha} \geq 2\sqrt{3}$ 时, 等号条件取不到, 故只能当 $\sin\alpha = 1$ 时取最大, 最大值为 3. 所以四边形 ABF_2F_1 面积的最大值为 3.

19. 【解析】(1) 直线 AB 的方程为 $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$, 即 $bx - ay - ab = 0$, 由题意得 $\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ①
因为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ②, $a^2 = b^2 + c^2$ ③, 解得 $a = \sqrt{3}$, $b = 1$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$;

(2) $S_{\triangle PQF_1} = \frac{2ab^2c\sin\alpha}{b^2 + c^2\sin^2\alpha} = \frac{2\sqrt{6}\sin\alpha}{1 + 2\sin^2\alpha} =$

$$\frac{2\sqrt{6}}{\frac{1}{\sin\alpha} + 2\sin\alpha} \leq \sqrt{3}, \text{ 当且仅当 } \sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时等号成}$$

立; 又所以 $S_{\triangle PQF_1} = \frac{1}{2}(|PF_1| + |QF_1| + |PQ|)$

$$r = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3}r = 2\sqrt{3}r, \text{ 所以 } r_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}.$$

注意: 关于 $4a$ 体的面积问题, 分母都会转化为基本不等式模型, 关于取等条件是 $c > b$ 时能取等, $c < b$ 时不能取等.

20. 【解析】(1) 由 $e = \frac{1}{2}$ 得 $a = 2c$, $|AF_1| = 2$, $|AF_2| = 2a - 2$, $|AF_1|^2 + |AF_2|^2 - 2|AF_1| \cdot |AF_2| \cos A = |F_1F_2|^2$, 解得 $c = 1$, $a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 存在这样的点 M 符合题意. 设直线 PQ 倾斜角为 θ , 将 F_2 设为极坐标的极点, 根据椭圆的极坐标方程 $|PF_2| = \rho = \frac{ep}{1 + e\cos\theta} = \frac{3}{2 + \cos\theta}$,

$$\text{则 } |QF_2| = \frac{3}{2 - \cos\theta}, \text{ 则 } |PF_2| = \frac{|PQ|}{2} - |PF_2| = \frac{|QF_2| - |PF_2|}{2} = \frac{3\cos\theta}{3 + \sin^2\theta}, \quad |MF_2| =$$

$$\frac{|NF_2|}{\cos\theta} = \frac{3}{3 + \sin^2\theta}; \text{ 故 } m = |OF_2| - |MF_2| =$$

$$1 - \frac{3}{3 + \sin^2\theta} = \frac{\sin^2\theta}{3 + \sin^2\theta} = \frac{1}{\frac{3}{\sin^2\theta} + 1} \in \left(0, \frac{1}{4}\right),$$

所以存在实数 m 的取值范围为 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.

专题2 焦点三角形问题

达标训练

1. D 2. C 3. A 4. A 5. D 6. B 7. A
8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. D
14. D 15. D 16. A

17. A 【解析】提示: 利用柯西不等式, 首先根据

$$\text{公式 } \frac{\sin^2 \frac{\pi}{6}}{e_{\text{椭}}^2} + \frac{\cos^2 \frac{\pi}{6}}{e_{\text{双}}^2} = 1, \text{ 然后}$$

$$\left(\frac{1}{\frac{4}{e_{\text{椭}}^2} + \frac{3}{e_{\text{双}}^2}}\right) \left(4 + \frac{4}{3}\right) \geq \left(\frac{1}{e_{\text{椭}}} + \frac{1}{e_{\text{双}}}\right)^2 = \frac{16}{3}. \text{ 故选 A.}$$

18. D 19. D 20. B

21. D 【解析】提示: $\angle F_1PQ = 90^\circ$, $|F_1Q| =$

$$2|F_1P| \Rightarrow \angle F_1QP = 30^\circ, \frac{S_{PF_1F_2}}{S_{QF_1F_2}} = \frac{b^2 \tan 45^\circ}{b^2 \tan 15^\circ} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}. \text{ 故选 D.}$$

22. C

23. C 【解析】提示: $S > b^2 \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = c|y_p| \Rightarrow |y_p| > \frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{4\sqrt{2}}{3} < x_p < \frac{4\sqrt{2}}{3}$. 故选 C.

24. 3 25. $[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$ 26. $\frac{9}{4}$ 27. $\frac{1}{4}$

28. ①④

29. 2

30. 【解析】提示: 由双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 得 $a^2 = 1$, $b^2 = 3$, 所以 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$. 当 $PF_2 \perp x$ 轴时, 把 $x = 2$ 代入 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 得 $y = \pm 3$, 即 $|PF_2| = 3$, 此时 $|PF_1| = |PF_2| + 2 = 5$, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 8$; 当 $PF_1 \perp PF_2$, $S = b^2 = \frac{|PF_1||PF_2|}{2} = 3$, $|PF_1| + |PF_2| = \sqrt{(|PF_1| - |PF_2|)^2 + 4|PF_1||PF_2|} = 2\sqrt{7}$.

专题3 最值之声东击西

达标训练

1. D 【解析】由抛物线方程可知, $2p = 8$, 所以抛物线的焦点 $F(2, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 设 M 在抛物线准线方程上射影为 M' , 因为点 M 到准线的距离与 M 到焦点距离相等, 所以 $|MA| + |MF| = |MA| + |M'M|$, 当 $x = 4$, 代入抛物线方程求得 $y = \pm 4\sqrt{2}$, 所以 AD 点抛物线的内部, 根据内连准线, 当 M', M, A 三点共线时, $|MA| + |M'M|$ 的值最小, 此时 $|MA| + |M'M| = |AM| = 6$. 此时 M 的纵坐标为 -2 , $x = \frac{1}{2}$, 即 M 的坐标为 $(\frac{1}{2}, -2)$. 故选 D.

2. B 【解析】由题意可得 $2a = 4$, 即 $a = 2$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 即有 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, 即 $b = 1$, 可得双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 焦点为 $F_1(-\sqrt{5}, 0)$, $F_2(\sqrt{5}, 0)$, 由双曲线的定义可得 $|MF_1| = 2a + |MF_2| = 4 + |MF_2|$, 由圆 $x^2 + y^2 - 4y = 0$ 可得圆心 $C(0, 2)$, 半径 $r = 2$, $|MN| + |MF_1| = 4 + |MN| + |MF_2|$, 连接 CF_2 , 交双曲线于 M , 圆于 N , 可得 $|MN| + |MF_2|$ 取得最小值, 且为 $|CF_2| = \sqrt{4+5} = 3$, 则 $|MN| + |MF_1|$ 的最小值为 $4 + 3 - 2 = 5$. 故选 B.

3. D 【解析】双曲线 $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$, 因为 $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$, 所以 $F_1(-10, 0)$, $F_2(10, 0)$, 因为 $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 12$, 所以 $|MP| \leq |PF_1| + |MF_1|$, $|PN| \geq |PF_2| + |NF_2|$, 所以 $-|PN| \leq -|PF_2| + |NF_2|$, 所以, $|PM| - |PN| \leq |PF_1| + |MF_1| - |PF_2| + |NF_2| = 12 + 1 + 2 = 15$. 故选 D.

4. D 【解析】设双曲线的右焦点为 F' , 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的 $a = 2$, $c = \sqrt{4 + b^2}$, 可得 $F(-c, 0)$, $F'(c, 0)$, 由双曲线的定义可得 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 可得 $|PF| = 4 + |PF'|$, 则 $|PF| + |PA| = 4 + |PF'| + |PA| \geq 4 + |AF'|$, 当 A, P, F' 共线时, 取得等号. $4 + |AF'| = 4 + \sqrt{(1-c)^2 + (4-0)^2} = 9$, 解得 $c = 4$, 则双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2$, 故选 D.

5. B 【解析】由题意可得 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ，因为点 $A\left(\frac{7}{2}, 4\right)$ 在抛物线外，所以根据抛物线的定义可得 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 $|AF| = \sqrt{\left(\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + (4 - 0)^2} = 5$ 。故选 B。

6. B 【解析】由抛物线方程 $y^2 = 8x$ ，可得抛物线的焦点 $F(2, 0)$ ，准线为 $x = -2$ ，又 $N(2, 0)$ ，即 N 与 F 重合。由抛物线的定义可得 $|PN| = d$ (d 为 P 到准线的距离)，圆 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心设为 $M(3, 1)$ ，半径为 1，如图，过圆 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心 M 作抛物线的准线的垂线 MH ，交圆于 Q ，交抛物线于 P ，此时 $|PQ| + |PN|$ 取得最小值，且为 $|MH| - 1 = 5 - 1 = 4$ 。故选 B。

7. B 【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$ ，准线 $l: x = -1$ 。如图所示，过点 P 作 $PN \perp l$ 交 y 轴于点 M ，垂足为 N ，则 $|PF| = |PN|$ ，所以 $d = |PF| - 1$ ，所以 $|PA| + d \geq |AF| - 1 = \sqrt{(4-1)^2 + 5^2} - 1 = \sqrt{34} - 1$ 。故选 B。

8. C 【解析】两圆圆心 $F_1(-4, 0)$ ， $F_2(4, 0)$ 恰

好是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点，所以 $|PF_1| + |PF_2| = 10$ ，两圆的半径相等，且 $r = 1$ ，所以 $(|PM| + |PN|)_{\min} = |PF_1| + |PF_2| - 2r = 10 - 2 = 8$ 。 $(|PM| + |PN|)_{\max} = |PF_1| + |PF_2| + 2r = 10 + 2 = 12$ ，故选 C。

9. 【解析】椭圆中的 $c = \sqrt{49 - 33} = \sqrt{16} = 4$ ，即焦点坐标为 $F_1(-4, 0)$ ， $F_2(4, 0)$ ，点 M 在椭圆的外部，则 $|PM| + |PF_1| = |PM| + 2a - |PF_2| = 14 + |PM| - |PF_2| \leq 14 + |MF_2| = 14 + \sqrt{(8-4)^2 + 5^2} = 14 + \sqrt{41}$ ，当且仅当 M ， F_2 ， P 三点共线时取等号。

10. 【解析】求 $\triangle MAF$ 周长的最小值，即求 $|MA| + |MF|$ 的最小值，设点 M 在准线上的射影为 D ，根据抛物线的定义，可知 $|MF| = |MD|$ ，因此， $|MA| + |MF|$ 的最小值，即 $|MA| + |MD|$ 的最小值，根据平面几何知识，可得当 D ， M ， A 三点共线时 $|MA| + |MD|$ 最小，因此最小值为 $x_A - (-1) = 2 + 1 = 3$ ，因为 $|AF| = \sqrt{(2-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$ ，所以 $\triangle MAF$ 周长的最小值为 $3 + \sqrt{2}$ 。

11. 【解析】圆 C 的圆心 $C(-5, 3)$ ，半径为 $\sqrt{2}$ ，由 l 上的一点 Q 向圆 $C: (x+5)^2 + (y-3)^2 = 2$ 引两条切线，分别切圆 C 于 M ， N 两点，可得四边形 $MCQN$ 为正方形，边长为 2，由抛物线 $y^2 = 4x$ 可得 $F(1, 0)$ ，准线方程为 $x = -1$ ，则 $|PH| + |PQ| = |PF| + |PQ| + 1$ ，连接 FC 交抛物线于 P ，可得 $|PQ| + |PF| = |QF|$ ，此时 $|PQ| + |PF|$ 取得最小值，可得 $|PF| + |PQ| = |CF| - 2 = \sqrt{(-5-1)^2 + 3^2} - 2 = 3\sqrt{5} - 2$ ，则 $|PH| + |PQ|$ 的最小值为 $3\sqrt{5} - 1$ 。

12. 【解析】根据题意画出图形，如图所示；由图形知， $\sqrt{(x-4)^2+(y-1)^2} - x = |PA| - x = |PA| - (|PM| - 2) = |PA| - (|PF| - 2) = |PA| - |PF| + 2 \leq |AF| + 2 = \sqrt{5} + 2$ ；即 $\sqrt{(x-4)^2+(y-1)^2} - x$ 的最大值是 $\sqrt{5} + 2$ 。

13. 【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $F(2, 0)$ ，点 $A(1, 2)$ ，求 $\triangle PAF$ 周长的最小值，即求 $|PA| + |PF|$ 的最小值，设点 P 在准线上的射影为 D ，根据抛物线的定义，可知 $|PF| = |PD|$ ，因此， $|PA| + |PF|$ 的最小值，即 $|PA| + |PD|$ 的最小值，根据平面几何知识，可得当 D, P, A 三点共线时 $|PA| + |PD|$ 最小， P 的纵坐标为：2，可得 $4 = 8x$ ，解得 $x = \frac{1}{2}$ 。则 $\triangle PAF$ 的周长取到最小值时点 P 的坐标为 $(\frac{1}{2}, 2)$ 。

14. 【解析】由题意得 $a = 2\sqrt{3}$ ， $b = 2$ ， $c = 4$ ， $F(-4, 0)$ ，右焦点 $H(4, 0)$ 。由双曲线的定义可得 $|PF| + |PA| = 2a + |PH| + |PA| \geq 2a + |AH| = 4\sqrt{3} + \sqrt{(1-4)^2 + (4-0)^2} = 4\sqrt{3} + 5$ 。

15. 【解析】根据双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{6} = 1$ ，得： $a = 3$ ， $b = \sqrt{6}$ ，由双曲线的定义可得： $|AF_2| - |AF_1| = 2a = 6 \cdots \textcircled{1}$ ， $|BF_2| - |BF_1| = 2a = 6 \cdots \textcircled{2}$ ， $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 可得： $|AF_2| + |BF_2| - (|AF_1| + |BF_1|) = 12$ ，因为过双曲线的左焦点 F_1 的直线交双曲线的左支于 A, B 两点，所以 $|AF_1| + |BF_1| = |AB|$ ，当 $|AB|$ 是双曲线的通径时 $|AB|$ 最小。所以 $|AF_2| + |BF_2| - (|AF_1| + |BF_1|) = |AF_2| + |BF_2| - |AB| = 12$ 。 $|BF_2| + |AF_2| = |AB| + 12 \geq \frac{2b^2}{a} + 12 = \frac{2 \times 6}{3} + 12 = 16$ 。

专题4 椭圆双曲线设点设线基础

达标训练

1. D 【解析】设椭圆上的点为 (x, y) ，则因为圆 $x^2 + (y-6)^2 = 2$ 的圆心为 $(0, 6)$ ，半径为 $\sqrt{2}$ ，所以椭圆上的点 (x, y) 到圆心 $(0, 6)$ 的距离为 $\sqrt{x^2 + (y-6)^2} = \sqrt{10(1-y^2) + (y-6)^2} = \sqrt{-9(y + \frac{2}{3})^2 + 50} \leq 5\sqrt{2}$ ，所以 P, Q 两点间的最大距离是 $5\sqrt{2} + \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ 。故选 D。
2. B 【解析】由 $\begin{cases} y = mx + b \\ x^2 + 4y^2 = 1 \end{cases}$ ，得 $(1 + 4m^2)x^2 + 8mbx + 4b^2 - 1 = 0$ ，因为直线 $y = mx + b$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 恒有公共点，所以 $\Delta = 64m^2b^2 - 4(1 + 4m^2)(4b^2 - 1) \geq 0$ ，即 $4b^2 \leq 4m^2 + 1$ 对任意 m 恒成立，所以 $4b^2 \leq 1$ ，解得 $-\frac{1}{2} \leq b \leq \frac{1}{2}$ ，故选 B。
3. 【解析】联立 $\begin{cases} y = kx - 2 \\ x^2 - y^2 = 1 \end{cases}$ ，化为 $(1 - k^2)x^2 + 4kx - 5 = 0$ 。 $\textcircled{1}$ 当 $1 - k^2 = 0$ 时，可得 $k = \pm 1$ ，此时直线 l 的方程为 $y = \pm x + 1$ ，分别与等轴双曲线的渐近线 $y = \pm x$ 平行，此时直线 l 与双曲线有且只有一个交点，满足题意； $\textcircled{2}$ 当 $1 - k^2 \neq 0$ 时，由直线与双曲线有且只有一个公共点，可得 $\Delta = 16k^2 + 20(1 - k^2) = 0$ ，解得 $k = \pm\sqrt{5}$ 。此时满足条件。综上可得： $k = \pm 1, \pm\sqrt{5}$ 。

4. 【解析】把 $y = x - 1$ 代入椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 化简可得 $3x^2 - 4x - 2 = 0$, $x_1 + x_2 = \frac{4}{3}$, $x_1 \cdot x_2 = -\frac{2}{3}$,

由弦长公式可得 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot$

$$\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{16}{9} - \frac{-8}{3}} = \frac{4\sqrt{5}}{3}.$$

5. 【解析】(1) 由题意可设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,

($a > b > 0$), 焦点 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, $F_2(\sqrt{3}, 0)$,

所以 $c = \sqrt{3}$. $\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$, 又 $a^2 - b^2 = c^2 = 3$,

解得 $a = 2$, $b = 1$. 所以椭圆 C 的方程为: $\frac{x^2}{4} +$

$y^2 = 1$, 圆 O 的方程为: $x^2 + y^2 = 3$.

(1) 解法一: ①可知直线 l 与圆 O 相切, 也与椭圆 C , 且切点在第一象限, 因此 k 一定小于 0, 所以可设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, ($k < 0$, $m > 0$). 由圆心 $(0, 0)$ 到直线 l 的距离等于圆半径 $\sqrt{3}$, 可得 $\frac{m^2}{1+k^2} = 3$, 即 $m^2 = 3 + 3k^2$ 由

$\begin{cases} y = kx + m \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$, 可得 $(4k^2 + 1)x^2 + 8kmx + 4m^2 -$

$4 = 0$, $\Delta = (8km)^2 - 4(4k^2 + 1)(4m^2 - 4) = 0$,

可得 $m^2 = 4k^2 + 1$, 所以 $3k^2 + 3 = 4k^2 + 1$, 结合

$k < 0$, $m > 0$, 解得 $k = -\sqrt{2}$, $m = 3$. 将 $k =$

$-\sqrt{2}$, $m = 3$ 代入 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ y = kx + m \end{cases}$ 可得 $x^2 - 2\sqrt{2}x +$

$2 = 0$, 解得 $x = \sqrt{2}$, $y = 1$, 故点 P 的坐标为

$(\sqrt{2}, 1)$.

②设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$\begin{cases} k < 0, m > 0 \\ m^2 = 3 + 3k^2 \Rightarrow k < -\sqrt{2}. \\ \Delta > 0 \end{cases}$

联立直线与椭圆方程得 $(4k^2 + 1)x^2 + 8kmx +$

$4m^2 - 4 = 0$, $|x_2 - x_1| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} =$

$\frac{4\sqrt{4k^2 + 1 - m^2}}{4k^2 + 1}$, O 到直线 l 的距离 $d = \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$,

$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_2 - x_1| = \frac{4\sqrt{4k^2 + 1 - m^2}}{4k^2 + 1}$.

$\sqrt{1+k^2}$, $\triangle OAB$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} \times$

$$\frac{4\sqrt{4k^2 + 1 - m^2}}{4k^2 + 1} \cdot \sqrt{1+k^2} \times \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{1}{2} \times$$

$$\frac{4\sqrt{k^2 - 2}}{4k^2 + 1} \times \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{6}}{7}, \text{ 解得 } k = -\sqrt{5},$$

(正值舍去), $m = 3\sqrt{2}$. 所以 $y = -\sqrt{5}x + 3\sqrt{2}$ 为所求.

解法二: ①(抓住条件 $b = 1$ 大大简化计算量)将直线设为 $x = ky + m$, 可得 $\frac{m^2}{1+k^2} = 3$, 由

$$\begin{cases} x = ky + m \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}, \text{ 可得 } (k^2 + 4)y^2 + 2kmy + m^2 - 4 =$$

0 , $\Delta = (2km)^2 - 4(k^2 + 4)(m^2 - 4) = 0$, 可得

$m^2 = k^2 + 4$, 所以 $3k^2 + 3 = k^2 + 4$, 结合 $k < 0$, m

> 0 , 解得 $k = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $m = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 代入 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ y = kx + m \end{cases}$,

解得 $x = \sqrt{2}$, $y = 1$, 故点 P 的坐标为 $(\sqrt{2}, 1)$.

②设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$$\begin{cases} k < 0, m > 0 \\ m^2 = 3 + 3k^2 \Rightarrow 0 > k > -\frac{\sqrt{2}}{2}. \\ \Delta > 0 \end{cases}$$

联立直线与椭圆方程得 $(k^2 + 4)y^2 + 2kmy + m^2 -$

$4 = 0$, $|y_2 - y_1| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} =$

$$\frac{4\sqrt{k^2 + 4 - m^2}}{k^2 + 4}, O \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}},$$

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |y_2 - y_1| = \frac{4\sqrt{k^2 + 4 - m^2}}{k^2 + 4}.$$

$$\sqrt{1+k^2} = \frac{4\sqrt{1-2k^2}}{k^2 + 4} \cdot \sqrt{1+k^2}, S = \frac{1}{2} \cdot$$

$$\frac{4\sqrt{k^2 + 4 - m^2}}{k^2 + 4} \cdot \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{2\sqrt{1-2k^2}}{k^2 + 4}.$$

$$\sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{6}}{7}, \text{ 解得 } k = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \text{ (正值舍去),}$$

$m = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$. 所以 $y = -\sqrt{5}x + 3\sqrt{2}$ 为所求.

6. 【解析】(1) 设 $P(x, y)$, 由椭圆定义可知, 点 P 的轨迹 C 是以 $(0, -\sqrt{3})$, $(0, \sqrt{3})$ 为焦点, 长

半轴为 2 的椭圆. 它的短半轴 $b = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} =$

1, 故曲线 C 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$;

(2) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 其坐标满足

$$\begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \\ y = kx + 1. \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 并整理得 } (k^2 + 4)x^2 + 2kx -$$

$$3 = 0, \text{ 故 } x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 4}, x_1 x_2 = -\frac{3}{k^2 + 4}.$$

$$\vec{OA} \perp \vec{OB}, \text{ 即 } x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0. \text{ 而 } y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + k(x_1 + x_2) + 1, \text{ 于是 } x_1 x_2 + y_1 y_2 = -\frac{3}{k^2 + 4} -$$

$$\frac{3k^2}{k^2 + 4} - \frac{2k^2}{k^2 + 4} + 1 = \frac{-4k^2 + 1}{k^2 + 4}. \text{ 所以 } k = \pm \frac{1}{2} \text{ 时,}$$

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0, \text{ 故 } \vec{OA} \perp \vec{OB}. \text{ 当 } k = \pm \frac{1}{2} \text{ 时,}$$

$$x_1 + x_2 = \mp \frac{4}{17}, x_1 x_2 = -\frac{12}{17}. |\vec{AB}| =$$

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(1 + k^2)(x_2 - x_1)^2},$$

$$\text{而 } (x_2 - x_1)^2 = (x_2 + x_1)^2 - 4x_1 x_2 = \frac{4^2}{17^2} + 4 \times$$

$$\frac{4 \times 3}{17} = \frac{4^3 \times 13}{17^2}, \text{ 所以 } |\vec{AB}| = \frac{4\sqrt{65}}{17}.$$

7. 【解析】(1) 设点 A 的坐标为 (x_1, b) , 点 B 的坐标为 (x_2, b) , 由 $\frac{x^2}{4} + b^2 = 1$, 解得 $x_{1,2} = \pm 2\sqrt{1-b^2}$, 所以 $S = \frac{1}{2}b \cdot |x_1 - x_2| = 2b \cdot$

$\sqrt{1-b^2} \leq b^2 + 1 - b^2 = 1$. 当且仅当 $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, S 取到最大值 1;

(2) 【解析】由 $\begin{cases} y = kx + b \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 得 $(k^2 + \frac{1}{4})x^2 + 2kbx + b^2 - 1 = 0$, ① $\Delta = 4k^2 - b^2 + 1$, $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_2 - x_1| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{4k^2 - b^2 + 1}}{\frac{1}{4} + k^2} =$

2. ② 设 O 到 AB 的距离为 d , 则 $d = \frac{2S}{|AB|} = 1$,

又因为 $d = \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}$, 所以 $b^2 = k^2 + 1$, 代入②式

并整理, 得 $k^4 - k^2 + \frac{1}{4} = 0$, 解得 $k^2 = \frac{1}{2}$, $b^2 =$

$\frac{3}{2}$, 代入①式检验, $\Delta > 0$, 故直线 AB 的方程

是 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{6}}{2}$,

或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{6}}{2}$.

8. 【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 依题意

$$\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3} \\ a = \sqrt{3} \end{cases} \text{ 所以 } b = 1, \text{ 所以所求椭圆方程为 } \frac{x^2}{3} +$$

$$y^2 = 1;$$

(2) 解法一: 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 当 $AB \perp x$ 轴时, $|AB| = \sqrt{3}$. 当 AB 与 x 轴不垂直时,

设直线 AB 的方程为 $y = kx + m$. 由已知 $\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 得 } m^2 = \frac{3}{4}(k^2 + 1). \text{ 把 } y = kx + m \text{ 代入椭圆方程, 整理得 } (3k^2 + 1)x^2 + 6kmx + 3m^2 - 3 =$$

$$0, \text{ 所以 } x_1 + x_2 = \frac{-6km}{3k^2 + 1}, x_1 x_2 = \frac{3(m^2 - 1)}{3k^2 + 1}. \text{ 所以 } |AB|^2 = (1 + k^2)(x_2 - x_1)^2 = (1 + k^2)$$

$$\left[\frac{36k^2 m^2}{(3k^2 + 1)^2} - \frac{12(m^2 - 1)}{3k^2 + 1} \right] = \frac{12(k^2 + 1)(3k^2 + 1 - m^2)}{(3k^2 + 1)^2} =$$

$$\frac{3(k^2 + 1)(9k^2 + 1)}{(3k^2 + 1)^2} = 3 + \frac{12k^2}{9k^4 + 6k^2 + 1} = 3 +$$

$$\frac{12}{9k^2 + \frac{1}{k^2} + 6} (k \neq 0) \leq 3 + \frac{12}{2 \times 3 + 6} = 4. \text{ 当且仅当}$$

$$9k^2 = \frac{1}{k^2}, \text{ 即 } k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 时等号成立. 当 } k = 0 \text{ 时,}$$

$$|AB| = \sqrt{3}, \text{ 综上所述 } |AB|_{\max} = 2. \text{ 所以当}$$

$$|AB| \text{ 最大时, } \triangle AOB \text{ 面积取最大值 } S = \frac{1}{2} \times$$

$$|AB|_{\max} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

解法二: 设直线 AB 的方程为 $x = ky + m$. 由已知

$$\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 得 } m^2 = \frac{3}{4}(k^2 + 1). \text{ 把 } x = ky + m \text{ 代入椭圆方程, 整理得 } (k^2 + 3)y^2 + 2kmy + m^2 - 3 =$$

$$0, \text{ 所以 } y_1 + y_2 = \frac{-2km}{k^2 + 3}, y_1 y_2 = \frac{m^2 - 3}{k^2 + 3}. \text{ 所以 } |AB|^2 =$$

$$(1 + k^2)(y_2 - y_1)^2 = \frac{12(k^2 + 1)(k^2 + 3 - m^2)}{(k^2 + 3)^2} =$$

$$\frac{3(k^2 + 1)(k^2 + 9)}{(k^2 + 3)^2} = \frac{3(t-2)(t+6)}{t^2} = 1 + \frac{4}{t} - \frac{12}{t^2}$$

≤ 4 . 当且仅当 $t = 6 = k^2 + 3$, 即 $k = \pm \sqrt{3}$ 时等号成立. 综上所述 $|AB|_{\max} = 2$. 所以当 $|AB|$ 最大

时, $\triangle AOB$ 面积取最大值 $S = \frac{1}{2} \times |AB|_{\max} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

9. 【解析】(1) 设 $B(x_0, y_0)$ 则 $C(-x_0, -y_0)$, 由 $\frac{x_0^2}{a^2} + y_0^2 = 1$ 得, $y_0^2 = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{a^2 - x_0^2}{a^2}$, 由 $k_{AB} \cdot k_{AC} = -\frac{1}{2}$, 即 $\frac{y_0}{x_0 - a} \cdot \frac{-y_0}{-x_0 - a} = -\frac{1}{2}$ 得, $y_0^2 = \frac{a^2 - x_0^2}{2}$, 所以 $\frac{a^2 - x_0^2}{a^2} = \frac{a^2 - x_0^2}{2}$, 所以 $a^2 = 2$, 所以 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$;

(2) 证明: 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \\ y = kx + t \end{cases}$ 得: $(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 2 = 0$

$0, x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{1 + 2k^2}, x_1x_2 = \frac{2t^2 - 2}{1 + 2k^2}, y_1y_2 = (kx_1 + t)(kx_2 + t) = k^2x_1x_2 + kt(x_1 + x_2) + t^2 = \frac{k^2(2t^2 - 2)}{1 + 2k^2} + \frac{-4k^2t^2}{1 + 2k^2} + t^2 = \frac{t^2 - 2k^2}{1 + 2k^2}$, 又 l 与圆 C

相切, 所以 $\frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{|t|}{\sqrt{1 + k^2}}$, 即 $\frac{2}{3} = \frac{t^2}{1 + k^2}$, 所以

$\vec{OM} \cdot \vec{ON} = x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{2t^2 - 2 + t^2 - 2k^2}{1 + 2k^2} =$

$\frac{3t^2 - 2(1 + k^2)}{1 + 2k^2} = \frac{2(1 + k^2) - 2(1 + k^2)}{1 + 2k^2} = 0$. 所

以, $\vec{OM} \perp \vec{ON}$, 即 $\angle MON = 90^\circ$, 所以, 以线段 MN 为直径的圆经过原点.

10. 【解析】(1) 由已知得 $a = 2, c = 1$, 所以 $b = \sqrt{3}$, 则 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 假设存在点 $M(x_0, 0)$, 使得 $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ 为定

值, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$, 得 $(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 =$

$-\frac{6m}{3m^2 + 4}, y_1 \cdot y_2 = -\frac{9}{3m^2 + 4}, \vec{MA} = (x_1 - x_0,$

$y_1), \vec{MB} = (x_2 - x_0, y_2)$, 所以 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (x_1 - x_0) \cdot (x_2 - x_0) + y_1 \cdot y_2 = (m^2 + 1)y_1 \cdot y_2 +$

$(1 - x_0)m(y_1 + y_2) + (1 - x_0)^2 = (m^2 + 1) \cdot (-\frac{9}{3m^2 + 4}) + (1 - x_0)m(-\frac{6m}{3m^2 + 4}) +$

$(1 - x_0)^2 = \frac{(6x_0 - 15)m^2 - 9}{3m^2 + 4} + (1 - x_0)^2$. 要使

上式为定值, 即与 m 无关, 应有 $\frac{6x_0 - 15}{3} =$

$-\frac{9}{4}$, 解得 $x_0 = \frac{11}{8}$, 此时 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -\frac{135}{64}$,

所以, 存在点 $M(\frac{11}{8}, 0)$ 使得 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -\frac{135}{64}$

为定值.

11. 【解析】(1) 曲线 Γ 上的任意一点到两定点 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ 的距离之和为 $2\sqrt{2}$, 所以 $c = 1, 2a = 2\sqrt{2}$, 所以 $a = \sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 所以曲线 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) 证明: 设直线 $l: y = kx + b, (k \neq 0, b \neq 0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), M(x_M, y_M)$, 把直线 $y = kx + b$ 代入 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 可得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4kbx + 2b^2 - 2 = 0$, 故 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-2kb}{2k^2 + 1}$,

$y_M = kx_M + b = \frac{b}{1 + 2k^2}$, 于是在 OM 的斜率为:

$K_{OM} = \frac{y_M}{x_M} = -\frac{1}{2k}$, 即 $K_{OM} \cdot k = -\frac{1}{2}$. 直线 OM

的斜率与 l 的斜率的乘积为定值;

(2) 解法一: (参考答案给出) 当直线 OA, OB 分别与坐标轴重合时, $\triangle AOB$ 的面积 $S_{\triangle AOB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当直线 OA, OB 的斜率均存在且不为零

时, 设 $OA: y = kx, OB: y = -\frac{1}{k}x$, 设 $A(x_1,$

$y_1), B(x_2, y_2)$, 将 $y = kx$ 代入椭圆 C , 得到 $x^2 + 2k^2x^2 = 2$, 所以 $x_1^2 = \frac{2}{1 + 2k^2}, y_1^2 = \frac{2k^2}{1 + 2k^2}$,

同理, $x_2^2 = \frac{2k^2}{1 + 2k^2}, y_2^2 = \frac{2}{1 + 2k^2}$, $\triangle AOB$ 的面积

$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB = \sqrt{\frac{(k^2 + 1)^2}{(1 + 2k^2)(k^2 + 2)}}$, 令 $t =$

$k^2 + 1 \in [1, +\infty)$, 则 $S_{\triangle AOB} = \sqrt{\frac{t^2}{(2t - 1)(t + 1)}} =$

$$\frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}}} = \frac{1}{\sqrt{-\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{9}{4}}}, \text{ 当 } t=2$$

时, 有最小值, 最小值为 $\frac{2}{3}$, 当 $t=1$ 时, 有

最大值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 综上所述, $\triangle AOB$ 的面积取值范围是 $\left[\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

解法二: 先算出原点到直线 AB 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$,

令 AB 方程为 $x = ky + m$, 即 $m^2 = \frac{2}{3}(1+k^2)$,

$$|AB| = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{1+k^2}\sqrt{k^2+2-m^2}}{k^2+2} = \frac{2\sqrt{6}\sqrt{1+k^2}\sqrt{k^2+4}}{3(k^2+2)},$$

令 $t = k^2 + 2 (t \geq 2)$, $|AB| = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

$$\sqrt{\frac{(t-1)(t+2)}{t^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{t}-\frac{2}{t^2}}, \text{ 当}$$

$\frac{1}{t} = \frac{1}{4}$, 即 $t=4$ 时, $|AB|_{\max} = \sqrt{3}$, 此时面积

为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 即 k 不存在时, $|AB|_{\min} =$

$\frac{2\sqrt{6}}{3}$, 此时面积为 $\frac{2}{3}$.

12. 【解析】(1) 由已知得
$$\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{|b(-a) - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \end{cases}$$

又 $a^2 = b^2 + c^2$, 解得 $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$,

所以 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, ①当直线 AB 的斜率不存在时, 则由椭圆的对称性知 $x_1 = x_2, y_1 = -y_2$, 因为以 AB 为直线的圆经过

坐标原点, 所以 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$, 所以 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 所以 $x_1^2 - y_1^2 = 0$, 又点 A 在椭圆 C

上, 所以 $\frac{x_1^2}{4} - y_1^2 = 1$, 解得 $|x_1| = |y_1| = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

此时点 O 到直线 AB 的距离 $d_1 = |x_1| = \frac{2\sqrt{5}}{5}$;

(2) 当直线 AB 的斜率存在时, 设 AB 的方程为

$$y = kx + m \text{ 联立 } \begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases} \text{ 得 } (1 + 4k^2)x^2 +$$

$8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 所以 $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1+4k^2}$,

$x_1x_2 = \frac{4m^2-4}{1+4k^2}$, 因为以 AB 为直径的圆过坐标

原点 O , 所以 $OA \perp OB$, 所以 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 所以 $(1+k^2)x_1x_2 + km(x_1+x_2) +$

$m^2 = 0$, 所以 $(1+k^2) \cdot \frac{4m^2-4}{1+4k^2} - \frac{8k^2m^2}{1+4k^2} + m^2 =$

0 , 整理, 得 $5m^2 = 4(k^2+1)$, 所以点 O 到直

线 AB 的距离 $d_1 = \frac{|m|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 综上所述,

点 O 到直线 AB 的距离为定值 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$;

(3) $\frac{4}{5} \leq S \leq 1$, S 的最小值为 $\frac{4}{5}$. 具体过程参考第 11 题的解法二.

13. 【解析】(1) 设 M 点坐标为 $(x, y) (x \neq \pm 2)$.

因为定点 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 直线 MA 与直线 MB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$, 所以 $\frac{y}{x+2} \times \frac{y}{x-2}$

$= -\frac{1}{4}$, 所以 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$;

(2) 证明: 当动直线 l 的斜率不存在时,

$$P\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), Q\left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\text{若 } S\left(-\frac{17}{8}, 0\right), \vec{SP} \cdot \vec{SQ} = \frac{33}{64}.$$

当动直线 l 的斜率存在时, 设动直线 l 的方程为 $y = k(x+1) (k \neq 0)$, 联立方程组, 消去 y 得 $(1+4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 4 = 0$. 设 $P(x_1, y_1),$

$Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{1+4k^2}, x_1x_2 =$

$\frac{4k^2-4}{1+4k^2}$. 所以 $\vec{SP} = \left(x_1 + \frac{17}{8}, y_1\right), \vec{SQ} =$

$\left(x_2 + \frac{17}{8}, y_2\right)$, 所以 $\vec{SP} \cdot \vec{SQ} = \left(x_1 + \frac{17}{8}\right) \cdot$

$\left(x_2 + \frac{17}{8}, y_2\right) = \frac{-4(1+4k^2)}{1+4k^2} + \frac{17^2}{8^2} = \frac{33}{64}$.

专题 5 抛物线设点设线基础

达标训练

1. C 【解析】设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由 $y_1^2 = 6x_1, y_2^2 = 6x_2$, 相减可得 $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) =$

$6(x_1 - x_2)$, 因为 $y_1 + y_2 = 4$, 所以 $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} =$

$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, 故选 C.

2. B 【解析】抛物线的焦点坐标为 $F(1, 0)$, 若 $\triangle ABF$ 是等边三角形, 由对称性知, A, B 必关于 x 轴对称, 假设 A 在第一象限, 则只需要直线 AF 的倾斜角为 30° , 即可, 而焦点 F 在抛物线内, 故直线 AF 与抛物线有两个交点, 则对应的三角形 ABF 有两个, 故满足条件的等边 $\triangle ABF$ 的个数为 2 个, 故选 B.

3. A 【解析】由题意知, 抛物线 $y^2 = x$ 的焦点坐标点 $(\frac{1}{4}, 0)$, 直线 AB 的方程为 $x = ky + \frac{1}{4}$, 联立得 $y^2 - ky - \frac{1}{4} = 0$. 所以 $y_1 \cdot y_2 = -\frac{1}{4}$, $x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{16}$. 所以 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 = \frac{1}{16} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{16}$, 故选 A.

4. D 【解析】直线 $l: \sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 经过点 $F(1, 0)$, 可得 $p = 2$, 即抛物线 $C: y^2 = 4x$, 准线方程为 $x = -1$, 联立直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 根据焦半径公式 $|AB| = x_A + x_B + p = x_A + x_B + 2$, 联立可得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, $x_A + x_B = \frac{10}{3}$, $|AB| = \frac{16}{3}$, 根据直角三角形射影定理的逆定理, 要证明 $MF \perp NF$, 只需 $|y_M| \cdot |y_N| = |2OF|^2 = p^2$, 由于 AB 是过焦点的弦, 故 $y_M y_N = -p^2$, 则 $MF \perp NF$ 即 $\angle MFN = 90^\circ$, 线段 AB 的中点为 $(\frac{5}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3})$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为 $\frac{5}{3}$, 综上可得 A, B, C 正确, D 错误. 故选 D.

5. A 【解析】如图所示, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$. 设 AB 中点为 G , 过 G 作抛物线准线的垂线, 垂足为 H , 则 $GH = \frac{1}{2}AB$, 即以 AB 为直径的圆与抛物线准线相切, 所以以线段 AB 为直径的圆与直线 l 的位置关系为相交. 故选 A.

6. C 【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 线段 AB 的中点 M 的纵坐标为 1, $y_1 + y_2 = 2$, 则 $y_1^2 = 2px_1$, $y_2^2 = 2px_2$, 两式相减可得: $y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$, $k_{AB} = \frac{2p}{y_1 + y_2} = \frac{2p}{2} = p$, 所以 $p = 2$. 故选 C.
7. B 【解析】由题意可得, 弦所在直线斜率存在, 设弦所在直线方程为 $x - 1 = k(y - 1)$, 代入抛物线的方程可得 $y^2 - 4ky - 4k - 4 = 0$, 由 $y_1 + y_2 = 4k = 2$ 可得, $k = \frac{1}{2}$, 故弦所在直线方程为 $2x - y - 1 = 0$, 故选 B.
8. C 【解析】设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 因为直线 OD 斜率为 $\frac{1}{2}$, $OD \perp AB$, 所以直线 AB 斜率为 -2 , 故直线 AB 方程为 $2x + y - 5 = 0$...①将①代入抛物线方程得 $y^2 + py - 5p = 0$, 则 $y_1 y_2 = -5p$, 因为 $y_1^2 = 2px_1$, $y_2^2 = 2px_2$, 则 $(y_1 y_2)^2 = 4p^2 x_1 x_2$, 故 $x_1 x_2 = \frac{25}{4}$, 因为 $OA \perp OB$. 所以 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$, 因为 $p > 0$, 所以 $p = \frac{5}{4}$. 故选 C.

9. B 【解析】设直线 AB 方程为 $x = ky + m$. 由

$$\begin{cases} x = ky + m \\ y^2 = 2px \end{cases} \text{ 消去 } x \text{ 得 } y^2 - 2pk y - 2pm = 0. \text{ 设}$$

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), y_1 y_2 = -2pm, x_1 x_2 =$$

$$\frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} = m^2, \text{ 所以由 } OA \perp OB \text{ 得 } \vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_1 x_2 +$$

$$y_1 y_2 = m^2 - 2pm = 0. \text{ 所以直线 } l \text{ 过定点 } (2p, 0).$$

$$\text{因为 } y_1 y_2 = -4p^2, \text{ 所以 } |y_1 - y_2| = \left| y_1 + \frac{4p^2}{y_1} \right| \geq$$

$$4p, \text{ 所以 } S = \frac{1}{2} \times \left(2p - \frac{p}{2} \right) \times |y_1 - y_2|, \text{ 所以}$$

当 $y_1 = 2p$ 时, S 的最小值为 $3p^2$. $\triangle ABF$ 面积的最小值为 12, 可得 $p = 2$. 故选 B.

10. D 【解析】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $S_{\triangle ODE} =$

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{4} \times |y_1 - y_2| = \frac{25\sqrt{2}}{8}, \text{ 所以 } |y_1 - y_2| =$$

$$5\sqrt{2}, \text{ 设直线 } AB \text{ 的方程为 } x = ky + \frac{5}{4}, \text{ 联立方程}$$

$$\begin{cases} y^2 = 5x \\ x = ky + \frac{5}{4} \end{cases}, \text{ 消去 } x \text{ 得: } y^2 - 5ky - \frac{25}{4} = 0, \text{ 所}$$

$$\text{以 } y_1 + y_2 = 5k, y_1 y_2 = -\frac{25}{4}, \text{ 所以 } |y_1 - y_2| =$$

$$\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{25k^2 + 25} = 5\sqrt{k^2 + 1},$$

$$\text{所以 } \sqrt{k^2 + 1} = \sqrt{2}. \text{ 所以 } |AB| = \sqrt{1 + k^2}$$

$$|y_1 - y_2| = \sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = 10. \text{ 故选 D.}$$

11. B 【解析】抛物线准线为 $x = -\frac{1}{2}$, 过 A, B 作

准线的垂线 AP, BQ , 则 $BQ = BF = 2$, 不妨设 B 在第一象限, 则 $B\left(\frac{3}{2}, \sqrt{3}\right)$, 设直线 AB 的

$$\text{方程为 } x = my + \sqrt{3}, \text{ 联立方程组 } \begin{cases} x = my + \sqrt{3} \\ y^2 = 2x \end{cases},$$

$$\text{消去 } x \text{ 可得 } y^2 - 2my - 2\sqrt{3} = 0, \text{ 所以 } y_A \cdot y_B =$$

$$-2\sqrt{3}, \text{ 故而 } y_A = -2, x_A = \frac{y_A^2}{2} = 2, \text{ 所以 } AP =$$

$$x_A + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \text{ 所以 } \frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}} = \frac{BC}{AC} = \frac{BQ}{AP} = \frac{4}{5}. \text{ 故}$$

选 B.

12. D 【解析】抛物线的准线方程为 $l: x = -1$, 分别过 A, B 作准线 l 的垂线 AM, BN , 则

$|BN| = |BF| = 5$, 所以 B 点横坐标为 4, 不妨设 $B(4, -4)$, 则直线 AB 的方程为: $y = 4x -$

$$20, \text{ 联立方程组 } \begin{cases} y = 4x - 20 \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{ 得 } 4x^2 - 41x +$$

$$100 = 0, \text{ 设 } A \text{ 横坐标为 } x_0, \text{ 则 } x_0 + 4 = \frac{41}{4}, \text{ 故}$$

$$\text{而 } x_0 = \frac{25}{4}. \text{ 所以 } |AM| = x_0 + 1 = \frac{29}{4}, \text{ 所以}$$

$$\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}} = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{|BN|}{|AM|} = \frac{20}{29}. \text{ 故选 D.}$$

13. B 【解析】分别过 A, B 作抛物线的准线作垂线, 垂足分别为 M, N , 则 $AF = AM, BF = BN$, 因为 $\sin \angle ABF = 2\sin \angle BAF$, 所以 $AF = 2BF$,

所以 $AM = 2BN$, 所以 $\frac{PB}{PA} = \frac{BN}{AM} = \frac{1}{2}$, 即 B 为 AP

的中点. 联立方程组 $\begin{cases} x = ky - 2 \\ y^2 = 8x \end{cases}$, 消去 x 可得:

$$y^2 - 8ky + 16 = 0, \text{ 设 } A\left(\frac{y_1^2}{8}, y_1\right), B\left(\frac{y_2^2}{8}, y_2\right),$$

则 $y_1 y_2 = 16$, 又 B 是 PA 的中点, 所以 $y_1 = 2y_2$,

所以 $y_2 = 2\sqrt{2}$, 即 $B(1, 2\sqrt{2})$, 又 $P(-2, 0)$,

所以直线 AB 的斜率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故选 B.

14. D 【解析】联立 $\begin{cases} 2x - y - 3 = 0 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 可得 $y^2 - 2y - 6 = 0$, $y_1 + y_2 = 2$, 则 $\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{x_1}{y_1} + \frac{x_2}{y_2} =$

$$\frac{y_1 + y_2}{4} = \frac{1}{2}. \text{ 故选 D.}$$

15. B 【解析】当直线 AB 的斜率不存在时, 此时 AB 的方程为 $x=1$, 所以 $y = \pm 1$, 所以 $S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2} |AB| \times 1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$, 当直线的斜率存在时, 设直线方程为 $x = ky + 1$, 代入抛物线方程可化为 $y^2 - ky - 1 = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 所以 $y_1 + y_2 = k, y_1 y_2 = -1$, 所以 $S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2} \times 1 \times |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \left| y_1 + \frac{1}{y_1} \right| \geq 1$, 综上所述 $\triangle ABO$ 面积的最小值是 1, 故选 B.

16. D 【解析】设 $P(a, b) Q(x, y)$, 则 $\vec{AP} = (a + 1, b - 1), \vec{PQ} = (x - a, y - b)$, 由垂直得 $(a + 1)(x - a) + (b - 1)(y - b) = 0$. 又 P, Q 在抛物线上即 $a^2 = b, x^2 = y$, 故 $(a + 1)(x - a) + (a^2 - 1)(x^2 - a^2) = 0$. 整理得 $(a + 1)(x - a)[1 + (a - 1)(x + a)] = 0$, 而 P 和 Q 和 A 三点不重合即 $a \neq -1$, 又 $x \neq a$. 所以式子可化为 $1 + (a - 1)(x + a) = 0$, 整理得 $a^2 + (x - 1)a + 1 - x = 0$. 由题意可知, 此关于 a 的方程有

实数解. 即判别式 $\Delta \geq 0$ 得 $(x - 1)^2 - 4(1 - x) \geq 0$, 解得 $x \leq -3$ 或 $x \geq 1$, 点 Q 的横坐标取值范围是 $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$. 故选 D.

17. B 【解析】如图所示, $F(2, 0)$, 过点 P 作 $PN \perp l$, 垂足为 N . 因为 $|PM| = \sqrt{2} |PF|, |PF| = |PN|$, 所以 $|PM| = \sqrt{2} |PN|$, 设 $P\left(\frac{t^2}{8}, t\right)$, 则 $\pm t = \frac{t^2}{8} + 2$, 解得 $t = \pm 4$. 所以 $\triangle PMF$ 的面积 = $\frac{1}{2} \times |t| \cdot |MF| = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$. 故选 B.

18. C 【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $F(2, 0)$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 易知 $y_1 y_2 = 16$, 延长 BF 与抛物线交于另一点 $C(x_3, y_3)$, 易知 $y_2 y_3 = -16$, 故 A, C 关于 y 轴对称, 故直线 FA 与直线 FB 的斜率之和为 0, 故选 C.

19. 【解析】(1) 设点 $P(x, y)$, 则

$$\sqrt{(x-0)^2 + \left(y - \frac{1}{8}\right)^2} = \left|y + \frac{1}{8}\right|, \text{ 平方整理}$$

得: $x^2 = \frac{1}{2}y$, 所以曲线 C 的方程, $x^2 = \frac{1}{2}y$;

(2) 证明: 由题意可知直线 AB 的斜率一定存在, 否则不与曲线 C 有两个交点. 设 AB 方程为 $y = kx + m$, 设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立方程 } \begin{cases} y = kx + m \\ y = 2x^2 \end{cases}, \text{ 得 } 2x^2 - kx - m = 0, \text{ 则}$$

得 $x_1 + x_2 = \frac{k}{2}, x_1 x_2 = -\frac{m}{2}$, 由 $x^2 = \frac{1}{2}y$ 得:

$$y_1 = 2x_1^2, y_2 = 2x_2^2. \Delta = k^2 + 8m > 0. y_1 y_2 = 2x_1^2 \cdot 2x_2^2 = 4(x_1 x_2)^2 = 4 \times \left(-\frac{m}{2}\right)^2 = m^2. \Delta = k^2 + 8m,$$

直线 AB 过 $\triangle AOB$ 的外心, 其中 O 为坐标原点, 所以 $OA \perp OB$. 所以 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_1 x_2 +$

$y_1 y_2 = 0$, 所以 $-\frac{m}{2} + m^2 = 0$. $m \neq 0$, 解得 $m = \frac{1}{2}$. 所以直线 AB 过定点 $(0, \frac{1}{2})$.

20. 【解析】(1) 依题意设直线 l_1 的方程为 $y = x + \frac{p}{2}$, 由已知得: 圆 $C_2: (x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心 $C_2(-1, 0)$, 半径 $r = \sqrt{2}$, 因为直线 l_1 与圆 C_2 相切, 所以圆心到直线 $l_1: y = x + \frac{p}{2}$ 的距离

$$d = \frac{\left| -1 + \frac{p}{2} \right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}, \text{ 即 } \frac{\left| -1 + \frac{p}{2} \right|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$

解得 $p = 6$ 或 $p = -2$ (舍去). 所以 $p = 6$;

(2) 依题意设 $M(m, -3)$, 由(1)知抛物线 C_1 方程为 $x^2 = 12y$, 所以 $y = \frac{x^2}{12}$, 所以 $y' = \frac{x}{6}$,

设 $A(x_1, y_1)$, 则以 A 为切点的切线 l_2 的斜率为 $k = \frac{x_1}{6}$, 所以切线 l_2 的方程为 $y = \frac{1}{6}x_1(x - x_1) + y_1$. 令 $x = 0$, $y = -\frac{1}{6}x_1^2 + y_1 = -\frac{1}{6} \times$

$12y_1 + y_1 = -y_1$, 即 l_2 交 y 轴于 B 点坐标为 $(0, -y_1)$, 所以 $\vec{MA} = (x_1 - m, y_1 + 3)$, $\vec{MB} =$

$(-m, -y_1 + 3)$, 所以 $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{MB} = (x_1 - 2m, 6)$, 所以 $\vec{ON} = \vec{OM} + \vec{MN} = (x_1 - m,$

$3)$. 设 N 点坐标为 (x, y) , 则 $y = 3$, 所以点 N 在定直线 $y = 3$ 上.

21. 【解析】(1) 设 $D(x, y)$, 则 $k_{BD} - k_{AD} = \frac{y-2}{x-2} -$

$\frac{y-2}{x+2} = 2$, 整理为: $x^2 = 2y$, 所以曲线 C 的方程为 $x^2 = 2y$, ($x \neq \pm 2$);

(2) 假设在 y 轴上存在定点 $G(0, y_0)$, 使得 $\angle PCT = \angle QCT$, 可知: 直线 PQ 的斜率存在.

设 PQ 的方程为: $y = kx + 2$, 代入抛物线方程可得: $x^2 - 2kx - 4 = 0$, $\Delta = 4k^2 + 16 > 0$ 恒成立, 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$. 则 $x_1 + x_2 = 2k$, $x_1 x_2 = -4$, 因为 $\angle PCT = \angle QCT$, 所以 $k_{CP} + k_{CQ} = 0$. 所以 $\frac{y_1 - y_0}{x_1} + \frac{y_2 - y_0}{x_2} = 0$, 所以 $(kx_1 + 2 - y_0) + (kx_2 + 2 - y_0)x_1 = 0$, 化为 $2kx_1 x_2 + (2 - y_0)(x_1 + x_2) = 0$, 所以 $-8k + (2 - y_0) \cdot 2k = 0$, 即 $k(2 + y_0) = 0$, 所以 $y_0 = -2$, 因此在 y 轴上存在定点 $G(0, -2)$, 使得 $\angle PCT = \angle QCT$.

22. 【解析】(1) 由题意, $S_{\triangle MON} = \frac{1}{2} \cdot |OA| \cdot$

$|MN| = \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{2} \cdot 2p = \frac{p^2}{2} = 18$, 所以 $p = 6$, 抛物线 C 的标准方程为 $y^2 = 12x$;

(2) 设直线 MN 的参数方程为 $\begin{cases} x = m + t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$,

代入抛物线方程得: $t^2 \sin^2 \alpha = 12(t \cos \alpha + m)$,

故 $t_1 + t_2 = \frac{12 \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}$; $t_1 t_2 = \frac{-12m}{\sin^2 \alpha}$, $\frac{1}{|AM|} +$

$\frac{1}{|AN|} = \left| \frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2} \right| = \sqrt{\left(\frac{t_1 - t_2}{t_1 t_2} \right)^2} = \frac{\cos^2 \alpha}{m^2} +$

$\frac{\sin^2 \alpha}{3m}$ 为定值时 (注意, 这里是很多学生会搞错的, 搞清楚这里, 后面就一马平川了), 必有

$m^2 = 3m = 9$ 时成立. 即 $a = 3$ 时, t 与 m 无关, 所以所求的“稳定点”为 $(3, 0)$.

23. 【解析】(1) 因为点 M 到抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 焦点 F 的距离为 1, 所以点 M 到准线 $l: y =$

$-\frac{p}{2}$ 的距离为 1, 即 $\frac{p}{2} + \frac{3}{4} = 1$, 解得 $p = \frac{1}{2}$,

所以抛物线的标准方程为 $x^2 = y$;

(2) 设点 $M(m, m^2)$ ($m \neq 0$), $M_1(x_1, x_1^2)$, $M_2(x_2, x_2^2)$, 因为 $k_{AM} = \frac{m^2 + 2}{m}$, 所以直线 AM

的方程为: $y = \frac{m^2 + 2}{m}x - 2$; 由 $\begin{cases} y = \frac{m^2 + 2}{m}x - 2 \\ x^2 = y \end{cases}$,

消去 y , 得 $x^2 - \frac{m^2 + 2}{m}x + 2 = 0$; 由 $\Delta > 0$, 得

$m^2 \neq 2$, 即 $m \neq \pm \sqrt{2}$, 又因为 $mx_1 = 2$, 所以

$x_1 = \frac{2}{m}$; 同理可得: $x_2 = -\frac{1}{m}$; 所以 $k_1 =$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 = \frac{1}{m}, k_2 = \frac{m^2}{m} = m; \text{ 所以 } k_1 \cdot k_2 = \frac{1}{m} \times m = 1, \text{ 所以 } k_1 \cdot k_2 \text{ 为定值 } 1.$$

24. 【解析】(1) 根据题意知: $k_{MN} = \frac{-2-2}{5-1} = -1$,

由于 $MN \perp AB$, 则 $k_{AB} = 1$, 于是直线 l 的方程为: $y - (-2) = 1 \cdot (x - 5)$, 即直线 l 的方程为 $x - y - 7 = 0$;

(2) 证明: 由于点 M 在抛物线上, 所以得抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 设点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线 l 的方程为: $x = m(y + 2) + 5$, 联立抛物线的方程, 整理得 $y^2 - 4my - (8m + 20) = 0$, 即: $y_1 + y_2 = 4m$, $y_1 y_2 = -8m - 20$, 又 $\vec{AM} =$

$(x_1 - 1, y_1 - 2)$, $\vec{BM} = (x_2 - 1, y_2 - 2)$, 于是:

$$\begin{aligned} \vec{AM} \cdot \vec{BM} &= (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (y_1 - 2)(y_2 - 2) = \\ &= x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 + y_1 y_2 - 2(y_1 + y_2) + 4 = \\ &= \frac{(y_1 y_2)^2}{16} - m(y_1 + y_2) - 4m - 10 + 1 + y_1 y_2 - \\ &= 2(y_1 + y_2) + 4 = \frac{(8m + 20)^2}{16} - m(4m) - 4m - 9 - \\ &= (8m + 20) - 2(4m) + 4 = 0, \text{ 所以 } \angle AMB = 90^\circ, \text{ 即点 } M \text{ 在以 } AB \text{ 为直径的圆上.} \end{aligned}$$

25. 【解析】(1) 由 $\begin{cases} x = p \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = p \\ y = \pm\sqrt{2}p \end{cases}$, 从而

$$A(p, \sqrt{2}p), B(p, -\sqrt{2}p), \text{ 从而 } S_{\triangle AOM} = \frac{1}{2} \cdot$$

$$p \cdot \sqrt{2}p = \frac{\sqrt{2}}{2} p^2, S_{\triangle FAB} = 2S_{\triangle AFM} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{2} \cdot$$

$$\sqrt{2}p = \frac{\sqrt{2}}{2} p^2, \text{ 所以 } S_{\triangle AOM} = S_{\triangle FAB}, \text{ 所以 } \lambda = 1$$

(2) 设直线 $l: x = ky + p$, 代入 $y^2 = 2px$ 整理得, $y^2 - 2pky - 2p^2 = 0$, 所以 $y_1 y_2 = -2p^2 \Rightarrow y_2 = \frac{-2p^2}{y_1}$, 由 $S_{\triangle AOM} = \frac{4}{3} \cdot S_{\triangle FAB}$ 得 $\frac{1}{2} p |y_1| = \frac{4}{3} \cdot$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(p - \frac{p}{2}\right) \left|y_1 + \frac{2p^2}{y_1}\right| \Rightarrow y_1 = \pm 2p \Rightarrow x_1 = 2p, \text{ 直线 } l: y = \pm 2(x - p)$$

(3) 命题甲: $S_{\triangle AOM} = 2 \cdot S_{\triangle FAB} \Rightarrow \frac{1}{2} p |y_1| = 2 \cdot$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(p - \frac{p}{2}\right) \left|y_1 + \frac{2p^2}{y_1}\right| \Rightarrow y_1 = y_1 + \frac{2p^2}{y_1}, \text{ 矛盾;}$$

(4) 命题乙: $S_{\triangle AOM} = 2 \cdot S_{\triangle FAB} \Rightarrow \frac{1}{2} p |y_1| = 2 \cdot$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(x_0 - \frac{p}{2}\right) \left|y_1 + \frac{2p^2}{y_1}\right|, \text{ 令 } x_0 = mp \left(m > \frac{1}{2}\right),$$

$$\text{故 } y_1^2 = \frac{1-2m}{m-1} p^2, \text{ 即 } \frac{1-2m}{m-1} > 0 \Rightarrow \frac{1}{2} < m < 1,$$

$$\text{即 } \frac{p}{2} < x_0 < p.$$

26. 【解析】令 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $A'(x_3, y_3)$, $B'(x_4, y_4)$, 联立可知 $A'\left(\frac{1}{x_1}, -\frac{4}{y_1}\right)$,

$$B'\left(\frac{1}{x_2}, -\frac{4}{y_2}\right); k_{A'B'} = 2k_{AB} \Rightarrow \frac{\left(-\frac{4}{y_1}\right) - \left(-\frac{4}{y_2}\right)}{\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}} =$$

$$2 \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \Rightarrow y_1 y_2 = -2x_1 x_2 \Rightarrow y_1 y_2 = -8. \text{ 故 } y_1 y_2 =$$

$$-8 = -4m \Rightarrow m = 2, \text{ 即 } AB \text{ 过定点 } (2, 0), \text{ 同理}$$

$A'B'$ 过定点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

专题 6 设点设线进阶之角度问题

达标训练

1. C 【解析】 $\tan \angle AMB = -1$, $\tan \angle MAB = \frac{1}{3}$, 可

$$\text{得 } \tan \angle MBN = -\frac{\tan \angle AMB + \tan \angle MAB}{1 - \tan \angle AMB \tan \angle MAB} = \frac{1}{2},$$

AB 是椭圆 C 长轴长的两个顶点, $k_{MA} = \frac{1}{2}$,

$$k_{MB} = -\frac{1}{3}, \text{ 故 } k_{MA} \cdot k_{MB} = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1 = -\frac{1}{6},$$

故选 C.

2. C 【解析】 $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$. 设 $M(x_0, y_0)$, $k_{AP} \cdot k_{BP} = -\frac{b^2}{a^2} \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right)$, 可得:

$$\frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right), \text{ 所以 } e \in \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, 1\right),$$

故选 C.

3. D 【解析】线段 AB 的中点为 $(2, 1)$, 由 $\frac{4}{36} + \frac{1}{18} < 1$, 可得 AB 的中点在椭圆内, 即直线 AB 与椭圆相交, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 可得 $\frac{x_1^2}{36} + \frac{y_1^2}{18} = 1$, $\frac{x_2^2}{36} + \frac{y_2^2}{18} = 1$, 相减可得 $\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{36} + \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{18} = 0$, 又 $x_1 + x_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 2$, 则 l 的斜率为 $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{x_1 + x_2}{2(y_1 + y_2)} = -\frac{4}{2 \times 2} = -1$, 故选 D.

4. B 【解析】由椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 可知其左顶点 $A_1(-2, 0)$, 右顶点 $A_2(2, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq \pm 2$), 则 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3} = 1$, 得 $\frac{y_0^2}{x_0^2 - 4} = -\frac{3}{4}$. 因为 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - 4} = -\frac{3}{4}$, 因为 $-2 \leq k_{PA_2} \leq -1$, 所以 $-2 \leq -\frac{3}{4k_{PA_1}} \leq -1$, 解得 $\frac{3}{8} \leq k_{PA_1} \leq \frac{3}{4}$. 故选 B.

5. D 【解析】设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1 \end{cases}$, 相减得 $\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0$, 所以 $\frac{x_1 + x_2}{a^2} + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{b^2} = 0$, 因为 $x_1 + x_2 = 2$, $y_1 + y_2 = -2$. $k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{-1 - 0}{1 - 3} = \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{2}{a^2} + \frac{1}{2} \times \frac{-2}{b^2} = 0$, 化为 $a^2 = 2b^2$, 又 $c = 3 = \sqrt{a^2 - b^2}$, 解得 $a^2 = 18$, $b^2 = 9$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$. 故选 D.

6. 【解析】设过点 $A(2, 1)$ 的直线与双曲线交于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 则 $\begin{cases} 3x_1^2 - y_1^2 = 3 \\ 3x_2^2 - y_2^2 = 3 \end{cases}$ 两式相减得 $3(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) - (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 0$ 又 $x_1 + x_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 2$ 代入, $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 6$ 即

$k_{PQ} = 6$. 故所求直线方程为 $6x - y - 11 = 0$.

7. 【解析】设过点 $B(1, 1)$ 的直线与双曲线交于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 则 $\begin{cases} 3x_1^2 - y_1^2 = 3 \\ 3x_2^2 - y_2^2 = 3 \end{cases}$ 两式相减得 $3(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) - (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 0$. 又 $x_1 + x_2 = 2$, $y_1 + y_2 = 2$ 代入, $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 3$ 即 $k_{PQ} = 3$, 故所求直线方程为 $y = 3x - 2$, 将 $y = 3x - 2$ 代入 $3x^2 - y^2 = 3$ 得, 发现 $6x^2 - 12x + 7 = 0$, $\Delta < 0$, 故以定点 $B(1, 1)$ 为中点的弦不存在.

8. 【解析】(1) 对于 $x + \sqrt{2}y - 2 = 0$, 当 $x = 0$ 时, $y = \sqrt{2}$, 即 $b = \sqrt{2}$, 当 $y = 0$, $x = 2$, 即 $a = 2$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$;

(2) 证明: 设直线 $AB: y = kx + 2$, ($k \neq 0$), 设 A, B 两点的坐标分别为 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , 则 $B'(-x_2, y_2)$, 联立直线 AB 与椭圆得 $\begin{cases} y = kx + 2 \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$, 得 $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 4 = 0$. 所以

$$x_1 + x_2 = -\frac{8k}{1 + 2k^2}, x_1 x_2 = \frac{4}{1 + 2k^2}, \text{ 所以 } k_{AB'} =$$

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2}, \text{ 所以直线 } AB': y - y_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2}(x - x_1), \text{ 所}$$

$$\text{以令 } x = 0, \text{ 得 } y = \frac{x_1 y_2 + x_2 y_2}{x_1 + x_2} = \frac{x_1(kx_2 + 2) + x_2(kx_1 + 2)}{x_1 + x_2} =$$

$$\frac{2kx_1 x_2}{x_1 + x_2} + 2 = 2k \cdot \frac{4}{1 + 2k^2} + 2 = -1 + 2 = 1, \text{ 所以}$$

直线 AB' 过定点 $Q(0, 1)$.

9. 【解析】(1) 设椭圆 C 的方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$,

$$\text{且 } c = 2, 2a = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2} + 2\right)^2} +$$

$$\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2} - 2\right)^2} = 2\sqrt{10}, \text{ 即有 } a = \sqrt{10},$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{6}, \text{ 则椭圆的方程为 } \frac{y^2}{10} + \frac{x^2}{6} = 1;$$

(2) 由于 $A\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 在第一象限, 故 $\frac{y^2}{10} + \frac{x^2}{6} = 1$

$$\Rightarrow y = \sqrt{10 - \frac{5}{3}x^2} \text{ 求导得 } y' = \frac{5}{3}x \left(10 - \frac{5}{3}x^2\right)^{-\frac{1}{2}},$$

$k_2 = -1$. 将坐标系按照 $\vec{AO} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ 平

移得, $\frac{\left(y + \frac{5}{2}\right)^2}{10} + \frac{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2}{6} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{10} + \frac{x^2}{6} + \frac{x}{2}$

$+ \frac{y}{2} = 0$, 平移后 $E \rightarrow E'$, $F \rightarrow F'$, 设 $E'F'$ 方程

为 $mx + ny = 1$, 即 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{5} + x + y = \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{5} + (x$

$+ y)(mx + ny) = 0$ (构造齐次式), 同除以 x^2 得,

$\left(\frac{1}{5} + n\right)\frac{y^2}{x^2} + (m + n)\frac{y}{x} + \frac{1}{3} + m = 0$, 因为点

E', F' 的坐标满足这个方程, 所以 $k_{OE'}, k_{OF'}$ 是

这个关于 $\frac{y}{x}$ 的方程的两个根. 所以 $k_{OE'} + k_{OF'} =$

$k_{AE} + k_{AF} = -\frac{m+n}{\frac{1}{5}+n} = 0 \Rightarrow m+n=0$, 故 $k_1 = -\frac{m}{n} =$

1, 则 $k_1 + k_2 = 0$.

10. 【解析】(1) 由题设知, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b = 1$, 结合 $a^2 = b^2 + c^2$, 解得 $a = \sqrt{2}$, 所以 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) 证明: 将坐标系按照 $\vec{AO} = (0, 1)$ 平移得:

$\frac{x^2}{2} + (y-1)^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{2} + y^2 - 2y = 0$, 平移后 P

$\rightarrow P', Q \rightarrow Q'$, 设 $P'Q'$ 方程为 $mx + ny = 1$, 由于 PQ 过点 $(1, 1)$, 故 P', Q' 过点 $(1, 2)$ 即 m

$+ 2n = 1$ 即 $\frac{x^2}{2} + y^2 - 2y = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2y(mx + ny)$

$= 0$ (构造齐次式), 同除以 x^2 得, $(1 - 2n)\frac{y^2}{x^2}$

$- 2m\frac{y}{x} + \frac{1}{2} = 0$, 因为点 P', Q' 的坐标满足

这个方程, 所以 $k_{OP'}, k_{OQ'}$ 是这个关于 $\frac{y}{x}$ 的方

程的两个根, 所以 $k_{OP'} + k_{OQ'} = k_{PA} + k_{QA} = -\frac{2m}{1-2n}$

$= \frac{2(1-2n)}{1-2n} = 2$, 即有直线 AP 与 AQ 斜率之和

为 2.

11. 【解析】(1) 如图 1, 设 $M(x, y)$, $A(x_0, y_0)$, 因为 $|DM| = m|DA|$, 所以 $x = x_0$, $|y| = m|y_0|$, 所以 $x_0 = x$, $|y_0| = \frac{1}{m}|y|$ ①. 因为点 A

在圆上运动, $x_0^2 + y_0^2 = 1$ ②, ①代入②即得所求

曲线 C 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{m^2} = 1 (m > 0, m \neq 1)$.

因为 $m \in (0, 1) \cup (1, \infty)$, 所以 $0 < m < 1$

时, 曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆, 两焦点坐

标分别为 $(-\sqrt{1-m^2}, 0)$, $(\sqrt{1-m^2}, 0)$ m

> 1 时, 曲线 C 是焦点在 y 轴上的椭圆, 两焦

点坐标分别为 $(0, -\sqrt{m^2-1})$, $(0, \sqrt{m^2-1})$;

(2) 如图 2、3, $\forall x_1 \in (0, 1)$, 设 $P(x_1, y_1)$,

$H(x_2, y_2)$, 则 $Q(-x_1, -y_1)$, $N(0, y_1)$,

因为 P, H 两点在椭圆 C 上,

$$\text{所以 } \begin{cases} m^2 x_1^2 + y_1^2 = m^2 \text{ ①} \\ m^2 x_2^2 + y_2^2 = m^2 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 可得 } \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)} = -m^2 \text{ ③,}$$

因为 Q, N, H 三点共线, 所以 $k_{QN} = k_{QH}$,

$$\text{所以 } \frac{2y_1 + y_2}{x_1 + x_2}, \text{ 所以 } k_{PQ} \cdot k_{PH} = \frac{y_1(y_1 - y_2)}{x_1(x_1 - x_2)} =$$

$-\frac{m^2}{2}$, 因为 $PQ \perp PH$, $k_{PQ} \cdot k_{PH} = -1$, 所以

$-\frac{m^2}{2} = -1$, 所以 $m = \sqrt{2}$ 故存在 $m = \sqrt{2}$, 使得

在其对应的椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 上, 对任意 $k > 0$,

都有 $PQ \perp PH$.

图 1

图 2 ($0 < m < 1$)

图 3 ($m > 1$)

12. 【解析】(1) 由题意, 可设直线 AB 的方程为 $y = kx + m$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, AB 中点

$$M(x_0, y_0) \text{ 可得 } \begin{cases} \frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1 \text{ ①} \\ \frac{x_2^2}{2} + y_2^2 = 1 \text{ ②} \end{cases}, \text{ ①} - \text{②} \text{ 得:}$$

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{2} + (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 0, \text{ 同除}$$

$$\text{以}(x_1 - x_2) \text{ 得 } k = -\frac{x_0}{2y_0}, \text{ 根据题意, } m = -\frac{1}{k},$$

$$\text{代入点 } M(x_0, y_0) \text{ 即 } y_0 = \frac{2y_0}{x_0} \cdot x_0 + \frac{1}{2} \Rightarrow y_0 =$$

$$-\frac{1}{2}, \text{ 点 } M(x_0, y_0) \text{ 在椭圆内, 故 } -\frac{\sqrt{6}}{2} < x_0 < \frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$m = \frac{2y_0}{x_0} = -\frac{1}{x_0} \in \left(-\infty, \frac{\sqrt{6}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, +\infty\right);$$

$$(2) y + \frac{1}{2} = k(x - x_0) \Rightarrow y = kx - \left(x_0^2 + \frac{1}{2}\right),$$

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|, d = \frac{\left|x_0^2 + \frac{1}{2}\right|}{\sqrt{1+k^2}}, \text{ 所以}$$

$$S_{\triangle OAB} = \sqrt{2} \left| x_0^2 + \frac{1}{2} \right| \frac{\sqrt{2k^2 + 1 - \left(x_0^2 + \frac{1}{2}\right)^2}}{2k^2 + 1} =$$

$$\sqrt{2} \left| x_0^2 + \frac{1}{2} \right| \frac{\sqrt{2x_0^2 + 1 - \left(x_0^2 + \frac{1}{2}\right)^2}}{2x_0^2 + 1} \text{ (不要问}$$

为什么, 去找前面的椭圆的设点设线基础部分)

$$\text{令 } x_0^2 + \frac{1}{2} = t \in (0, 2), \text{ 所以 } S_{\triangle OAB} =$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{2t - t^2}, \text{ 当且仅当 } t = 1, S_{\triangle OAB} \text{ 取得最大值}$$

$$\text{为 } \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

专题7 定比点差法破解极点与极线

←←← 达标训练

1. 【解析】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由 $P(0, 1)$,

$$\vec{AP} = 2\vec{PB}, \text{ 即有 } x_1 = -2x_2, y_1 + 2y_2 = 3,$$

$$\text{即为 } \begin{cases} x_1^2 + 4y_1^2 = 4m \text{ ①} \\ 4x_2^2 + 16y_2^2 = 16m \text{ ②} \end{cases},$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得 } (y_1 - 2y_2)(y_1 + 2y_2) = -3m,$$

$$\text{可得 } y_1 - 2y_2 = -m, \text{ 解得 } y_1 = \frac{3-m}{2},$$

$$y_2 = \frac{3+m}{4}, \text{ 则 } m = x_2^2 + \left(\frac{3-m}{2}\right)^2, \text{ 即有 } x_2^2 = m -$$

$$\left(\frac{3-m}{2}\right)^2 = \frac{-m^2 + 10m - 9}{4} = \frac{-(m-5)^2 + 16}{4},$$

即有 $m=5$ 时, x_2^2 有最大值 4, 即点 B 横坐标的绝对值最大. 故答案为 5.

2. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), N(\sqrt{3}, 0), \vec{NB}$

$$+ 3\vec{NA} = 0 \Rightarrow \vec{BN} = 3\vec{NA}, \text{ 所以 } \sqrt{3} = \frac{x_2 + 3x_1}{4},$$

$$\begin{cases} 9 \cdot \frac{x_1^2}{4} + 9y_1^2 = 9 \text{ ①} \\ \frac{x_2^2}{4} + y_2^2 = 1 \text{ ②} \end{cases} \text{ ①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{(3x_1 + x_2)(3x_1 - x_2)}{4} +$$

$$(3y_1 + y_2)(3y_1 - y_2) = 8, \text{ 即 } \frac{3x_1 - x_2}{2} = \frac{4}{\sqrt{3}}, \text{ 所以}$$

$$x_2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}, y_2 = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}, \text{ 所以 } k = \frac{y_2 - 0}{x_2 - \sqrt{3}} = \pm \sqrt{2},$$

$$\text{所以 } y = \pm \sqrt{2}(x - \sqrt{3}).$$

3. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

$$(2) \frac{\vec{AP}}{\vec{PB}} = -\frac{\vec{AQ}}{\vec{QB}}, \text{ 故令 } \vec{AP} = \lambda \vec{PB}, \vec{AQ} = -\lambda \vec{QB};$$

$$\text{故 } \begin{cases} \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = 4 \\ \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} = 1 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} = x_Q \\ \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda} = y_Q \end{cases} \text{ 由于 } A, B \text{ 在}$$

$$\text{椭圆 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \text{ 上, } \begin{cases} \frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{3} = 1 \text{ ①} \\ \frac{\lambda^2 x_2^2}{4} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{3} = \lambda^2 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{(x_1 - \lambda x_2)(x_1 + \lambda x_2)}{4(1-\lambda)(1+\lambda)} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)(y_1 + \lambda y_2)}{3(1-\lambda)(1+\lambda)} =$$

$$1, \text{ 即 } \frac{4x_Q}{4} + \frac{y_Q}{3} = 1, \text{ 即 } 3x + y - 3 = 0, Q \text{ 总在直}$$

线 $3x + y - 3 = 0$ 上.

4. 【解析】(1) $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ (2) 略. (3) 略.

5. (1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2) R 在定直线 $x = -1$ 上.

6. 【解析】(1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) (i) 参考例 4 (2018 年新课标高考题);

$$\begin{aligned} \text{(ii) 设 } \angle NFB = \alpha, \text{ 根据焦长公式可得, } |NF| &= \frac{b^2}{a - c \cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{2} - \cos \alpha}, \quad |MF| = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2} + \cos \alpha}, \quad \angle MFN = 180^\circ - 2\alpha, \quad S_{MFN} = \frac{1}{2} |MF| \cdot \\ &|NF| \sin 2\alpha = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{2 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{\tan \alpha}{2 \tan^2 \alpha + 1} \\ &= \frac{1}{2 \tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha}} \leq \frac{\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

7. 【解析】(1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), G(x_3, y_3),$

$H(x_4, y_4)$, 设 $\vec{AF} = \lambda \vec{FG}, F\left(\frac{x_1 + \lambda x_3}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_3}{1 + \lambda}\right) =$

$(1, 0), \vec{BF} = \mu \vec{FH}, F\left(\frac{x_2 + \mu x_4}{1 + \mu}, \frac{y_2 + \mu y_4}{1 + \mu}\right) =$

$$(1, 0), \text{ 有 } \begin{cases} \frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1 \text{ ①} \\ \lambda^2 \frac{x_3^2}{2} \pm \lambda^2 y_3^2 = \lambda^2 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①-②得: } \frac{(x_1 + \lambda x_3)(x_1 - \lambda x_3)}{2(1 - \lambda^2)} \pm \frac{(y_1 + \lambda y_3)(y_1 - \lambda y_3)}{1 - \lambda^2} = 1.$$

$$\text{即 } \frac{x_1 - \lambda x_3}{1 - \lambda} = 2 \cdot \begin{cases} \frac{x_1 - \lambda x_3}{1 - \lambda} = 2 \\ \frac{x_1 + \lambda x_3}{1 + \lambda} = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -\frac{\lambda}{2} + \frac{3}{2} \text{ ③,}$$

$$\text{同理 } \begin{cases} \frac{x_2 - \mu x_4}{1 - \mu} = 2 \\ \frac{x_2 + \mu x_4}{1 + \mu} = 1 \end{cases} \Rightarrow x_2 = -\frac{\mu}{2} + \frac{3}{2} \text{ ④,}$$

故 $x_1 + x_2 = 3 - \frac{1}{2}(\lambda + \mu)$ ⑤,

$$\text{所以 } \lambda + \mu = 6 - 2(x_1 + x_2), \begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \\ y = k(x + 2) \end{cases} \Rightarrow (2k^2$$

$$+ 1)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0, \Delta > 0 \Rightarrow < -\frac{\sqrt{2}}{2} < k$$

$$< \frac{\sqrt{2}}{2}, x_1 + x_2 = \frac{-8k^2}{2k^2 + 1} = \frac{-8}{2 + \frac{1}{k^2}} \in (-2, 0), \text{ 所}$$

以 $\lambda + \mu = 6 - 2(x_1 + x_2) \in (6, 10)$.

8. (1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$; (2) λ 的取值范围是 $(3 - 2\sqrt{2}, 1)$.

9. (1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2) $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$.

10. (1) $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{3}$;

(2) 定直线 $x = \frac{9}{4}, \lambda \in \left[\frac{4}{3}, +\infty\right)$.

11. (1) $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$;

(2) $|AB|$ 的最大值为 $\sqrt{6}$;

(3) 2. (参考例题 5: 2018 · 北京卷)

12. 【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由题意知

$2a = 4, 2c = 2\sqrt{2}$, 所以 $a = 2, b = \sqrt{a^2 - c^2} =$

$\sqrt{2}$. 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$;

(2) 证明: (i) 设 $P(x_0, y_0) (x_0 > 0, y_0 > 0)$, 由 $M(0, m)$, 可得 $P(x_0, 2m), Q(x_0, -2m)$.

所以直线 PM 的斜率 $k_1 = \frac{2m - m}{x_0} = \frac{m}{x_0}$, 直线

QM 的斜率 $k_2 = \frac{-2m - m}{x_0} = -\frac{3m}{x_0}$, 此时 $\frac{k_2}{k_1} = -3$;

(ii) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \vec{AM} = \lambda \vec{MB},$

$$\vec{BM} = \mu \vec{MQ}, \text{ 根据定比分点差法 } \begin{cases} x_1 + \lambda x_0 = 0 \\ x_2 + \mu x_0 = 0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} y_1 = \frac{m + \frac{2}{m}}{2} + \frac{m - \frac{2}{m}}{2} \lambda \\ y_2 = \frac{m + \frac{2}{m}}{2} + \frac{m - \frac{2}{m}}{2} \mu \end{cases}, k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{m - \frac{2}{m}}{2x_0},$$

$$\text{令 } \begin{cases} x_0 = 2 \cos \theta \\ 2m = \sqrt{2} \sin \theta \end{cases}, \text{ 故 } k = -\frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \sin^2 \theta - 2\sqrt{2}}{4 \sin \theta \cos \theta},$$

$$k = \frac{\sqrt{2}(3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta)}{8 \sin \theta \cos \theta} = \frac{\sqrt{2}}{8} \left(3 \tan \theta + \frac{4}{\tan \theta} \right) \geq$$

$$\frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 当且仅当 } \tan \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ 时等号成立.}$$

专题 8 仿射大法大破天机

达标训练

1. D 【解析】设 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 根据以

$$\text{上模型 } \begin{cases} \frac{k_{OM}}{1} = \frac{1}{4} = \frac{y_0}{x_0} \\ 2x_0 - 2y_0 - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 所以}$$

$M(2, \frac{1}{2})$, 故选 D.

2. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

$$(2) \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{x}{2} \\ y' = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2x' \\ y = y' \end{cases} \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 1, \text{ 拉伸后 } A(0, -2) \text{ 不变, } S_{\Delta OP'Q'} = \frac{1}{2} S_{\Delta OPQ} k_{P'Q'} = 2k_{PQ}; \text{ 令 } P'Q' \text{ 倾斜角为 } \alpha, P'Q' \text{ 的中点为 } M, OM = 2\cos\alpha, P'M = Q'M = \sqrt{1 - (2\cos\alpha)^2}, \text{ 故 } S_{\Delta OP'Q'} = |2\cos\alpha| \sqrt{1 - (2\cos\alpha)^2} = \sqrt{(2\cos\alpha)^2 [1 - (2\cos\alpha)^2]} \leq \frac{1}{2}, \text{ 当且仅当 } (2\cos\alpha)^2 = 1 - (2\cos\alpha)^2 \Rightarrow \cos\alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ 时, 等号成立, 此时 } k_{P'Q'} = 2k_{PQ} = \pm\sqrt{7} \Rightarrow k_{PQ} = \pm\frac{\sqrt{7}}{2}, \text{ 故直线 } l \text{ 方程为 } y = \pm\frac{\sqrt{7}}{2}x + 2.$$

3. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{3y^2}{4} = 1$;

$$(2) \text{ 证明: } \frac{x^2}{4} + \frac{3y^2}{4} = 1 \Rightarrow \begin{cases} x' = x \\ y' = \sqrt{3}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{y'}{\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 4, D(-1, 1) \text{ 拉伸后变为 } D'(-1, \sqrt{3}), k'_{D'E'} = -\frac{1}{k_{O'D'}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow k_{DE} = \frac{1}{\sqrt{3}} k'_{D'E'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}, k_{AB} = \frac{0 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{1}{3}, \text{ 及 } k_{AB} = k_{DE} = \frac{1}{3}, \text{ 所以 } AB \parallel DE.$$

4. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) $S_{\Delta QOB} = 2S_{\Delta AOB}$, 根据几何性质可知, 当 $AB \parallel x$ 轴时, $\angle AOB_{\max} = 120^\circ$, 当 $\angle AOB = 90^\circ$ 时 $S_{\Delta AOB}$ 面积最大, 此时令切点 $M(x_0, y_0)$, 满足

$$|OM| = \sqrt{2}, \text{ 即有 } \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 2 \\ \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ y_0 = \pm \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow$$

$M(\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}, \pm \frac{\sqrt{6}}{3})$, 根据切线方程 $\frac{xx_0}{4} + yy_0 = 1$,

直线 l 的方程为: $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x \pm \sqrt{3}$.

5. 【解析】(1) $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{2} = 1$ (注意分析此椭圆焦点在 y 轴上);

(2) $x = \frac{x'}{\sqrt{2}}, y = y'$ 及将椭圆横向拉伸得 $\frac{y'^2}{4} + \frac{x'^2}{4} = 1$, 直线方程变为 $y' = x' + m$, $P(1, \sqrt{2})$ 变为 $P'(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 如图: 易知 $OP' \parallel A'B'$, $S_{\Delta ABC} = \frac{S_{\Delta A'B'C'}}{\sqrt{2}} = \frac{S_{\Delta OA'B'}}{\sqrt{2}} S_{\Delta OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot R^2 \cdot \sin(\angle A'OB')$,

故仅当 $\angle A'OB' = 90^\circ$ 时三角形的面积有最大值, $S_{\Delta OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot R^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2, S_{\Delta ABC} = \frac{S_{\Delta A'B'C'}}{\sqrt{2}} = \frac{S_{\Delta OA'B'}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$

6. 【解析】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2) 拉伸后如图所示: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow$

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{2}{\sqrt{3}}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}y' \end{cases} \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 4 \text{ 拉伸后比值}$$

斜率不变, 设 $H'(x_0', y_0')$, 故 $\frac{k_{OH'}}{k_{A'H'}} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4} =$

$$\frac{y_0'}{x_0'} \cdot \frac{x_0' - m}{y_0'} \Rightarrow x_0' = 4m.$$

如图: 过 H 点做 y 轴的垂线, 垂足为 C , $CH' = |x_0|$, $CD = |y_0|$ 则由射影定理得: $x_0'^2 = y_0' \cdot \left(\frac{4}{\sqrt{3}} - y_0'\right)$.

结合上一式子得 $y_0'^2 - \frac{4}{\sqrt{3}}y_0' + 16m^2 = 0$, 该式肯定有解. $\Delta = \left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2 - 64m^2 \geq 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{6} \leq m \leq \frac{\sqrt{3}}{6}$,

易知 $m = 0$ 时, 无意义, 故 m 的取值范围为 $-\frac{\sqrt{3}}{6} \leq m < 0$ 或 $0 < m \leq \frac{\sqrt{3}}{6}$.

7. 【解析】(1) 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) k_{OA}

$$\cdot k_{OB} = -\frac{3}{4} = -\frac{b^2}{a^2} \Rightarrow OA' \perp OB', \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{2}{\sqrt{3}}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}y' \end{cases} \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 4, S = \frac{b}{a}S' =$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 \cdot a^2 = 4\sqrt{3}.$$

8. 【解析】(1) 设 AB 中点坐标为 $M\left(\frac{4}{3}, y_0\right)$, 代入

圆方程可得 $y_0 = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$; 根据拉伸定理可知 $k_{OM} \cdot$

$$k_{AB} = -\frac{1}{4} \Rightarrow k_{AB} = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 将 } M\left(\frac{4}{3}, \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \text{ 代入}$$

可知 $m = \pm\sqrt{2}$, 故 $m = \sqrt{2}$;

$$(2) \begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 令 } \begin{cases} x = x' \\ 2y = y' \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x'^2 + y'^2 = 16 \\ (x'-1)^2 + \frac{y'^2}{4} = 1 \end{cases}, \text{ 拉伸后可知, } \lambda = \frac{|AB|}{|CD|} \text{ 最}$$

小时, AB 与 CD 距离最大, 令拉伸后的 C_2 参数方程为 $\begin{cases} x' = 1 + \cos\theta \\ y' = 2\sin\theta \end{cases}$, 当 C_2 上的点 P 离原点距

离最大时, 即 $|OP| = \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + (2\sin\theta)^2} = \sqrt{-3\cos^2\theta + 2\cos\theta + 5}$, 当 $\cos\theta = \frac{1}{3}$ 时, $|OP|_{\max} =$

$$\sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + (2\sin\theta)^2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \text{ 此时过 } P \text{ 作 } C_2 \text{ 的切}$$

$$\text{线 } A'B', A'B' = 2\sqrt{16 - \frac{16}{3}} = \frac{8\sqrt{6}}{3}, \lambda_{\min} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

9. 【解析】(1) $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{3}{4} \dots \textcircled{1}$

矩形 $ABCD$ 面积为 8, 即 $2a \cdot 2b = 8 \dots \textcircled{2}$

由 $\textcircled{1}\textcircled{2}$ 解得: $a = 2, b = 1$,

所以椭圆 M 的标准方程是 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 作伸缩变换, 令 $x' = x, y' = 2y$, 则椭圆 E 变为圆 E' : $x'^2 + y'^2 = 4$, 设此时 P, Q, S, T, A, B, C, D 对应的点分别为 $P', Q', S', T', A', B', C', D'$, 如图所示; 直线 l' 方程变为 $y' = 2x' + 2m$, 设 l' 倾斜角为 θ , 则有 $\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{|PQ|}{|ST|} = \frac{|P'Q'|}{|S'T'|}$, 当 l 过 A 点

时, $m = 1$, 当 l 过 C 点时, $m = -1$.

- ①当 $\sqrt{5} > m > 1$ 时, 有 $|S'T'| = \sqrt{5}(3-m)$,
 $|P'Q'| = 2\sqrt{4-(m\sin\theta)^2} = 2\sqrt{4-\frac{4}{5}m^2} \frac{|PQ|}{|ST|} =$
 $\frac{|P'Q'|}{|S'T'|} = \frac{4}{5}\sqrt{\frac{5-m^2}{(3-m)^2}} = \frac{4}{5}\sqrt{-\frac{4}{t^2} + \frac{6}{t} - 1}$, 其
 中 $t = 3-m$, 由此知当 $\frac{1}{t} = \frac{3}{4}$, 即 $t = \frac{4}{3}$, $m =$
 $\frac{5}{3} \in (1, \sqrt{5})$ 时, $\frac{|PQ|}{|ST|}$ 取得最大值 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$;
- ②由对称性, 可知若 $-\sqrt{5} < m < -1$, 则当 $m =$
 $-\frac{5}{3}$ 时, $\frac{|PQ|}{|ST|}$ 取得最大值 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$;
- ③当 $-1 \leq m \leq 1$ 时, $|S'T'| = 2\sqrt{5}$, $\frac{|P'Q'|}{|S'T'|} =$
 $\frac{2}{5}\sqrt{5-m^2}$, 由此知, 当 $m = 0$ 时, $\frac{|PQ|}{|ST|}$ 取得
 最大值 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$.

10. 【解析】(1) 椭圆 C 的方程为: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 拉伸后如图, 设 $A'(x_1, y_1)$, $B'(x_2, y_2)$,

则有 $\frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = \left(\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}\right)^2 = \left(\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\right)^2$, 利用合

比的性质: $\left(\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}\right)^2 = \left(\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}\right)^2 = k'^2$; 利用

到数相等可以得到, $k' = \pm 1 \Rightarrow k = \pm \frac{1}{2}$, 由 k'

$= 1$, 及等比的性质, 圆的性质, 可以得到

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 \\ x_1^2 + y_1^2 = 2^2 \\ x_2^2 + y_2^2 = 2^2 \end{cases}, \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 = 2^2$$

$$2^2, OA^2 + OB^2 = x_1^2 + \left(\frac{1}{2}y_1\right)^2 + x_2^2 + \left(\frac{1}{2}y_2\right)^2$$

$$= x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{4}(y_1^2 + y_2^2) = 4 + 1 = 5.$$

定理: 若 k_{OA} , k_{AB} , k_{OB} 成等比数列, 则 $k_{AB}^2 =$

$$k_{OA} \cdot k_{OB} = \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow k_{AB} = \pm \frac{b}{a}, \text{ 且 } OA^2 + OB^2 = a^2 + b^2.$$

证明: 拉伸后如图, 设 $A'(x_1, y_1)$, $B'(x_2,$

$y_2)$, 则有 $\frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = \left(\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}\right)^2 = \left(\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\right)^2$ 利

用合比的性质: $\left(\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}\right)^2 = \left(\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}\right)^2 = k'^2$ 利

用到数相等可以得到, $k' = \pm 1 \Rightarrow k = \pm \frac{b}{a}$, 由

$k' = 1$, 及等比的性质, 圆的方程, 可以得到

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 \\ x_1^2 + y_1^2 = a^2 \\ x_2^2 + y_2^2 = a^2 \end{cases} \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 = a^2$$

$$OA^2 + OB^2 = x_1^2 + \left(\frac{b}{a}y_1\right)^2 + x_2^2 + \left(\frac{b}{a}y_2\right)^2 = x_1^2$$

$$+ x_2^2 + \frac{b^2}{a^2}(y_1^2 + y_2^2) = a^2 + b^2.$$

11. 【解析】(1) 因为椭圆 C 的中心在原点 O , 左焦点为 $F_1(-1, 0)$, 所以 $c = 1$, $a = 2$, 所以 $b^2 =$

$$4 - 1 = 3, \text{ 椭圆 } C \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

(1) 椭圆 C 的 3 倍相似椭圆 C_2 的方程为:

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1, \text{ 将 } \begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{2}{\sqrt{3}}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}y' \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} C: x'^2 + y'^2 = 4 \\ C_2': x'^2 + y'^2 = 12 \end{cases}$$

如图:

$$|MN| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$$

$$|M'N'| = 2\sqrt{R^2+r^2} = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = 4\sqrt{2}$$

$$|MN| = 4\sqrt{2} \sqrt{\frac{1+k^2}{1+\frac{4}{3}k^2}} = 4\sqrt{2} \sqrt{\frac{1+k^2}{1+\frac{4}{3}k^2}}$$

由于 $1 + \frac{4}{3}k^2 \geq 1 + k^2$, 故当仅当 $k = 0$ 时,

$$|MN|_{\max} = 4\sqrt{2}.$$

12. (1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

$$(2) s^2 + t^2 = 1.$$

第5章 独孤九剑震群雄 压轴导数考神路

专题1 抽象函数的导函数构造

←←← 达标训练

1. B 【解析】因为 $[x \cdot f(x)]' = f(x) + x \cdot f'(x) > 0$ ，故函数 $g(x) = x f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 再根据函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，可得函数 $g(x) = x f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，故函数 $g(x) = x f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，故函数 $g(x) = x f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增. 因为 $f(1) = 0$ ，所以 $f(-1) = 0$ ，故函数 $y = x f(x)$ 的单调性的示意图，如图所示：由不等式 $x \cdot f(x) > 0$ ，可得 x 与 $f(x)$ 同时为正数或同时为负数，所以 $x > 1$ ，或 $-1 < x < 0$ ，故不等式 $x \cdot f(x) > 0$ 的解集为： $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ ，故选 B.

2. C 【解析】令 $g(x) = x f(x)$ ，则 $g'(x) = f(x) + x f'(x) > 0$ ，所以 $g(x)$ 为递增函数，因为 $e > 1 > \frac{1}{e}$ ，所以 $g(e) > g(1) > g(\frac{1}{e})$ ，所以 $ef(e) > f(1) > \frac{1}{e}f(\frac{1}{e})$ ，又 $f(x)$ 为奇函数，所以 $-ef(-e) = ef(e)$ ，所以 $b > c > a$ ，故选 C.
3. C 【解析】令 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，则 $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ ，因为对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f'(x) > f(x)$ ，所以 $g'(x) > 0$ ，即 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，所以 $g(3) >$

$g(2)$ ，即 $\frac{f(3)}{e^3} > \frac{f(2)}{e^2}$ ，所以 $e^3 f(2) < e^2 f(3)$ ，

故选 C.

4. D 【解析】令 $g(x) = e^x f(x)$ ，则 $g'(x) = e^x (f(x) + f'(x)) > 0$ ，故 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 递增，而 $g(0) = f(0) = 4$ ，故不等式 $e^x f(x) > 4$ ，即 $g(x) > g(0)$ ，解得： $x > 0$ ，故不等式的解集是 $(0, +\infty)$ ，故选 D.
5. C 【解析】设 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ， $f'(x) > f(x)$ ，所以 $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} > 0$ ，所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增，不等式 $f(2\ln x) < x^2$ 即为 $\frac{f(2\ln x)}{x^2} < 1$ ，($x > 0$)，即 $\frac{f(2\ln x)}{e^{2\ln x}} < 1$ ， $x > 0$. 因为 $g(2) = \frac{f(2)}{e^2} = 1$ ，所以 $g(2\ln x) < g(2)$ ，所以 $2\ln x < 2$ ，所以 $0 < x < e$ ，故选 C.
6. B 【解析】令 $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$ ， $x < 0$ ，故 $g'(x) = \frac{x f'(x) - 2 f(x)}{x^3} < 0$ ，因为 $f(2017+x) - (x+2017)^2 f(-1) < 0$ ，所以 $(2017+x)^2 g(2017+x) - (2017+x)^2 g(-1) < 0$ ，因为 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，所以 $\begin{cases} 2017+x < 0 \\ g(2017+x) < g(-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2017+x < 0 \\ 2017+x > -1 \end{cases}$ ，解得： $-2018 < x < -2017$ ，故选 B.
7. B 【解析】令 $g(x) = e^{-x} f(x) - 4e^{-x}$ ，则 $g'(x) = -e^{-x} f(x) + e^{-x} f'(x) + 4e^{-x} = e^{-x} [f'(x) - f(x) + 4] < 0$ ，所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递减，由 $f(x) > e^x + 4$ ，得 $e^{-x} f(x) > 1 + 4e^{-x}$ ，得 $e^{-x} f(x) - 4e^{-x} > 1 + 4e^{-x} - 4e^{-x} = 1$ ，所以 $g(x) > 1 = g(0)$ ，所以 $x < 0$ ，故选 B.
8. C 【解析】由题意得，函数 $y = f(x-1)$ 的图像关于点 $(1, 0)$ 对称，故 $f(x)$ 的图像关于原点对

称, 故 $f(x)$ 是奇函数, 由函数 $y = f(x)$ 对于任意的 $x \in (0, \pi)$ 满足 $f'(x) \sin x > f(x) \cos x$, 令 $g(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$, 故 $g'(x) = \frac{f'(x) \sin x - f(x) \cos x}{\sin^2 x} > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, \pi)$ 递增, 故 $g\left(\frac{\pi}{6}\right) < g\left(\frac{\pi}{3}\right) < g\left(\frac{\pi}{2}\right) < g\left(\frac{3\pi}{4}\right) < g\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, 故 $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right) < f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $2f\left(\frac{\pi}{3}\right) < \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < \sqrt{2}f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$, $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) < \sqrt{2}f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 A, B, D 错误, C 正确, 故选 C.

9. C 【解析】根据题意, 设 $g(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$, $g(-x) = \frac{f(-x)}{\cos(-x)} = \frac{f(x)}{\cos x}$, 可得 $g(x)$ 为偶函数, 其导数为 $g'(x) = \frac{f'(x) \cos x + f(x) \sin x}{\cos^2 x}$, 又由 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $f'(x) \cos x + f(x) \sin x < 0$, 则有 $g'(x) < 0$, 则函数 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上为减函数, 又由偶函数 $f(x)$ 为定义在 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $f(x) > 2f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos x$, 即为 $\frac{f(x)}{\cos x} > 2f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\cos \frac{\pi}{3}}$, 即有 $g(x) > g\left(\frac{\pi}{3}\right)$, 又由 $g(x)$ 为偶函数且在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上为减函数, 且其定义域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则有 $|x| < \frac{\pi}{3}$, 解可得 $-\frac{\pi}{3} < x < 0$ 或 $0 < x < \frac{\pi}{3}$, 解集为 $\left(-\frac{\pi}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, 故选 C.

10. A 【解析】因为 $\frac{2f(x) - xf'(x)}{x+1} > 0$, 所以 $x < -1$ 时, $2f(x) - xf'(x) < 0$. $-1 < x < 0$ 时, $2f(x)$

$-xf'(x) > 0$. 构造函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$, $g'(x) = \frac{x^2 f'(x) - 2xf(x)}{x^4} = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3}$, $x < -1$ 时, $g'(x) < 0$; $-1 < x < 0$, $g'(x) > 0$. 所以 $g(-e) > g(-1)$, 所以 $\frac{f(-e)}{(-e)^2} > \frac{f(-1)}{(-1)^2}$, 化为: $f(-e) - e^2 f(-1) > 0$, 故选 A.

11. C 【解析】因为 $xf'(x) - f(x) = x^2 + x$, 所以 $\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = 1 + \frac{1}{x}$, 所以 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = 1 + \frac{1}{x}$, 所以 $\frac{f(x)}{x} = \int \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = x + \ln x + C$, 所以 $f(x) = x^2 + x \ln x + Cx$, 所以 $f(1) = 1 + 1 \ln 1 + C = 1 + C$, 因为 $f(1) \geq 1$, 所以 $1 + C \geq 1$, 所以 $C \geq 0$, 所以 $f(x)$ 的解析式可能是 $x^2 + x \ln x + x$, 故选 C.
12. C 【解析】根据题意, 设 $g(x) = \ln x \cdot f(x)$ ($x > 0$), 其导数 $g'(x) = (\ln x)' f(x) + \ln x f'(x) = \frac{1}{x} f(x) + \ln x f'(x)$, 又由当 $x > 0$ 时, $f'(x) \cdot x \ln x + f(x) < 0$, 则有 $g'(x) = \frac{1}{x} f(x) + \ln x f'(x) < 0$, 即函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 又由 $g(1) = \ln 1 \cdot f(1) = 0$, 则在区间 $(0, 1)$ 上, $g(x) = \ln x \cdot f(x) > 0$, 又由 $\ln x < 0$, 则 $f(x) < 0$, 在区间 $(1, +\infty)$ 上, $g(x) = \ln x \cdot f(x) < 0$, 又由 $\ln x > 0$, 则 $f(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上, $f(x) < 0$, 又由 $f(x)$ 为奇函数, 则在区间 $(-1, 0)$ 和 $(-\infty, -1)$ 上, 都有 $f(x) > 0$, $(x^2 - 1) f(x) < 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 1 > 0 \\ f(x) < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x^2 - 1 < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$, 解可得: $x > 1$ 或 $-1 < x < 0$, 则 x 的取值范围是 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$, 故选 D.
13. A 【解析】因为 $(x \ln x) f'(x) < f(x)$, 所以 $x >$

0, 所以 $\ln x f'(x) < \frac{f(x)}{x}$, 所以 $\ln x f'(x) - \frac{f(x)}{x} < 0$, 即 $\left(\frac{f(x)}{\ln x}\right)' < 0$, 设 $g(x) = \frac{f(x)}{\ln x}$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递减, 所以 $g(\sqrt{e}) > g(2e)$, 即 $2f(\sqrt{e}) > f(e)$, 故选 A.

14. D 【解析】根据题意, 设 $g(x) = x^2 f(x)$, $x > 0$, 其导数 $g'(x) = [x^2 f(x)]' = 2x f(x) + x^2 f'(x) = x[2f(x) + x f'(x)]$, 又由 $2f(x) + x f'(x) > x^2 \geq 0$, 且 $x > 0$, 则 $g'(x) \geq 0$, 则函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $(x-2016)^2 f(x-2016) - 4f(2) > 0 \Rightarrow (x-2016)^2 f(x-2016) > 2^2 f(2) \Rightarrow g(x-2016) > g(2)$, 又由函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 则有 $x-2016 > 2$, 解可得: $x > 2018$, 即不等式 $(x-2016)^2 f(x-2016) - 4f(2) > 0$ 的解集为 $(2018, +\infty)$, 故选 D.

15. B 【解析】设 $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, 则 $F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} < 0$, 即函数 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 因为 $f'(x) = f'(4-x)$, 即导函数 $y = f'(x)$ 关于直线 $x=2$ 对称, 所以函数 $y = f(x)$ 是中心对称图形, 且对称中心 $(2, 1)$, 由于 $f(4) = 0$, 即函数 $y = f(x)$ 过点 $(4, 0)$, 其关于点 $(2, 1)$ 的对称点 $(0, 2)$ 也在函数 $y = f(x)$ 上, 所以有 $f(0) = 2$, 所以 $F(0) = \frac{f(0)}{e^0} = 2$, 而不等式 $f(x) - 2e^x < 0$ 即 $\frac{f(x)}{e^x} < 2$, 即 $F(x) < F(0)$, 所以 $x > 0$, 故使得不等式 $f(x) - 2e^x < 0$ 成立的 x 的取值范围是 $(0, +\infty)$. 故选 B.

16. C 【解析】设 $g(x) = \frac{f(x)}{x-2}$, 所以 $g'(x) = \frac{(x-2)f'(x) - f(x)}{(x-2)^2}$, 因为 $(x-2)[f(x) +$

$2f'(x) - xf'(x)] > 0$, 所以 $(x-2)[(x-2)f'(x) - f(x)] < 0$, 当 $x > 2$ 时, $(x-2)f'(x) - f(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减, 当 $x < 2$ 时, $(x-2)f'(x) - f(x) > 0$, 即 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上单调递增, 所以 $g(4) < g(3) < g(\sqrt{5})$, 所以 $\frac{f(4)}{4-2} < \frac{f(3)}{3-1} < \frac{f(\sqrt{5})}{\sqrt{5}-2}$, 所以 $f(4) < 2f(3) < (2\sqrt{5}+4)f(\sqrt{5})$, 故选 C.

17. C 【解析】令 $g(x) = f(x) - x^3$, 因为 $f(x) - f(-x) = 2x^3$, 所以 $f(x) - x^3 = f(-x) - (-x)^3$. 即 $g(x) = g(-x)$, 所以 $g(x)$ 为偶函数. 因为 $x \geq 0$ 时 $f'(x) - 3x^2 \geq 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 递增, 不等式 $f(2x) - f(x-1) > 7x^3 + 3x^2 - 3x + 1$ 的解集 $\Leftrightarrow g(2x) > g(x-1)$. 所以 $|2x| > |x-1| \Rightarrow 3x^2 + 2x - 1 > 0$, 所以 $x > \frac{1}{3}$ 或 $x < -1$, 故选 C.

18. B 【解析】因为 $f(-x) + f(x) = x^2$, 所以 $f(x) - \frac{1}{2}x^2 + f(-x) - \frac{1}{2}x^2 = 0$, 令 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$, 因为 $g(-x) + g(x) = f(-x) - \frac{1}{2}x^2 + f(x) - \frac{1}{2}x^2 = 0$, 所以函数 $g(x)$ 为奇函数. 因为 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > x$. 所以 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) = f'(x) - x > 0$, 故函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 故函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上也是增函数, 由 $f(0) = 0$, 可得 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. $f(2-a) - f(a) \geq 2 - 2a$, 等价于 $f(2-a) - \frac{(2-a)^2}{2} \geq f(a) - \frac{a^2}{2}$, 即 $g(2-a) \geq g(a)$, 所以 $2-a \geq a$, 解得 $a \leq 1$, 故选 B.

19. A 【解析】设 $g(x) = f(x) - x - x^2$, 则 $g(x) -$

$g(-x) = f(x) - f(-x) - 2x = 0$, 所以 $g(x)$ 是偶函数. 当 $x > 0$ 时, $g'(x) = f'(x) - 1 - 2x > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数. 因为 $f(a+1) \geq f(-a) + 4a + 2$, 所以 $f(a+1) - (a+1) - (a+1)^2 \geq f(-a) - (-a) - (-a)^2$, 所以 $g(a+1) \geq g(-a) = g(a)$, 所以 $(a+1) \geq |a|$, 解得 $a \geq -\frac{1}{2}$, 故选 A.

20. A 【解析】设 $g(x) = e^{2x}f(x) - e^{2x}$, 则 $g'(x) = e^{2x}[2f(x) + f'(x) - 2] > 0$ 恒成立: 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增, 又 $f(\ln a) > 1 + \left(\frac{e}{a}\right)^2 \Leftrightarrow a^2[f(\ln a) - 1] > e^2 \Leftrightarrow e^{2\ln a}[f(\ln a) - 1] > e^2[(f(1) - 1)] \Leftrightarrow g(\ln a) > g(1)$. 所以 $\ln a > 1$, 所以 $a > e$, 故选 A.

21. D 【解析】根据题意, 设 $g(x) = \ln x \cdot f(x) (x > 0)$, 其导数 $g'(x) = (\ln x)' f(x) + \ln x f'(x) = \frac{1}{x} f(x) + \ln x f'(x)$, 又由当 $x > 0$ 时, $x \ln x \cdot f'(x) < -f(x)$, 即 $\ln x \cdot f'(x) < -\frac{1}{x} f(x)$, 则有 $g'(x) = \frac{1}{x} f(x) + \ln x f'(x) < 0$, 即函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 又由 $g(1) = \ln 1 \cdot f(1) = 0$, 则在区间 $(0, 1)$ 上, $g(x) = \ln x \cdot f(x) > 0$, 又由 $\ln x < 0$, 则 $f(x) < 0$, 在区间 $(1, +\infty)$ 上, $g(x) = \ln x \cdot f(x) < 0$, 又由 $\ln x > 0$, 则 $f(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上, $f(x) < 0$, 又由 $f(x)$ 为奇函数, 则在区间 $(-1, 0)$ 和 $(-\infty, -1)$ 上, 都有 $f(x) > 0$, $(x^2 - 4)f(x) > 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 4 > 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x^2 - 4 < 0 \\ f(x) < 0 \end{cases}$, 解可得: $x < -2$ 或 $0 < x < 2$, 则 x 的取值范围是 $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$, 故选 D.

22. A 【解析】令 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$, 因为 $f'(x) < f(x)$, 所以 $g'(x) < 0$. 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 因为函数 $f(x+5)$ 是偶函数, 所以函数 $f(-x+5) = f(x+5)$, 所以函数关于 $x=5$ 对称, 所以 $f(0) = f(10) = 1$, 原不等式等价于 $g(x) < 1$, 因为 $g(0) = \frac{f(0)}{e^0} = 1$. 所以 $g(x) < 1 \Leftrightarrow g(x) < g(0)$, 因为 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以 $x > 0$. 所以不等式 $f(x) < e^x$ 的解集为 $(0, +\infty)$, 故选 A.

23. D 【解析】令 $g(x) = x f(x) - 2x$, $g'(x) = x f'(x) + f(x) - 2$, 因为当 $x > 0$ 时, $x f'(x) + f(x) > 2$, 所以 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $x > 0$ 时, 函数 $g(x)$ 单调递增. 因为 $f(2) = \frac{5}{2}$, 所以 $g(2) = 2f(2) - 4 = 5 - 4 = 1$. 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以 $f(x) = f(|x|)$. 所以不等式 $|x| \cdot f(x) > 2|x| + 1$, 即不等式 $|x| \cdot f(|x|) - 2|x| > 1$, 所以 $g(|x|) > g(2)$, 所以 $|x| > 2$. 解得 $x < -2$ 或 $x > 2$. 所以不等式 $|x| \cdot f(x) > 2|x| + 1$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选 D.

24. C 【解析】构造函数 $g(x) = x^2 f(x) - x^2$. 因为 $g'(x) = 2x \cdot \left[f(x) + \frac{1}{2}x \cdot f'(x) - 1 \right] > 0$, 在 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 因为 $1 < 3$, 所以 $g(1) < g(3)$ 得 $f(1) + 8 < 9f(3)$, 故选 C.

25. D 【解析】令 $g(x) = \frac{f(x)}{\ln 2x}$, $\left(x > \frac{1}{2}\right)$, 则 $g'(x) = \frac{f'(x) \ln 2x - \frac{1}{x} f(x)}{\ln^2 2x} = \frac{x f'(x) \ln 2x - f(x)}{x \ln^2 2x}$, 因为 $x > \frac{1}{2}$, $x f'(x) \ln 2x > f(x)$, 所以 $g'(x) >$

0, 即 $g(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 又

$$g\left(\frac{e}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{e}{2}\right)}{\ln e} = 1, \text{ 所以当 } \frac{1}{2} < x < \frac{e}{2} \text{ 时,}$$

$g(x) < 1$, 即 $f(x) < \ln 2x$, 令 $\frac{e^x}{2} = t$, 则 $x =$

$\ln 2t$, 不等式 $f\left(\frac{e^x}{2}\right) < x$ 等价于 $f(t) < \ln 2t$, 所

以 $\frac{1}{2} < t < \frac{e}{2}$, 即 $\frac{1}{2} < \frac{e^x}{2} < \frac{e}{2}$, 解得 $0 < x < 1$,

故选 D.

26. 【解析】令 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$, 因为 $g(x) +$

$$g(-x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + f(-x) - \frac{1}{2}x^2 = 0, \text{ 所}$$

以函数 $g(x)$ 是奇函数, 因为 $x \in (0, +\infty)$ 时,

$$g'(x) = f'(x) - x < 0, \text{ 函数 } g(x) \text{ 在 } x \in (0, +$$

$\infty)$ 递减, 又由题意得 $f(0) = 0, g(0) = 0$, 故

函数 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 递减, 故 $f(6-m) - f(m) - 18$

$$+ 6m = g(6-m) + \frac{1}{2}(6-m)^2 - g(m) - \frac{1}{2}m^2$$

$$- 18 + 6m \geq 0, \text{ 即 } g(6-m) - g(m) \geq 0, g(6-m)$$

$$\geq g(m), \text{ 所以 } 6-m \leq m, \text{ 解得 } m \geq 3, \text{ 故答}$$

案为 $[3, +\infty)$.

27. 【解析】因为 $x f'(x) - 2f(x) = x^3 e^x$, 所以

$$\frac{x f'(x) - 2f(x)}{x^3} = e^x, \text{ 令 } g(x) = \frac{f(x)}{x^2}, \text{ 则}$$

$$g'(x) = \frac{x f'(x) - 2f(x)}{x^3} = e^x, \text{ 所以 } g(x) =$$

$$\frac{f(x)}{x^2} = e^x + c, \text{ (} c \text{ 为常数), 所以 } f(x) = x^2(e^x$$

$$+ c), \text{ 因为 } f(1) = e + c = e - 1, \text{ 所以 } c = -1,$$

$$\text{所以 } f(x) = x^2(e^x - 1), \text{ 因为 } f'(x) = 2x(e^x -$$

$$1) + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x - 2x, \text{ 所以 } f(2) = 4(e^2$$

$$- 1), f'(2) = 8e^2 - 4, \text{ 所以所求切线方程为 } y$$

$$- 4(e^2 - 1) = (8e^2 - 4)(x - 2), \text{ 即 } y = (8e^2 -$$

$$4)x - 12e^2 + 4, \text{ 故答案为 } y = (8e^2 - 4)x - 12e^2$$

+ 4.

专题2 构造 $\ln x$ 比大小

←←← 达标训练

1. C 【解析】 $a = \frac{\ln 2}{2}, b = \frac{\ln 3}{3}, c = \frac{1}{e} = \frac{\ln e}{e}$, 所以

当 $x \in (0, e)$ 时, $f(x)$ 为增函数, 当 $x \in (e, +$

$\infty)$ 时, $f(x)$ 为减函数, 则 $f(e)$ 最大, $f(2) =$

$$f(4) < f(3), \text{ 所以 } a < b < c. \text{ 故选 C.}$$

2. C

3. C

4. A 【解析】 $a = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}}, b = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}, e > \frac{1}{2} >$

$\frac{1}{3}$, 故根据“大指小底”可知 $b > a, a, b > 0$.

所以 $1 > b > a > 0. c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = \log_2 3 > 1$, 则 $a <$

$b < c$. 故选 A.

5. B 【解析】根据“大指小底”可知 $a > b, a > 0, b$

$$> 0. \text{ 所以 } 1 > a > b > 0. c = \frac{\log_2 \frac{1}{5}}{\log_2 \frac{1}{4}} > 1, \text{ 故选 B.}$$

6. B 【解析】 $f(x) + f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x) \cdot$

$$(\sqrt{1+x^2} - x) + \frac{2^x - 1}{2^x + 1} + \frac{1 - 2^x}{1 + 2^x} = 0, -f(2 - \pi) =$$

$f(\pi - 2)$, 且 $f(x)$ 为单调增函数, 根据函数 $\frac{\ln x}{x}$

性质可知, $\pi - 2 > 1 > \frac{1}{e} > \frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 5}{5}, f(\pi - 2)$

$> f\left(\frac{\ln 3}{3}\right) > f\left(\frac{\ln 5}{5}\right)$, 故选 B.

7. D 【解析】 $y = \frac{\lg x}{x} = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{\ln x}{x}$, 故 A, B, C 均

错误, 故选 D.

8. A 【解析】设 $2^a = 3^b = 6^c = k > 1$, 则 $a = \frac{\lg k}{\lg 2} > 0$,

$$b = \frac{\lg k}{\lg 3} > 0, c = \frac{\lg k}{\lg 6} > 0. \text{ 可得 } x = \frac{2 \ln k}{\ln 2} = \frac{4 \ln k}{\ln 4},$$

$$y = \frac{3 \ln k}{\ln 3}, z = \frac{6 \ln k}{\ln 6}, \text{ 所以 } y < x < z, \text{ 故选 A.}$$

9. >

10. 【解析】 $f(x) = x^{\frac{1}{x}} = x^{\frac{\ln x}{x}}$, 由于指数 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x = e$ 时取得最大值, 故数列选项中最大的是 $\sqrt[3]{3}$.

11. 【解析】(1) 因为 $y = \frac{\ln x}{x}$, 所以 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 所以 l 的斜率 $k = y'|_{x=1} = 1$, 所以 l 的方程为 $y = x - 1$.

(2) 证明: 令 $f(x) = x(x-1) - \ln x$, ($x > 0$) 曲线 C 在直线 l 的下方, 即 $f(x) = x(x-1) - \ln x > 0$, 则 $f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x} = \frac{(2x+1)(x-1)}{x}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 又 $f(1) = 0$, 所以 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 0$, 即 $\frac{\ln x}{x} < x - 1$; $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 即 $\frac{\ln x}{x} < x - 1$ 即除切点 $(1, 0)$ 之外, 曲线 C 在直线 l 的下方.

12. 【解析】(1) 求导数可得 $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, 因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数, 所以 $\frac{1}{x} - a \leq 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $a \geq \frac{1}{x}$, $x \in (1, +\infty)$. 所以 $a \geq 1$. 令 $g'(x) = e^x - a = 0$, 得 $x = \ln a$. 当 $x < \ln a$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > \ln a$ 时, $g'(x) > 0$. 又 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有最小值, 所以 $\ln a > 1$, 即 $a > e$. 故 a 的取值范围为: $a > e$;

(2) 当 $a \leq 0$ 时, $g(x)$ 必为单调函数; 当 $a > 0$ 时, 令 $g'(x) = e^x - a > 0$, 解得 $a < e^x$, 即 $x > \ln a$, 因为 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是单调增函数, 类似(1)有 $\ln a \leq -1$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{e}$. 结合上述两种情况, 有 $a \leq \frac{1}{e}$. 判断 $f(x) = \ln x - ax$

的零点个数, 只需判断 $y = a$ 与 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的交点个数, 根据函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在区间 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 显然当 $a \leq 0$ 或 $a = \frac{1}{e}$ 时, $h(x)$ 与 $y = a$ 只有一个交点, 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $h(x)$ 与 $y = a$ 有两个交点. 综合, 当 $a \leq 0$ 或 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 的零点个数为1, 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 的零点个数为2.

13. 【解析】(1) 因为 $f(x) = e^x + e^{-x}$, 所以 $f(-x) = e^{-x} + e^x = f(x)$, 即函数: $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数;

(2) 若关于 x 的不等式 $m f(x) \leq e^{-x} + m - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $m(e^x + e^{-x} - 1) \leq e^{-x} - 1$, 因为 $x > 0$, 所以 $e^x + e^{-x} - 1 > 0$, 即 $m \leq \frac{e^{-x} - 1}{e^x + e^{-x} - 1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 设 $t = e^x$,

($t > 1$), 则 $m \leq \frac{1-t}{t^2-t+1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 因为 $\frac{1-t}{t^2-t+1} = -\frac{t-1}{(t-1)^2+(t-1)+1} = -\frac{1}{t-1+\frac{1}{t-1}+1} \geq -\frac{1}{3}$, 当且仅当 $t = 2$ 时等

号成立, 所以 $m \leq -\frac{1}{3}$;

(3) 令 $g(x) = e^x + e^{-x} - a(-x^3 + 3x)$, 则 $g'(x) = e^x - e^{-x} + 3a(x^2 - 1)$, 当 $x \geq 1$, $g'(x) > 0$, 即函数 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 故此时 $g(x)$ 的最小值 $g(1) = e + \frac{1}{e} - 2a$, 由于存在 $x_0 \in [1, +\infty)$, 使得 $f(x_0) < a(-x_0^3 + 3x_0)$ 成立, 故 $e + \frac{1}{e} - 2a < 0$, 即 $a > \frac{1}{2}\left(e + \frac{1}{e}\right)$, 要比较 e^{a-1} 与 a^{e-1} 的大小, 即比

较 $(a-1)\ln e$ 与 $(e-1)\ln a$ 大小, 即比较 $\frac{\ln e}{e-1}$ 与

$\frac{\ln a}{a-1}$ 大小. 构造函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x-1} (x > 1)$,

$$h'(x) = \frac{1 - \frac{1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}, \text{ 再令 } t(x) = 1 - \frac{1}{x} - \ln x,$$

$t'(x) = \frac{1-x}{x^2}$, 故可知 $t(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单

调递减, $t(x) < t(1) = 0$, 故 $h'(x) < 0$ 在区间

$(1, +\infty)$ 恒成立, ① $a \in \left(\frac{1}{2}\left(e + \frac{1}{e}\right), e\right) \subseteq$

$(1, e)$ 时, $e^{a-1} < a^{e-1}$; ② 当 $a = e$ 时, $a^{e-1} =$

e^{e-1} ; ③ 当 $a \in (e, +\infty) \subseteq (e-1, +\infty)$ 时,

当 $a > e-1$ 时, $h(a) > h(e) = 0$, 即 $a-1 > (e-1)\ln a$, 从而 $e^{a-1} > a^{e-1}$.

专题3 对数独行侠, 指数找朋友

◀◀◀ 达标训练

1. 【解析】(1) $f'(x) = \frac{(2ax+1)e^x - (ax^2+x-1)e^x}{(e^x)^2} = -\frac{(ax+1)(x-2)}{e^x}$. 所以 $f'(0) = 2$, 即曲线 $y =$

$f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线斜率 $k = 2$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程为 $y - (-1) = 2x$. 即 $2x - y - 1 = 0$ 为所求;

(2) 证明: 函数 $f(x)$ 的定义域为: $\mathbf{R}$, 可得 $f'(x)$

$$= \frac{(2ax+1)e^x - (ax^2+x-1)e^x}{(e^x)^2} = -\frac{(ax+1)(x-2)}{e^x}.$$

令 $f'(x) = 0$, 可得 $x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{a} < 0$, 当 $x \in$

$\left(-\infty, -\frac{1}{a}\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in \left(-\frac{1}{a}, 2\right)$ 时,

$f'(x) > 0$, $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$. 所以

$f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{a}\right), (2, +\infty)$ 递减, 在

$\left(-\frac{1}{a}, 2\right)$ 递增, 注意到 $a \geq 1$ 时, 函数 $g(x) =$

$ax^2 + x - 1$ 在 $(2, +\infty)$ 单调递增, 且 $g(2) = 4a$

$+1 > 0$, 函数 $f(x)$ 的图像如下:

$a \geq 1$, 所以 $\frac{1}{a} \in (0, 1]$, 则 $f\left(-\frac{1}{a}\right) = -e^{\frac{1}{a}} \geq$

$-e$, 所以 $f(x) \geq_{\min} = -e^{\frac{1}{a}} \geq -e$, 所以当 $a \geq 1$

时, $f(x) + e \geq 0$.

2. 【解析】(1) 函数 $f(x) = ax \ln x$ 的导数为 $f'(x) = a(1 + \ln x)$, 图像上在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜

率为 a , 由切线与直线 $y = -\frac{1}{2}x$ 垂直, 可得

$a = 2$, 即 $f(x) = 2x \ln x$;

(2) 所有 $x \geq 1$ 都有 $f(x) - mx + 2 \geq 0$, 即为 $2x \ln x$

$- mx + 2 \geq 0$, 即有 $m \leq 2 \ln x + \frac{2}{x}$ 在 $x \geq 1$ 恒成立,

设 $g(x) = 2 \ln x + \frac{2}{x}$, $g'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} =$

$\frac{2(x-1)}{x^2}$, 由 $x \geq 1$ 可得 $g'(x) \geq 0$, $g(x)$ 递增,

可得 $g(x)$ 的最小值为 $g(1) = 2$, 则 $m \leq 2$, 即 m 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

3. 【解析】(1) 函数 $f(x) = (x - \sqrt{2x-1})e^{-x} (x \geq \frac{1}{2})$,

导数 $f'(x) = \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x-1}} \cdot 2\right)e^{-x} - (x -$

$\sqrt{2x-1})e^{-x} = \left(1 - x + \frac{2x-2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x} = (1-x)$

$\left(1 - \frac{2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x}$;

(2) 由 $f(x)$ 的导数 $f'(x) = (1-x)\left(1 - \frac{2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x}$,

可得 $f'(x) = 0$ 时, $x = 1$ 或 $\frac{5}{2}$, 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时,

$f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减; 当 $1 < x < \frac{5}{2}$ 时, $f'(x) > 0$,

$f(x)$ 递增; 当 $x > \frac{5}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减, 且 $x \geq \sqrt{2x-1} \Leftrightarrow x^2 \geq 2x-1 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geq 0$, 则 $f(x) \geq 0$. 由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$, $f(1) = 0$, $f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{5}{2}}$, 即有 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$, 最小值为 $f(1) = 0$. 则 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}\right]$.

4. 【解析】(1) 由 $f'(x) = \ln x - 2ax + 2a$, 可得 $g(x) = \ln x - 2ax + 2a$, $x \in (0, +\infty)$, 所以 $g'(x) = \frac{1}{x} - 2a = \frac{1-2ax}{x}$, 当 $a \leq 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增; 当 $a > 0$, $x \in \left(0, \frac{1}{2a}\right)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增, $x \in \left(\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减. 所以当 $a \leq 0$ 时, $g(x)$ 的单调增区间为 $(0, +\infty)$; 当 $a > 0$ 时, $g(x)$ 的单调增区间为 $\left(0, \frac{1}{2a}\right)$, 单调减区间为 $\left(\frac{1}{2a}, +\infty\right)$;
- (2) 由(1)知, $f'(1) = 0$. ① 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2a} > 1$, 由(1)知 $f'(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2a}\right)$ 内单调递增, 可得当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in \left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递减, 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 内单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 不合题意;
- ② 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2a} = 1$, $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减, 所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 单调递减, 不合题意;

③ 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $0 < \frac{1}{2a} < 1$, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2a}\right)$ 上单调递减, 当 $x \in \left(\frac{1}{2a}, 1\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值, 符合题意.

综上所述, 正实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

5. 【解析】(1) $f'(x) = b(\ln x + 1)$, 由 $f'(e) = b(1 + 1) = 4$, 解得: $b = 2$, 故 $f(x) = 2x \ln x + 3$, ($x > 0$), $f'(x) = 2(\ln x + 1)$, 令 $f'(x) > 0$, 解得: $x > e^{-1}$, 令 $f'(x) < 0$, 解得: $0 < x < e^{-1}$, 故 $f(x)$ 在 $(0, e^{-1})$ 上递减, 在 $(e^{-1}, +\infty)$ 上递增, 故 $f(x)_{\text{极小值}} = f(e^{-1}) = 3 - \frac{2}{e}$, 无极大值;
- (2) 若对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 有 $f(x) - g(x) \geq 0$ 恒成立, 即对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 都有 $2x \ln x + 3 + x^2 - ax \geq 0$ 恒成立, 即 $a \leq 2 \ln x + x + \frac{3}{x}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 令 $h(x) = 2 \ln x + x + \frac{3}{x}$, ($x > 0$), $h'(x) = \frac{2}{x} + 1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2}$, 令 $h'(x) > 0$, 解得: $x > 1$, 令 $h'(x) < 0$, 解得: $0 < x < 1$, 故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 递减, 在 $(1, +\infty)$ 递增, 故 $h(x)_{\text{min}} = h(1) = 4$, 故 $a \leq 4$.
6. 【解析】(1) 由 $f(x) = e^x - ax$, 得 $f'(x) = e^x - a$. 又 $f'(0) = 1 - a = -1$, 解得 $a = 2$, 所以 $f(x) = e^x - 2x$, $f'(x) = e^x - 2$. 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \ln 2$, 当 $x < \ln 2$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x > \ln 2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 所以当 $x = \ln 2$ 时, $f(x)$ 有极小值为 $f(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 \ln 2 = 2 - \ln 4$. $f(x)$ 无极大值;
- (2) 令 $g(x) = \frac{x^2}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{2x - x^2}{e^x} = 0$ 时 $x = 0$

或 $x=2$, $g(x)_{\max} = g(2) = \frac{4}{e^2} < 1$, 故 $x^2 < e^x$;

(3) 要证当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 恒有 $\frac{x^2}{e^x} < c$. 即

要证 $c > g(x)$ 对 $x \in (x_0, +\infty)$ 恒成立, 易知

$g(x)$ 在 $(2, +\infty) \downarrow$ 且 $g(x)_{\max} = \frac{4}{e^2}$, 当 $c > \frac{4}{e^2}$

时, 显然 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立; 当 $c \leq \frac{4}{e^2}$ 时,

令 $x_0 > 2$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow 0$, 即令 $c = \frac{x_0^2}{e^{x_0}}$, 当

$x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g(x) < c$, 因此, 当对任意

给定的正数 c , 总存在 x_0 , 当 $x \in (x_0, +\infty)$

时, 恒有 $x^2 < ce^x$.

7. 【解析】(1) 因为函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$. 所以 x

> 0 , $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$, 因为 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极

值点, 所以 $f'(2) = ae^2 - \frac{1}{2} = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2e^2}$,

所以 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x$

$-\frac{1}{x}$, 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时,

$f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减, 在

$(2, +\infty)$ 单调递增;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, 要证 $f(x) \geq \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$

≥ 0 , 只需 $\frac{\ln x + 1}{e^x} \leq \frac{1}{e}$, 设 $g(x) = \frac{\ln x + 1}{e^x}$, 则

$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} - 1 - \ln x}{e^x}$, 由 $g'(x) = 0$, 得 $x=1$, 令

$h(x) = \frac{1}{x} - 1 - \ln x$, $h'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$, 当

$0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$,

所以 $x=1$ 是 $g(x)$ 的最大值点, 故当 $x > 0$ 时,

$g(x) \leq g(1) = \frac{1}{e}$, 所以当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

8. 【解析】因为 $f(x) = e^x - ax^2 - bx - 1$, 所以

$g(x) = f'(x) = e^x - 2ax - b$, 又 $g'(x) = e^x - 2a$,

$x \in [0, 1]$, 所以 $1 \leq e^x \leq e$, 所以, ① 当 $a \leq \frac{1}{2}$

时, 则 $2a \leq 1$, $g'(x) = e^x - 2a \geq 0$, 所以函数

$g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递增, $g(x)_{\min} =$

$g(0) = 1 - b$;

② 当 $\frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}$, 则 $1 < 2a < e$, 所以当 $0 < x <$

$\ln(2a)$ 时, $g'(x) = e^x - 2a < 0$, 当 $\ln(2a) < x < 1$

时, $g'(x) = e^x - 2a > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在区间

$[0, \ln(2a)]$ 上单调递减, 在区间 $[\ln(2a), 1]$

上单调递增, $g(x)_{\min} = g[\ln(2a)] = 2a -$

$2a \ln(2a) - b$;

③ 当 $a \geq \frac{e}{2}$ 时, 则 $2a \geq e$, $g'(x) = e^x - 2a \leq 0$,

所以函数 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递减,

$g(x)_{\min} = g(1) = e - 2a - b$, 综上: 函数 $g(x)$ 在

区间 $[0, 1]$ 上的最小值为 $g_{\min}(x)$

$$= \begin{cases} 1 - b & \left(a \leq \frac{1}{2} \right) \\ 2a - 2a \ln(2a) - b & \left(\frac{1}{2} < a < \frac{e}{2} \right) \\ e - 2a - b & \left(a \geq \frac{e}{2} \right) \end{cases}$$

(2) 由 $f(1) = 0$, $\Rightarrow e - a - b - 1 = 0 \Rightarrow b = e - a -$

1 , 又 $f(0) = 0$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有

零点, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有三个

单调区间, 由(1)知当 $a \leq \frac{1}{2}$ 或 $a \geq \frac{e}{2}$ 时, 函数

$g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调, 不可能满足“函数

$f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有三个单调区间”这一

要求. 当 $\frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}$ 时, 构造函数 $h(x) =$

$\frac{ax^2 + (e - a - 1)x + 1}{e^x} = 1$ 在区间 $(0, 1)$ 内有解,

由于 $h(0) = h(1) = 1$, 即 $h'(x) =$

$\frac{2ax + (e - a - 1) - ax^2 - (e - a - 1)x - 1}{e^x} = 0$ 在区

$$\text{间}(0, 1) \text{内有两解, 故} \begin{cases} h(0) < 0 \\ h(1) < 0 \\ 0 < \frac{3a-e+1}{2a} < 1 \\ \Delta > 0 \end{cases}$$

解得: $e-2 < a < 1$.

专题4 破解洛必达(L'Hopital)法则之 隐零点护航法

←←← 达标训练

1. 【解析】根据不等式 $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}$, 即可得 $(x+1)\ln(x+1) \geq x$, 故当 $a \leq 1$ 时, 不等式恒成立, 当仅当 $x=0$ 时等号成立.

2. 【解析】(1) 由 $f(x)$ 得 $f'(x) = e^x + e^{-x} - 2 \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} - 2 = 0$, 即 $f'(x) \geq 0$, 当且仅当 $e^x = e^{-x}$ 即 $x=0$ 时, $f'(x) = 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数;

(2) 分离变量得 $4b < \frac{e^{2x} - e^{-2x} - 4x}{e^x - e^{-x} - 2x}$, 可知当 $x \rightarrow 0$ 时, 属于 $\frac{0}{0}$ 类型, 故可以用洛必达法则, $4b <$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x} - 4x}{e^x - e^{-x} - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x} - 4}{e^x + e^{-x} - 2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x} - 4e^{-2x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8e^{2x} + 8e^{-2x}}{e^x + e^{-x}} = 8, \text{ 故 } b < 2, \text{ 由}$$

于 $x \neq 0$, 故 $b \leq 2$, b 的最大值为 2;

(3) 因为 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 根据 (II) 中 $g(x) = e^{2x} - e^{-2x} - 4b(e^x - e^{-x}) + (8b-4)x$, 为了凑配 $\ln 2$, 并利用 $\sqrt{2}$ 的近似值, 故将 $\ln \sqrt{2}$ 即 $\frac{1}{2} \ln 2$ 代入 $g(x)$ 的解析式中, 得 $g(\ln \sqrt{2}) = \frac{3}{2} - 2\sqrt{2}b + 2(2b-1) \cdot \ln 2$. 当 $b=2$ 时, 由 $g(x) > 0$, 得 $g(\ln 2) = \frac{3}{2} - 4\sqrt{2} + 6\ln 2 > 0$, 从而 $\ln 2$

$$> \frac{8\sqrt{2}-3}{12} > \frac{8 \times 1.4142 - 3}{12} = 0.6928; \text{ 所以 } \ln 2 \text{ 的}$$

近似值为 0.693.

3. 【解析】(1) 由题意, $f'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - 1}{x}$, $x > 0$, ①当 $a \leq 0$ 时, $2ax^2 - 1 \leq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; ②当 $a > 0$ 时, $f'(x) = \frac{2a\left(x + \sqrt{\frac{1}{2a}}\right)\left(x - \sqrt{\frac{1}{2a}}\right)}{x}$, 当 $x \in \left(0, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right)$ 时,

$f'(x) < 0$, 当 $x \in \left(\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$,

故 $f(x)$ 在 $\left(0, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递增;

(2) 原不等式等价于 $f(x) - \frac{1}{x} + e^{1-x} > 0$ 在 $x \in$

$(1, +\infty)$ 上恒成立, 一方面, 令 $g(x) = f(x)$

$-\frac{1}{x} + e^{1-x} = ax^2 - \ln x - \frac{1}{x} + e^{1-x} - a$, 只需

$g(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒大于 0 即可, 又因为

$g(1) = 0$, 故 $g'(x)$ 在 $x=1$ 处必大于等于 0. 令

$$F(x) = g'(x) = 2ax - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - e^{1-x}, \quad g'(1) \geq 0,$$

可得 $a \geq \frac{1}{2}$. 另一方面, 当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, $F'(x) =$

$$2a + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} \geq 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} =$$

$$\frac{x^3 + x - 2}{x^3} + e^{1-x}, \text{ 因为 } x \in (1, +\infty), \text{ 故 } x^3 + x$$

$$- 2 > 0, \text{ 又 } e^{1-x} > 0, \text{ 故 } F'(x) \text{ 在 } a \geq \frac{1}{2} \text{ 时恒大}$$

于 0. 所以当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, $F(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$

单调递增. 所以 $F(x) > F(1) = 2a - 1 \geq 0$, 故

$g(x)$ 也在 $x \in (1, +\infty)$ 单调递增. 所以 $g(x) >$

$g(1) = 0$, 即 $g(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒大于 0.

综上, $a \geq \frac{1}{2}$.

4. 【解析】(1) 只需 $\frac{1-x}{1+x} \leq \frac{1}{e^{2x}} \leq \frac{1}{(1+x)^2}$, 根据不等

式 $e^x \geq 1+x$, 可得 $\frac{1}{e^{2x}} \leq \frac{1}{(1+x)^2}$, 令 $F(x) = e^{2x}(1-x) - (1+x)$, $F(0) = 0$, $F'(x) = e^{2x}(1-2x) - 1$, $F'(0) = 0$, $F''(x) = -4xe^{2x} \leq 0$, 故 $F'(x) \leq 0$, $F(x) = e^{2x}(1-x) - (1+x) \leq 0$ 命题即可得证;

(2) $a \leq \frac{1-x-\frac{x^3}{2}-1-2x\cos x}{x} \leq \frac{(1+x)e^{-2x}-\frac{x^3}{2}-1-2x\cos x}{x}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 属于 $\frac{0}{0}$ 类型, 可以用洛必达法则, a

$< \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)e^{-2x} - \frac{x^3}{2} - 1 - 2x\cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2(1+x)e^{-2x} + e^{-2x} - \frac{3}{2}x^2 - 2\cos x + 2x\sin x}{1} = -3$, 由于 $x \neq 0$, 故 $a \leq -3$.

(1) 证明: ① 当 $x \in [0, 1)$ 时, $(1+x)e^{-2x} \geq 1-x \Leftrightarrow (1+x)e^{-x} \geq (1-x)e^x$, 令 $h(x) = (1+x)e^{-x} - (1-x)e^x$, 则 $h'(x) = x(e^x - e^{-x})$. 当 $x \in [0, 1)$ 时, $h'(x) \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[0, 1)$ 上是增函数, 所以 $h(x) \geq h(0) = 0$, 即 $f(x) \geq 1-x$;

② 当 $x \in [0, 1)$ 时, $f(x) \leq \frac{1}{1+x} \Leftrightarrow e^x \geq 1+x$, 令 $u(x) = e^x - 1 - x$, 则 $u'(x) = e^x - 1$. 当 $x \in [0, 1)$ 时, $u'(x) \geq 0$, 所以 $u(x)$ 在 $[0, 1)$ 单调递增, 所以 $u(x) \geq u(0) = 0$, 所以 $f(x) \leq \frac{1}{1+x}$.

综上所述: $1-x \leq f(x) \leq \frac{1}{1+x}$. 设 $G(x) = f(x)$

$-g(x) = (1+x)e^{-2x} - \left(ax + \frac{1}{2}x^3 + 1 + 2x\cos x\right) \geq 1-x-ax-1-\frac{1}{2}x^3-2x\cos x = -x\left(a+1+\frac{x^2}{2}+2\cos x\right)$.

令 $H(x) = \frac{x^2}{2} + 2\cos x$, 则 $H'(x) = x - 2\sin x$, 令

$K(x) = x - 2\sin x$, 则 $K'(x) = 1 - 2\cos x$. 当 $x \in [0, 1)$ 时, $K'(x) < 0$, 可得 $H'(x)$ 是 $[0, 1)$ 上的减函数, 所以 $H'(x) \leq H'(0) = 0$, 故 $H(x)$ 在 $[0, 1)$ 单调递减, 所以 $H(x) \leq H(0) = 2$. 所以 $a+1+H(x) \leq a+3$. 所以当 $a \leq -3$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 在 $[0, 1)$ 上恒成立. 下面证明当 $a > -3$ 时, $f(x) \leq g(x)$ 在 $[0, 1)$ 上不恒成立.

$f(x) - g(x) \leq \frac{1}{1+x} - \left(1+ax+\frac{1}{2}x^3+2x\cos x\right) = \frac{-x}{1+x} - ax - \frac{x^3}{2} - 2x\cos x = -x\left(\frac{1}{1+x} + a + \frac{x^2}{2} + 2\cos x\right)$.

令 $v(x) = \frac{1}{1+x} + a + \frac{x^2}{2} + 2\cos x = \frac{1}{1+x} + a + H(x)$, 则 $v'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2} + H'(x)$.

当 $x \in [0, 1)$ 时, $v'(x) \leq 0$, 故 $v(x)$ 在 $[0, 1)$ 上是减函数, 所以 $v(x) \in (a+1+2\cos 1, a+3]$;

当 $a > -3$ 时, $a+3 > 0$. 所以存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $v(x_0) > 0$, 此时, $f(x_0) < g(x_0)$.

即 $f(x) \geq g(x)$ 在 $[0, 1)$ 不恒成立. 综上实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -3]$.

5. 【解析】(1) 函数的定义域为 $(-a, +\infty)$, 求导

可得 $f'(x) = \frac{x+a-1}{x+a}$ 令 $f'(x) = 0$, 可得 $x = 1-a > -a$, 令 $f'(x) > 0$, $x > -a$ 可得 $x > 1-a$; 令 $f'(x) < 0$, $x > -a$ 可得 $-a < x < 1-a$ 所以 $x = 1-a$ 时, 函数取得极小值且为最小值因为函数 $f(x) = x - \ln(x+a)$ 的最小值为 0, 所以 $f(1-a) = 1-a-0$, 解得 $a=1$;

(2) $k \geq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2}$, $x \rightarrow 0$ 时, 属于 $\frac{0}{0}$ 类型,

故可用洛必达法则, $k \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{x+1}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{x+1}\right)^2}{2} = \frac{1}{2}$;

(3) 当 $n=1$ 时, 不等式左边 $= 2 - \ln 3 < 2 =$ 右边, 不等式成立; 当 $n \geq 2$ 时, $\sum_{i=1}^n f\left(\frac{2}{2i-1}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{2}{2i-1} - \ln(2n+1)$, 在(2)中, 取 $k = \frac{1}{2}$, 得 $f(x) \leq \frac{1}{2}x^2$, 从而可得 $f\left(\frac{2}{2i-1}\right) \leq \frac{2}{(2i-1)^2} < \frac{2}{(2i-3) \cdot (2i-1)}$, 由此可证结论.

6. 【解析】(1) $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = x(e^x - 1) - \frac{1}{2}x^2$, $f'(x) = e^x - 1 + x \cdot e^x - x = (e^x - 1) \cdot (x + 1)$, 令 $f'(x) > 0$, 可得 $x < -1$ 或 $x > 0$; 令 $f'(x) < 0$, 可得 $-1 < x < 0$; 所以函数的单调增区间是 $(-\infty, -1)$, $(0, +\infty)$; 单调减区间为 $(-1, 0)$;

(2) $f(x) = x(e^x - 1 - ax)$. 令 $g(x) = e^x - 1 - ax$, 则 $g'(x) = e^x - a$. ①若 $a \leq 1$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) \geq 0$, $g(x)$ 为增函数, 而 $g(0) = 0$, 从而当 $x \geq 0$ 时, $g(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq 0$. ②若 $a > 1$, 则当 $x \in (0, \ln a)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 为减函数, 而 $g(0) = 0$, 从而当 $x \in (0, \ln a)$ 时, $g(x) < 0$, 即 $f(x) < 0$. 综合得 a 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

7. 【解析】(1) $f'(x) = a - \frac{b}{x^2}$, 则有 $\begin{cases} f(1) = a + b + c = 0 \\ f'(1) = a - b = 1 \end{cases}$,

$$\text{解得} \begin{cases} b = a - 1 \\ c = 1 - 2a \end{cases};$$

(2) 由(1)知, $f(x) = ax + \frac{a-1}{x} + 1 - 2a$, $f(x) \geq$

$$\ln x \Rightarrow a \left(x + \frac{1}{x} - 2 \right) \geq \ln x + \frac{1}{x} - 1 \Rightarrow a \geq$$

$$\frac{\ln x + \frac{1}{x} - 1}{x + \frac{1}{x} - 2} \text{ 对 } x \in [1, +\infty), \text{ 当 } x \rightarrow 1 \text{ 时, 属于}$$

$$\frac{0}{0} \text{ 型, 利用洛必达法则 } a \geq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + \frac{1}{x} - 1}{x + \frac{1}{x} - 2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{\frac{2}{x^3}} = \frac{1}{2} \text{ 对 } x \in [1, +\infty)$$

恒成立.

8. 【解析】(1) 函数的定义域为 $(-1, +\infty)$, 函数的导数 $f'(x) = \frac{a}{x+1} - \frac{1-x}{e^x}$, 若 $f(1)$ 是 $f(x)$ 的

极值, 则 $f'(1) = 0$, 即 $f'(1) = \frac{a}{2} - \frac{1-1}{e} = \frac{a}{2}$

$= 0$ 得 $a = 0$, 此时 $f'(x) = -\frac{1-x}{e^x}$, 由 $f'(x) =$

0 得 $x = 1$, 当 $x > -1$ 时, $f'(x)$, 则 $f(x)$ 的单调

递减区间为 $(-1, 1)$, 递增区间为 $(1, +\infty)$;

(2) 因为 $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{a}{x+1} - \frac{1-x}{e^x} =$

$\frac{ae^x + x^2 - 1}{(x+1)e^x}$, 记 $h(x) = ae^x + x^2 - 1$, 则 $h(0) =$

$a - 1$, 且 $h'(x) = ae^x + 2x$, 当 $h(0) = a - 1 \geq 0$,

即 $a \geq 1$ 时, $h'(x) = ae^x + 2x > 0$, $(x > 0)$,

$h(x) = ae^x + x^2 - 1$, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $x > 0$ 时, $h(x) > h(0) = a - 1 \geq 0$, 则 $f'(x) >$

0 , 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $f(x) \geq$

$f(0) = 0$, 符合. 当 $h(0) = a - 1 < 0$, 即 $a < 1$

时, 则存在 $m > 0$ 使得 $x \in (0, m)$ 时, $h(x) < 0$,

此时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, m)$ 上单调递减, 当 0

$< x < m$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 不符合, 综上实数

a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

9. 【解析】(1) 由题意知, $f'(x) = -\frac{a}{x} - \frac{xe^x - e^x}{x^2} +$

$a = \frac{(ax - e^x)(x - 1)}{x^2} (x > 0)$. 因为当 $a < 0$ 时,

$ax - e^x < 0$. 所以当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $0 < x$

< 1 时, $f'(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上

单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减;

(2) 由题意, 当 $a = 1$ 时, 不等式 $f(x) +$

$\left(bx - b + \frac{1}{x} \right) e^x - x \geq 0$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 时恒成

立等价于 $\ln x - b(x-1)e^x \leq 0$ 在 $x \in (1, +\infty)$

时恒成立, $b \geq \frac{\ln x}{(x-1)e^x} \Rightarrow b \geq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{(x-1)e^x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x}$

$\frac{1}{x} = \frac{1}{e}$, 隐零点护航法, 令 $h(x) = \ln x - b(x-1)e^x$, 可知, 当 $b \leq 0$ 时, $h(x) > 0$, 不合题意;

当 $b > 0$ 时, 得 $h'(x) = \frac{1}{x} - bxe^x$, $h'(1) = 1 - be$;

①当 $b \geq \frac{1}{e}$ 时, $h'(1) = 1 - be \leq 0$, 又 $h'(x) =$

$\frac{1}{x} - bxe^x$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $h'(x)$

≤ 0 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立, 则 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 又 $h(1) = 0$, 所以 $h(x) < 0$

在 $(1, +\infty)$ 恒成立; ②当 $0 < b < \frac{1}{e}$ 时, $h'(1)$

$= 1 - be > 0$, $h'\left(\frac{1}{b}\right) = b - e^{\frac{1}{b}} < 0$, 又 $h'(x) =$

$\frac{1}{x} - bxe^x$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 所以存在唯

一 $x_0 \in (1, +\infty)$, 使得 $h'(x) = 0$, 所以当 $x \in (1, x_0)$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时,

$h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减, 又 $h(x)$ 在 $x=1$ 处连续

且 $h(1) = 0$, 所以 $h(x) > 0$ 在 $(1, x_0)$ 上成立, 不合题意. 综上, 实数 b 的取值范围

为 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

10. 【解析】(1) 由已知 $g_1(x) = \frac{x}{1+x}$, $g_2(x) =$

$$g(g_1(x)) = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x}, g_3(x) = \frac{x}{1+3x} \dots$$

可得 $g_n(x) = \frac{x}{1+nx}$, 用数学归纳法加以证明;

(2) 利用不等式 $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}$, 可知 $a \leq 1$.

由已知得到 $\ln(x+1) \geq \frac{ax}{x+1}$ 恒成立构造函数

$\varphi(x) = \ln(x+1) - \frac{ax}{x+1}$ ($x \geq 0$), 利用导数求出

函数的最小值即可;

(3) 在(2)中取 $a=1$, 可得 $\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}$, x

> 0 , 令 $x = \frac{1}{n}$ 则 $\ln \frac{n+1}{n} > \frac{1}{n+1}$, $x > 0$, n 依次

取 $1, 2, 3, \dots$, 然后各式相加即得到不等式.

11. 【解析】(1) 由题意, $f'(x) = (2ax+1)e^{-x} - (ax^2+x+a)e^{-x} = -e^{-x}[ax^2+(1-2a)x+a-1] = -e^{-x}(x-1)(ax+1-a)$.

(i) 当 $a=0$ 时, $f'(x) = -e^{-x}(x-1)$, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x < 1$; $f'(x) < 0$, 得 $x > 1$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调递增, $(1, +\infty)$ 单调递减;

(ii) 当 $a > 0$ 时, $1 - \frac{1}{a} < 1$, 令 $f'(x) > 0$, 得

$1 - \frac{1}{a} < x < 1$; $f'(x) < 0$, 得 $x < 1 - \frac{1}{a}$ 或 $x >$

1 , 所以 $f(x)$ 在 $\left(1 - \frac{1}{a}, 1\right)$ 单调递增,

$\left(-\infty, 1 - \frac{1}{a}\right)$, $(1, +\infty)$ 单调递减;

(2) 此题涉及参变转移, 此时 a 是变量, x 是参数, 求出 $g(a)$ 的最大值, 等价于 $b \ln(x+1) \geq g(a)_{\max} = g(0)$, 即 $xe^{-x} \leq b \ln(x+1)$, 对 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立, 此时满足洛必达 $b \geq$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x \ln(x+1)} = 1$. 过程如下:

令 $g(a) = e^{-x}(x^2+1)a + xe^{-x}$, $a \in (-\infty, 0]$, 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $e^{-x}(x^2+1) \geq 0$,

$g(a)$ 单调递增, 则 $g(a)_{\max} = g(0) = xe^{-x}$, 则

$g(a) \leq b \ln(x+1)$ 对 $\forall a \in (-\infty, 0]$ 恒成立等价于 $b \ln(x+1) \geq g(a)_{\max} = g(0)$, 即 $xe^{-x} \leq$

$b \ln(x+1)$, 对 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立.

(i) 当 $b \leq 0$ 时, $\forall x \in (0, +\infty)$, $b \ln(x+1) < 0$, $xe^{-x} > 0$, 此时 $xe^{-x} > b \ln(x+1)$, 不合题意, 舍去;

(ii) 当 $b > 0$ 时, 令 $h(x) = b \ln(x+1) - xe^{-x}$,

$h(0) = 0$, $x \in [0, +\infty)$, 则 $h'(x) = \frac{b}{x+1} -$

$(e^{-x} - xe^{-x}) = \frac{be^x + x^2 - 1}{(x+1)e^x}$, 其中 $(x+1)e^x > 0$,

$\forall x \in [0, +\infty)$, 令 $p(x) = be^x + x^2 - 1$, $x \in [0, +\infty)$, 则 $p(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

① 当 $b \geq 1$ 时, $p(x) \geq p(0) = b - 1 \geq 0$, 所以对 $\forall x \in [0, +\infty)$, $h'(x) \geq 0$, 则 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 故对任意 $x \in [0, +\infty)$, $h(x) \geq h(0) = 0$, 即不等式 $b \ln(x+1) \geq xe^{-x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 满足题意;

② 当 $0 < b < 1$ 时, 由 $p(0) = b - 1 < 0$, $p(1) = be > 0$ 及 $p(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 所以存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $p(x_0) = 0$, 且 $x \in (0, x_0)$ 时, $p(x) < 0$. 从而 $x \in (0, x_0)$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上单调递减, 则 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < h(0) = 0$, 即 $b \ln(x+1) < xe^{-x}$, 不符合题意. 综上所述, $b \geq 1$.

12. 【解析】(1) 因为 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, 所以 $f'(x) = e^{x+m} - 3x^2$. 因为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 1, 所以 $f'(0) = e^m = 1$, 解得 $m = 0$;

(2) 因为 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, $g(x) = \ln(x+1) + 2$, 所以 $f(x) > g(x) - x^3$ 等价于 $e^{x+m} - \ln(x+1) - 2 > 0$. 根据不等式 $e^{x+m} \geq e^{x+1} \geq x+1+1$, 即证 $x - \ln(x+1) > 0$.

13. 【解析】(1) 解: 当 $a = -1$ 时, $f(x) = e^{-x} + x$, 则 $f'(x) = -\frac{1}{e^x} + 1$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$.

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$.

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 所以当 $x = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 其值为 $f(0) = 1$;

(2) 若 $x \geq 0$ 时, $f(-x) + \ln(x+1) \geq 1$, 即 $e^x + ax + \ln(x+1) - 1 \geq 0$. $a \geq \frac{1 - \ln(1+x) - e^x}{x}$,

利用洛必达法则求出实数 a 的取值范围是 $[-2, +\infty)$;

(3) 由(2)知, 当 $a = -2$ 时, $g(x) = e^x - 2x + \ln(x+1) - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $g\left(\frac{1}{2}\right) > g(0)$, 即 $e^{\frac{1}{2}} - 1 + \ln\left(\frac{1}{2} + 1\right) - 1 > 0$.

所以 $\ln \frac{3}{2} > 2 - \sqrt{e}$. 所以 $\frac{3}{2} > e^{2-\sqrt{e}}$, 即 $e^{2-\sqrt{e}} < \frac{3}{2}$.

14. 【解析】(1) $b = 1$;

(2) 分离变量可得: $a \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} =$

$\frac{\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)}$, 先令 $F(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$,

$F'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\ln^2(1+x)}$, 根据不等式 $\ln(1+x) > x$, 故 $F'(x) > 0$ 对 $x \in [0, 1]$ 恒成立,

$F(x)$ 为单调增函数, 故只需证明 $a \leq F(0)$ 即可, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$ 属于 $\frac{0}{0}$

类型, 用洛必达法则 $a \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{\ln(1+x) + \frac{x}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2}}{\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x+2} = -\frac{1}{2}$;

(3) 要证 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 故只需

证 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 只需证

$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 只需证

$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$, 令 $x = \frac{1}{n}$, 则

$x \in (0, 1]$, 构造函数 $\frac{x}{x+1} < \ln x < x$ 即可.

专题5 利用零点比大小破解参数取值范围

达标训练

1. C 【解析】解法一: 由曲线 $f(x) = \ln x - 1$ 得 $x >$

0 , $f'(x) = \frac{1}{x}$, 因为直线 $y = ax + b$ 与曲线 $f(x)$

$= \ln x - 1$ 相切, 所以 $a = \frac{1}{x}$ ($a > 0$), 则切点的

横坐标为 $x = \frac{1}{a}$ 所以联立两解析式得 $a \cdot \frac{1}{a} + b$

$= \ln \frac{1}{a} - 1$, 即 $1 + b = -\ln a - 1$, 整理得 $\ln a + b$

$= -2$ ($a > 0$), 所以 $\frac{b}{a} = \frac{-2 - \ln a}{a}$, 令 $g(x) =$

$\frac{-2 - \ln x}{x}$ ($x > 0$), 则 $g'(x) = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x - (-2 - \ln x)}{x^2}$

$= \frac{1 + \ln x}{x^2}$, ①当 $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$

单调递减; ②当 $x \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) > 0$,

$g(x)$ 单调递增; 所以 $x = \frac{1}{e}$ 时, $g(x)$ 取得极小值

也是最小值, $g\left(\frac{1}{e}\right) = -e$, 所以 $\frac{b}{a}$ 的最小值为 $-$

e . 故选 C.

解法二: 设 $y = ax + b$ 的零点为 $x_1 = -\frac{b}{a}$, $f(x)$

$= \ln x - 1$ 的零点为 $x_2 = e$, 由零点比大小的模

型, 可知 $x_1 \leq x_2$, 所以 $\frac{b}{a} \geq -e$.

2. A 【解析】解法一: 设切点为 (m, n) , 由 $f(x)$

$= x - e^{-x}$ 的导数为 $f'(x) = 1 + e^{-x}$, 可得切线的

斜率为 $k = 1 + e^{-m}$, $km + b = m - e^{-m}$, 即有 $k + b$

$= 1 - me^{-m}$, 由 $g(m) = 1 - me^{-m}$ 的导数为

$g'(m) = (m-1)e^{-m}$, 即有 $m > 1$ 时 $g(m)$ 递增,

$m < 1$ 时, $g(m)$ 递减, 即 $m = 1$ 处 $g(m)$ 取得最

小值, 且为 $1 - \frac{1}{e}$, 显然 $\frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{e}$, 故选 A.

解法二: $k + b$ 为 $y = kx + b$ 在 $x = 1$ 处的取值, 所

以需要构造 $x = 1$ 处的零点. 令 $g(x) = x - e^{-x} +$

m , 由 $g(1) = 0$ 可知, $m = \frac{1}{e} - 1$, 作 $g(x) = x$

$- e^{-x} + m$ 和 $y = kx + b + \frac{1}{e} - 1$ 的图像, 可知

$x_1 = 1 = x_2$ 时相切, 此时 $k + b$ 取最小值 $1 - \frac{1}{e}$,

显然 $\frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{e}$, 所以选 A.

3. C 【解析】解法一: 设切点是 $P(t, f(t))$, 由

$f'(x) = 1 + e^{-x}$, P 是切线斜率 $k = f'(t) = 1 +$

e^{-t} , 所以 P 切线方程为 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$,

整理得 $y = (1 + e^{-t})x - (t+1)e^{-t}$, 所以 $m + n =$

$(1 + e^{-t}) - (t+1)e^{-t} = 1 - \frac{t}{e^t}$, 记 $g(t) = 1 -$

$\frac{t}{e^t}$, 所以 $g'(t) = \frac{t-1}{e^t}$, 当 $t < 1$, $g'(t) < 0$,

$g(t)$ 递减; 当 $t > 1$, $g'(t) > 0$, $g(t)$ 递增; 故

$g(t)_{\min} = g(1) = 1 - \frac{1}{e}$, 即 $m + n$ 的最小值是 1

$- \frac{1}{e}$, 故选 C.

解法二: $m + n$ 为 $y = mx + n$ 在 $x = 1$ 处的取值,

所以需要构造 $x = 1$ 处的零点. 令 $g(x) =$

$x - e^{-x} + t$, 由 $g(1) = 0$ 可知, $t = \frac{1}{e} - 1$, 作

$g(x) = x - e^{-x} + t$ 和 $y = kx + b + \frac{1}{e} - 1$ 的图像,

可知 $x_1 = 1 = x_2$ 时相切, 此时 $m + n$ 取最小值

$1 - \frac{1}{e}$, 故选 C.

4. D 【解析】解法一：令 $f(x) = e^x - ax - b$ ，则 $f'(x) = e^x - a$ ，若 $a < 0$ ，则 $f'(x) > 0$ ，函数 $f(x)$ 单调递增，当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ ，不可能恒有 $f(x) \geq 0$ ；若 $a > 0$ ，由 $f'(x) = e^x - a = 0$ 得，极小值点 $x = \ln a$ ，由 $f(\ln a) = a - a \ln a - b \geq 0$ 得， $b \leq a(1 - \ln a)$ ，则 $\frac{b-2}{a} \leq \frac{a(1 - \ln a) - 2}{a} = 1 - \ln a - \frac{2}{a}$ ，令 $g(a) = 1 - \ln a - \frac{2}{a}$ ，($a > 0$)，则 $g'(a) = -\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} = \frac{2-a}{a^2}$ ，则当 $0 < a < 2$ 时， $g'(a) > 0$ ，当 $a > 2$ 时， $g'(a) < 0$ ，则当 $a = 2$ 时， $g(a)$ 取得极大值，而 $g(2) = 1 - \ln 2 - \frac{2}{2} = -\ln 2$ ，所以 $\frac{b-2}{a}$ 的最大值为 $-\ln 2$ ，故选 D。

解法二：由题意可知， $e^x - 2 \geq ax + b - 2$ ，作 $f(x) = e^x - 2$ 和 $y = ax + b - 2$ 的图像， $f(x)$ 的零点为 $x_1 = \ln 2$ ， $y = ax + b - 2$ 的零点为 $x_2 = -\frac{b-2}{a}$ ，由零点比大小模型可知 $x_2 \geq x_1$ ，所以 $\frac{b-2}{a} \leq -\ln 2$ ，故选 D。

5. D 【解析】解法一：令 $f(x) = e^x - 4x + 2 - ax - b$ ，则 $f'(x) = e^x - (a+4)$ ，若 $a+4 < 0$ ，则 $f'(x) > 0$ ，函数 $f(x)$ 单调递增，当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ ，不可能恒有 $f(x) \geq 0$ ；若 $a+4 > 0$ ，由 $f'(x) = e^x - (a+4) = 0$ 得，极小值点 $x = \ln(a+4)$ ，由 $f[\ln(a+4)] = a+4 - (a+4)\ln(a+4) - b \geq 0$ 得， $b \leq (a+4)[1 - \ln(a+4)]$ ，则 $\frac{b-4}{a+4} \leq \frac{(a+4)[1 - \ln(a+4)] - 4}{a+4} = 1 - \ln(a+4) - \frac{4}{a+4}$ ，令 $g(a) = 1 - \ln(a+4) - \frac{2}{a+4}$ ，($a > -4$)，则 $g'(a) = -\frac{1}{a+4} + \frac{2}{(a+4)^2} = \frac{-a-2}{(a+4)^2}$ ，则当 $-4 < a < -2$ 时， $g'(a) > 0$ ，当 $a > -2$ 时，

$g'(a) < 0$ ，则当 $a = -2$ 时， $g(a)$ 取得极大值，而 $g(-2) = 1 - \ln 2 - \frac{2}{2} = -\ln 2$ ，所以 $\frac{b-4}{a+4}$ 的最大值为 $-\ln 2$ ，故选 D。

解法二：由题意可变形为， $e^x - 2 \geq (a+4)x + b - 4$ ，作 $f(x) = e^x - 2$ 和 $y = (a+4)x + b - 4$ 的图像， $f(x)$ 的零点为 $x_1 = \ln 2$ ， $y = (a+4)x + b - 4$ 的零点为 $x_2 = -\frac{b-4}{a+4}$ ，由零点比大小模型可知 $x_2 \geq x_1$ ，所以 $\frac{b-4}{a+4} \leq -\ln 2$ 。

6. C 【解析】解法一：设 $f(x) = e^x - \ln x$ ，则只考虑 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值，小于此值的最大整数 a 即为所求，则 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$ ， $f''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$ ，所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，因为 $f(1) = e - 1 > 0$ ， $f(\frac{1}{2}) = e^{0.5} - 2 < 0$ ，所以 $\exists x_0, \frac{1}{2} < x_0 < 1$ 满足 $f'(x_0) = e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$ ，此时有 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$ ， $x_0 = -\ln x_0$ ，因为 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $f'(x_0) = 0$ ，所以 $0 < x < x_0$ 时 $f'(x) < 0$ ， $x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$ ，所以 $0 < x < x_0$ 时 $f(x)$ 单调递减， $x > x_0$ 时 $f(x)$ 单调递增，所以 $f(x)$ 的极小值在 $x = x_0$ 处取到，也是最小值， $f(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 = \frac{1}{x_0} + x_0 \geq 2$ ，当且仅当 $\frac{1}{x_0} = x_0$ 即 $x_0 = 1$ 时取等号，因为 $\frac{1}{2} < x_0 < 1$ ，所以等号无法取到，所以 $f(x_0) > 2$ ，所以 $f(x)$ 的最小值落在 $(2, \frac{5}{2})$ 上，所以 $a < f(x)$ ，所以 $a \leq 2$ ，故整数 a 的最大取值为 2。故选 C。

解法二：由题意可知， $e^x - a > \ln x$ ，令 $f(x) = e^x - a$ ， $g(x) = \ln x$ ，则 $f(x)$ 的零点 $x_1 = \ln a$ ， $g(x)$ 的零点为 $x_2 = 1$ ，由零点比大小模型可知 $\ln a <$

1, 则 $0 < a < e$.

7. A 【解析】解法一: 实数 $\lambda > 0$, 若对任意的 $x \in$

$(0, +\infty)$, 不等式 $e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0$ 恒成立, 即为

$\left(e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda}\right)_{\min} \geq 0$, 设 $f(x) = e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda}$, $x > 0$,

$f'(x) = \lambda e^{\lambda x} - \frac{1}{\lambda x}$, 令 $f'(x) = 0$, 可得 $e^{\lambda x} = \frac{1}{\lambda^2 x}$,

由指数函数和反函数在第一象限的图像, 可得 $y =$

$e^{\lambda x}$ 和 $y = \frac{1}{\lambda^2 x}$ 有且只有一个交点, 设为 (m, n) , 当

$x > m$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增; 当 $0 < x < m$ 时,

$f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减. 即有 $f(x)$ 在 $x = m$ 处取得极

小值, 且为最小值. 即有 $e^{\lambda m} = \frac{1}{\lambda^2 m}$, 令 $e^{\lambda m} - \frac{\ln m}{\lambda}$

$= 0$, 可得 $m = e$, $\lambda = \frac{1}{e}$. 则当 $\lambda \geq \frac{1}{e}$ 时, 不等式

$e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0$ 恒成立. 则 λ 的最小值为 $\frac{1}{e}$.

解法二: 由于 $y = e^{\lambda x}$ 与 $y = \frac{\ln x}{\lambda}$ 互为反函数, 故图

像关于 $y = x$ 对称, 考虑极限情况, $y = x$ 恰为这

两个函数的公切线, 此时斜率 $k = 1$, 再用导数

求得切线斜率的表达式为 $k = \frac{1}{\lambda e}$, 即可得 λ 的

8. A 【解析】解法一: 由 $f(x) = 0$ 得 $a^x = \log_a x$,

设函数 $f(x) = a^x$ 与 $g(x) = \log_a x$, 则两个函数关

于 $y = x$ 对称, 只需要讨论与 $y = x$ 有两个解即

可, 令 $h(x) = a^x - x$, 则函数 $h(x)$ 有两个零点,

当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $h(x)$ 为减函数, 至多有一

个零点, 不满足要求, 当 $a > 1$ 时, 令 $h'(x) =$

$a^x \ln a - 1 = 0$, 则 $x = \log_a \frac{1}{\ln a}$, 当 $0 < x < \log_a \frac{1}{\ln a}$

时, $h'(x) < 0$, 此时函数 $h(x)$ 为减函数; 当 x

$> \log_a \frac{1}{\ln a}$ 时, $h'(x) > 0$, 此时函数 $h(x)$ 为增函

数; 故当 $x = \log_a \frac{1}{\ln a}$ 时, 函数 $h(x)$ 取最小值,

若函数 $h(x)$ 有两个零点, 则 $h\left(\log_a \frac{1}{\ln a}\right) < 0$,

即 $a^{\log_a \frac{1}{\ln a}} < \log_a \frac{1}{\ln a}$, 即 $\frac{1}{\ln a} = \log_a e < \log_a \frac{1}{\ln a}$, 即 e

$< \frac{1}{\ln a}$, 即 $0 < \ln a < \frac{1}{e}$, 即 $1 < a < e^{\frac{1}{e}}$, 故实数 a

的取值范围是 $(1, e^{\frac{1}{e}})$, 故选 A.

解法二: 参考例 12(法一)

9. D 【解析】解法一: 由题意可知, $a(3x - 2) \leq$

$6x^2 \cdot e^x$, 当 $3x - 2 > 0$ 时, 即 $x > \frac{2}{3}$ 时, $a \leq$

$\frac{6x^2 \cdot e^x}{3x - 2}$, 设 $g(x) = \frac{6x^2 \cdot e^x}{3x - 2}$, $x > \frac{2}{3}$, $g'(x) = 6$

$\times \frac{(2xe^x + x^2 e^x)(3x - 2) - 3x^2 e^x}{(3x - 2)^2} = 6 \times \frac{xe^x(3x^2 + x - 4)}{(3x - 2)^2}$

$= 6xe^x \times \frac{(3x + 4)(x - 1)}{(3x - 2)^2}$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x =$

1, 所以函数 $g(x)$ 在 $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$ 上单调递减, 在

$(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(1) =$

$6e$, 所以 $a \leq 6e$; 当 $3x - 2 < 0$ 时, 即 $x < \frac{2}{3}$ 时,

$a \geq \frac{6x^2 \cdot e^x}{3x - 2}$, 由 $g'(x) = 6xe^x \times \frac{(3x + 4)(x - 1)}{(3x - 2)^2}$,

令 $g'(x) = 0$, 得 $x = -\frac{4}{3}$ 或 $x = 0$, 所以函数

$g(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{4}{3}\right)$ 和 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ 上单调递减,

在 $\left(-\frac{4}{3}, 0\right)$ 上单调递增, 所以 $g(x)_{\max} = g(0) =$

0 , 所以 $a \geq 0$, 当 $x = \frac{2}{3}$ 时, $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{3} e^{\frac{2}{3}} >$

0 恒成立, 综上所述 a 的取值范围是 $[0, 6e]$,

故最大值为 $6e$, 故选 D

解法二: 由题意可知, $6x^2 e^x \geq 3ax - 2a$, 所以

$6e^x \geq \frac{3ax - 2a}{x^2}$, 两边同时取对数, 可得 $\ln 6 + x \geq$

$\ln a + \ln \frac{3x-2}{x^2}$, 即 $\ln \frac{6}{a} + x \geq \ln \frac{3x-2}{x^2}$, 令 $y = \ln \frac{6}{a} + x$, 其零点为 $x_1 = \ln \frac{a}{6}$, $f(x) = \ln \frac{3x-2}{x^2}$, 其零点为 $x_2 = 1$, 由零点比大小模型 $x_1 \leq x_2$, 所以 $a \leq 6e$, 故最大值为 $6e$, 故选 D.

10. D 【解析】解法一: 因为函数 $f(x) = \ln x + (2e^2 - a)x - \frac{b}{2}$, 其中 e 为自然对数的底数, 所以 $f'(x) = \frac{1}{x} + (2e^2 - a)$, $x > 0$, ①当 $a \leq 2e^2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $f(x) \leq 0$ 不可能恒成立; ②当 $a > 2e^2$ 时, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a-2e^2}$, 因为不等式 $f(x) \leq 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 的最大值为 0, 当 $x \in (0, \frac{1}{a-2e^2})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (\frac{1}{a-2e^2}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 所以当 $x = \frac{1}{a-2e^2}$ 时, $f(x)$ 取最大值, $f(\frac{2}{a-2e^2}) = -\ln(a-2e^2) - \frac{1}{2}b - 1 \leq 0$, 所以 $\ln(a-2e^2) + \frac{1}{2}b + 1 \geq 0$, 所以 $\frac{1}{2}b \geq -1 - \ln(a-2e^2)$, 因为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a} \geq \frac{-1 - \ln(a-2e^2)}{a}$ ($a > 2e^2$), 令 $F(x) = \frac{-1 - \ln(x-2e^2)}{x}$ ($x > 2e^2$), $F'(x) = \frac{-\frac{x}{x-2e^2} + 1 + \ln(x-2e^2)}{x^2} = \frac{(x-2e^2)\ln(x-2e^2) - 2e^2}{(x-2e^2)^2}$, 令 $H(x) = (x-2e^2)\ln(x-2e^2) - 2e^2$, $H'(x) = \ln(x-2e^2) + 1$, 由 $H'(x) = 0$, 得 $x = 2e^2 + \frac{1}{e}$, 当 $x \in (2e^2 + \frac{1}{e}, +\infty)$ 时, $H'(x) > 0$, $H(x)$ 是增函

数, 当 $x \in (2e^2, 2e^2 + \frac{1}{e})$ 时, $H'(x) < 0$, $H(x)$ 是减函数, 所以当 $x = 2e^2 + \frac{1}{e}$ 时, $H(x)$ 取最小值, $H(2e^2 + \frac{1}{e}) = -2e^2 - \frac{1}{e}$, 因为 $x \rightarrow 2e^2$ 时, $H(x) > 0$, $x > 3e^2$ 时, $H(3e^2) = 0$, 所以当 $x \in (2e^2, 3e^2)$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 是减函数, 当 $x \in (3e^2, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 是增函数, 所以 $x = 3e^2$ 时, $F(x)$ 取最小值.

$F(3e^2) = \frac{-1-2}{3e^2} = -\frac{1}{e^2}$, 所以 $\frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a}$ 的最小值为 $-\frac{1}{e^2}$, 即有 $\frac{b}{a}$ 的最小值为 $-\frac{2}{e^2}$. 故选 B.

解法二: 由题意可知 $\ln x + 2e^2x \leq ax + \frac{b}{2}$, 令 $g(x) = \ln x + 2e^2x$, 其零点为 $x_1 = \frac{1}{e^2}$, 令 $y = ax + \frac{b}{2}$, 其零点为 $x_2 = -\frac{b}{2a}$, 由零点比大小模型可知 $x_2 \leq x_1$, 即 $\frac{b}{2a} \geq -\frac{1}{e^2}$, 所以 $\frac{b}{a} \geq -\frac{2}{e^2}$, 故选 B.

11. A 【解析】解法一: 因为 $\log_2 x - k \cdot 2^{kx} \geq 0 \Rightarrow \log_2 x \geq k \cdot 2^{kx} \Rightarrow \log_2 x \geq kx \cdot 2^{kx} \Rightarrow 2^{\log_2 x} \log_2 x \geq kx \cdot 2^{kx}$. 显然 $\log_2 x > 0 \Rightarrow x > 1$, 令 $f(x) = x \cdot 2^x$, 显然 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 所以 $f(\log_2 x) \geq f(kx) \Rightarrow \log_2 x \geq kx$ 所以 $k \leq \frac{\log_2 x}{x}$ 因为存在正实数 x , 使得不等式 $\log_2 x - k \cdot 2^{kx} \geq 0$ 成立, 故所以 $k \leq \left(\frac{\log_2 x}{x}\right)_{\max}$, 令 $g(x) = \frac{\log_2 x}{x} = \frac{\ln x}{x \ln 2}$, $g'(x) = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $1 < x < e$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x > e$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 故 $g(x)_{\max} = g(e) = \frac{1}{e} \log_2 e$, 故选 A.

解法二：由题意可知， $\log_2 x \geq k \cdot 2^{kx}$ ，所以
 $\log_2(\log_2 x) \geq \log_2 k + kx$ ，则 $x_1 = 2$ ， $x_2 =$
 $-\frac{\log_2 k}{k}$ ，由零点比大小模型，存在 $k > 0$ 使得
 $x_2 \leq x_1$ ，即存在 $k > 0$ 使得 $-\frac{\log_2 k}{k} < 2$ ，所以 $k \leq$
 $\frac{1}{e} \log_2 e$ ，故选 A.

12. A 【解析】解法一：不等式 $e^{2\lambda x} - \frac{\ln x}{2\lambda} \geq 0$ 恒成立，故只需 $\forall x \in (0, +\infty)$ ，不等式 $2\lambda e^{2\lambda x} \geq \ln x$ 恒成立，即 $\ln 2\lambda + 2\lambda x \geq \ln(\ln x)$ ，所以 $x_1 = e$ ， $x_2 = -\frac{\ln 2\lambda}{2\lambda}$ ，由于函数为凸函数，根据零点比大小模型可知： $-\frac{\ln 2\lambda}{2\lambda} \leq e$ ，即 $\ln 2\lambda + 2e\lambda \geq 0$ ，由于 $f(\lambda) = 2e\lambda + \ln 2\lambda$ 为增函数，且 $f\left(\frac{1}{2e}\right) = 0$ ，所以 $\lambda \geq \frac{1}{2e}$ ，故选 A.

解法二：由于 $y = e^{2\lambda x}$ 与 $y = \frac{\ln x}{2\lambda}$ 互为反函数，故图像关于 $y = x$ 对称，根据 $a^x \geq \log_a x$ 恒成立条件可知 $a \geq e^{\frac{1}{e}}$ ，即 $e^{2\lambda} \geq e^{\frac{1}{e}}$ 可得 λ 的最小值为 $\frac{1}{2e}$ ，故选 A.

13. C 【解析】曲线 $y = e^x + x$ 的导数为 $y' = e^x + 1 > 1$ ，可知 $k > 1$ ；直线： $l: y = kx + b$ 在 y 轴上的截距为 b ，曲线 $y = e^x + x$ ， $x = 0$ 时， $y_{\min} = 1$ ，可知 $b \leq 1$ ，故选 C.
14. D 【解析】因为 $2ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{a}$ ，所以 $\ln 2a + 2x \geq \ln\left(\ln \frac{x}{a}\right)$ ， $x_1 = -\frac{\ln 2a}{2}$ ， $x_2 = ae$ ，由零点比大小模型可知 $x_2 \geq x_1$ ，所以 $ae \geq -\frac{\ln 2a}{2}$ ，即 $e \geq -\frac{\ln 2a}{2a}$ ，所以 $2a \geq \frac{1}{e}$ ， $a \geq \frac{1}{2e}$ ，故选 D.
15. 【解析】因为函数 $f(x) = \ln x + (e-a)x - b$ ，其

中 e 为自然对数的底数，所以 $f'(x) = \frac{1}{x} + e - a$ ， $x > 0$ ，当 $a \leq e$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，所以 $f(x) \leq 0$ 不可能恒成立；当 $a > e$ 时，由 $f'(x) = \frac{1}{x} + e - a = 0$ ，得， $x = \frac{1}{a-e}$ ，因为不等式 $f(x) \leq 0$ 恒成立，所以 $f(x)$ 的最大值为 0，当 $x \in \left(0, \frac{1}{a-e}\right)$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；当 $x \in \left(\frac{1}{a-e}, +\infty\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；所以当 $x = \frac{1}{a-e}$ 时， $f(x)$ 取最大值， $f\left(\frac{1}{a-e}\right) = -\ln(a-e) - b - 1 \leq 0$ ，所以 $\ln(a-e) + b + 1 \geq 0$ ，所以 $b \geq -1 - \ln(a-e)$ ，所以 $\frac{b}{a} \geq \frac{-1 - \ln(a-e)}{a}$ ($a > e$)，令 $F(x) = \frac{-1 - \ln(x-e)}{x}$ ， $x > e$ ， $F'(x) = \frac{-\frac{1}{x-e}x + 1 + \ln(x-e)}{x^2} = \frac{(x-e)\ln(x-e) - e}{(x-e)x^2}$ ，令 $H(x) = (x-e)\ln(x-e) - e$ ， $H'(x) = \ln(x-e) + 1$ ，由 $H'(x) = 0$ ，得 $x = e + \frac{1}{e}$ ，当 $x \in \left(e + \frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时， $H'(x) > 0$ ， $H(x)$ 是增函数；当 $x \in \left(e, e + \frac{1}{e}\right)$ 时， $H'(x) < 0$ ， $H(x)$ 是减函数；所以当 $x = e + \frac{1}{e}$ 时， $H(x)$ 取最小值， $H\left(e + \frac{1}{e}\right) = -e - \frac{1}{e}$ ，因为 $x \rightarrow e$ 时， $H(x) \rightarrow 0$ ， $x > 2e$ 时， $H(x) > 0$ ， $H(2e) = 0$ ，所以当 $x \in (e, 2e)$ 时， $F'(x) < 0$ ， $F(x)$ 是减函数；当 $x \in (2e, +\infty)$ 时， $F'(x) > 0$ ， $F(x)$ 是增函数；所以 $x = 2e$ 时， $F(x)$ 取最小值， $F(2e) = \frac{-1-1}{2e} = -\frac{1}{e}$ ，所以 $\frac{b}{a}$ 的最小值为 $-\frac{1}{e}$ 。破

解法：原式可化为 $\ln x + ex \leq ax + b$ ，则 $x_1 = \frac{1}{e}$ ， $x_2 = -\frac{b}{a}$ ，由零点比大小模型可得： $x_1 \geq x_2$ ，即 $\frac{1}{e} \geq -\frac{b}{a}$ ，所以 $\frac{b}{a} \leq -\frac{1}{e}$ ，故答案为 $-\frac{1}{e}$ 。

16. 【解析】解法一：因为 $k > 0$ ， $b > 0$ ，且 $kx + b \geq \ln(x + 4)$ ，令 $f(x) = \ln(x + 4) - kx - b$ ，则 $f'(x) = \frac{1}{x+4} - k$ 。令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = \frac{1}{k} - 4$ ， $x > -4$ ，所以 $f(x)_{\max} = \ln\left(\frac{1}{k} - 4 + 4\right) - k\left(\frac{1}{k} - 4\right) - b$ ，即 $\ln\left(\frac{1}{k}\right) - (1 - 4k) - b = 0$ ，所以 $b = -\ln k - 1 + 4k$ ，所以 $\frac{b}{k} = \frac{4k - 1 - \ln k}{k} = 4 - \frac{1 + \ln k}{k}$ ，令 $g(k) = \frac{1 + \ln k}{k}$ ，则 $g'(k) = \frac{1 - \ln k}{k^2} (k > 0)$ ，当 $0 < k < 1$ 时， $g'(k) > 0$ ， $g(k)$ 单调递增，当 $k > 1$ 时， $g'(k) < 0$ ， $g(k)$ 单调递减，所以 $k = 1$ 时， $g(k)$ 取最大值， $g(k)_{\max} = 1$ ，所以 $\frac{b}{k} = 4 - \frac{1 + \ln k}{k}$ 的最小值为 $4 - 1 = 3$ ，即 $\frac{b}{k}$ 的最小值为 3。

解法二：由题意可知， $x_1 = -\frac{b}{k}$ ， $x_2 = -3$ ，由零点比大小模型可知 $x_1 \leq x_2$ ，即 $-\frac{b}{k} \leq -3$ ，所以 $\frac{b}{k} \geq 3$ 。

17. 【解析】解法一：令 $y = \ln(x + 1) - ax - b - 1$ ，则 $y' = \frac{1}{x+1} - a$ ，若 $a \leq 0$ ，则 $y' > 0$ 恒成立， $x > -1$ 时函数递增，无最值。若 $a > 0$ ，由 $y' = 0$ 得： $x = \frac{1-a}{a}$ ，当 $-1 < x < \frac{1-a}{a}$ 时， $y' > 0$ ，函数递增；当 $x > \frac{1-a}{a}$ 时， $y' < 0$ ，函数递减。

则 $x = \frac{1-a}{a}$ 处取得极大值，也为最大值 $-\ln a + a - b - 2$ ，所以 $-\ln a + a - b - 2 \leq 0$ ，所以 $b \geq -\ln a + a - 2$ ，所以 $\frac{b}{a} \geq 1 - \frac{\ln a}{a} - \frac{2}{a}$ ，令 $t = 1 - \frac{\ln a}{a} - \frac{2}{a}$ ，所以 $t' = \frac{1 + \ln a}{a^2}$ ，所以 $(0, e^{-1})$ 上， $t' < 0$ ， $(e^{-1}, +\infty)$ 上， $t' > 0$ ，所以 $a = e^{-1}$ ， $t_{\min} = 1 - e$ 。所以 $\frac{b}{a}$ 的最小值为 $1 - e$ 。

解法二：由题意可知， $x_1 = e - 1$ ， $x_2 = -\frac{b}{a}$ ，由零点比大小模型可知 $x_1 \geq x_2$ ，即 $-\frac{b}{a} \leq e - 1$ ，所以 $\frac{b}{a} \geq 1 - e$ 。

18. 【解析】解法一：设切点 $P(x_0, \ln x_0)$ ，则 $k = f'(x_0) = \frac{1}{x_0}$ ，切线方程为 $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$ ，即 $y = \frac{1}{x_0}x + \ln x_0 - 1$ ，所以 $k = \frac{1}{x_0}$ ， $b = \ln x_0 - 1$ ，令 $g(x_0) = k + b = \frac{1}{x_0} + \ln x_0 - 1 (x_0 > 0)$ ，则 $g'(x_0) = \frac{x_0 - 1}{x_0^2}$ ，由 $g'(x_0) = 0$ 解得 $x_0 = 1$ ， $x_0 < 1$ 时， $g'(x_0) < 0$ ， $x_0 > 1$ 时， $g'(x_0) > 0$ ，故 $x_0 = 1$ 时， $g(x_0)$ 取最小值，此时 $g(1) = 0$ ，即 $k + b$ 的最小值为 0。

解法二： $k + b$ 是 $y = kx + b$ 在 $x = 1$ 处的值，所以设 $g(x) = \ln x + m$ ，由 $g(1) = 0$ 得， $m = 0$ ，所以 $k + b$ 取得最小值时， $y = kx + b + m$ 过 $(1, 0)$ ，所以 $(k + b)_{\min} = 0$ 。

19. 【解析】在平面直角坐标系 xOy 中，分别作出 $y = \ln x$ 及 $y = a(x - 2) + b$ 的图像，不等式 $\ln x \leq a(x - 2) + b$ 对一切正实数 x 恒成立，即直线 $y = a(x - 2) + b$ 恒在曲线 $y = \ln x$ 的上方。由零点比大小原理， $a + b$ 最小时，直线 $y = a(x - 2) + b$ 与 $x = 3$ 交点的纵坐标最小。根据图像可

知: $a+b$ 的最小值为 $\ln 3$, 此时直线 $y = a(x-2) + b$ 与曲线 $y = \ln x$ 相切于点 $(3, \ln 3)$, 因此有: $a = \frac{1}{3}$, 从而 $b = \ln 3 - \frac{1}{3}$.

20. 【解析】 $y = \ln(2x-1)$ 的零点 $x_1 = 1$, 当 $a \geq 0$ 时, 上式恒成立, 当 $a < 0$ 时, $y = x^2 + a$ 的零点为 $x_2 = \sqrt{-a}$, 由零点比大小模型 $x_1 \geq x_2$, 解得 $-1 \leq a < 0$, 综上, a 的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

21. 【解析】设切点为 (m, n) , $y = \ln x$ 的导数为 $y' = \frac{1}{x}$, 一条切线为 $y = e(x-a) + b (a > 0, b > 0)$, 则有

$$\begin{cases} \frac{1}{m} = e \\ \ln m = e(m-a) + b \end{cases} \Rightarrow m = \frac{1}{e}$$

$b = -1 - e\left(\frac{1}{e} - a\right) = -2 + ea$, 因为 $b > 0$, 所以 $a > \frac{2}{e}$. 则 a 的取值范围是 $\left(\frac{2}{e}, +\infty\right)$, 故答案为 $\left(\frac{2}{e}, +\infty\right)$.

22. 【解析】若 $a \leq 0$, 显然 $f(x)$ 单调递增, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) < 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 有且仅有一个零点, 满足题意; 若 $a > 0$, 由 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ 可知, 当 $a = 1$ 时, $y = 1 - \frac{1}{x}$ 与 $y = \ln x$ 相切, 此时 $f(x)$ 仅有一个零点. 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 0] \cup \{1\}$.

23. 【解析】(1) 因为函数 $f(x)$ 的图像与函数 $g(x)$

$$\text{的图像相切于 } x = \frac{1}{e} \text{ 处, 所以 } \begin{cases} h\left(\frac{1}{e}\right) = g\left(\frac{1}{e}\right) \\ f'\left(\frac{1}{e}\right) = a - e \end{cases},$$

$$\begin{cases} \frac{a}{e} + 2b = 0 \\ e = a - e \end{cases}, \text{ 所以 } a = 2e, b = -1;$$

(2) 令 $h(x) = f(x) - g(x) = \ln x - (a-e)x + a$

$-e$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} + e - a$, 当 $a \leq e$ 时, $h(x)$ 单调递增, 而 $h(1) = 0$, 所以 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, 不合题意; 当 $a > e$ 时, 令 $h'(x) = 0$, 则 $x = \frac{1}{a-e}$, 因为 $h'(x)$ 为减函数, 所以 $x \in \left(0, \frac{1}{a-e}\right)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增, $x \in \left(\frac{1}{a-e}, +\infty\right)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减, 所以 $h(x)_{\max} = h\left(\frac{1}{a-e}\right) = -\ln(a-e) - 1 - (e-a) \leq 0$, 即 $\ln(a-e) \geq (a-e) - 1$ (*). 但 $\forall x > 0, \ln x \leq x - 1$, 等号成立当且仅当且 $x = 1$. 故 (*) 式成立只能 $a = e + 1$, 即 $a = e + 1$.

24. 【解析】(1) $\lambda = 1$ 时, $g(x) = e^x - x$, $g'(x) = e^x - 1$, 令 $g'(x) < 0$, 解得: $x < 0$, 令 $g'(x) > 0$, 解得: $x > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 递减, 在 $(0, +\infty)$ 递增, 故 $g(x)$ 无极大值, 极小值是 $g(0) = 1$;

(2) 当 $0 < x \leq 1$ 时, 易知不等式 $e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0$ 恒成立, $x > 1$ 时, 由题设得不等式 $\lambda e^{\lambda x} \geq \ln x$, 即 $\lambda x e^{\lambda x} \geq \ln x \cdot e^{\ln x}$ (*) 恒成立, 设 $\varphi(t) = t e^t (t > 0)$, 则由 $\varphi'(t) = e^t(1+t) > 0$, 知 $\varphi(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增, 于是, $x > 1$ 时, 由 (*) 知 $\varphi(\lambda x) \geq \varphi(\ln x)$, 即 $\lambda \geq \frac{\ln x}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 恒成立, 故所求 λ 的最小值即为函数 $p(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 1)$ 的最大值, 因为 $p'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 故 $1 < x < e$ 时, $p'(x) > 0$, $p(x)$ 递增, $x > e$ 时, $p'(x) < 0$, 函数 $p(x)$ 递减, 综上, $\lambda_{\min} = p(x)_{\max} = p(e) = \frac{1}{e}$.

25. 【解析】(1) 因为 $a = e - 2b$, 所以 $f(x) = \ln x + (e - a)x - 2b = \ln x + 2bx - 2b$. $f'(x) = \frac{1}{x} + 2b = \frac{2bx + 1}{x}$, 若 $b \geq 0$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 不满足题意; 若 $b < 0$, 则当 $x \in (0, -\frac{1}{2b})$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (-\frac{1}{2b}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{2b})$ 上单调递增, 在 $(-\frac{1}{2b}, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 的极大值也是最大值为 $f(-\frac{1}{2b}) = \ln(-\frac{1}{2b}) - 1 - 2b$. 因为 $f(x) \geq 0$ 有唯一解, 所以 $f(-\frac{1}{2b}) = \ln(-\frac{1}{2b}) - 1 - 2b = 0$, 即 $b = -\frac{1}{2}$;
- (2) 略, 参考例 2 的常规方法部分.

专题 6 指对跨阶系列一之改头换面分而治之

◀◀◀ 达标训练

1. A 【解析】 $f(e^x) = ax - 2e^x$, 所以 $f(x+1) > ax - 2e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 等价于 $f(x+1) > f(e^x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 属于同构式, 因为 $x \in (0, +\infty)$ 时, $1 < x+1 < e^x$, 所以只需 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 即 $x > 1$, $f'(x) \leq 0$ 恒成立, 即 $x > 1$ 时, $\frac{a}{x} \leq 2$ 恒成立, $a \leq 2x$, 所以 $a \leq 2$, 故选 A.
2. A 【解析】因为 $f(x) = e^{x-\ln x} - k(x - \ln x)$, 当 $x=1$ 是唯一极值点时, 故可知是极小值点, $x - \ln x = 1$, 即 $e^t - kt$ 取得极值时, $t=1$, 故考虑到 $e^t \geq et$ 的条件, 故 $k \leq e$.
3. 【解析】因为 $g(x) = x - \ln(x+m)$ 的保值区间是 $[2, +\infty)$, 所以 $x - \ln(x+m) \geq x - (x-m-1)$

$= 1 - m = 2 \Rightarrow m = -1$, 当且仅当 $x=2$ 时等号成立, 故答案为 -1 .

4. 【解析】 $f(x) = e^x - \frac{\ln x + 1}{x} = \frac{e^{x+\ln x} - (\ln x + 1)}{x} \geq \frac{x + \ln x + 1 - (\ln x + 1)}{x} = 1$, 取等条件为 $x + \ln x = 0$, 故答案为 1.
5. 【解析】 $f(x) = \frac{x+1 + \ln x - e^{x+\ln x}}{e^x} \leq \frac{x+1 + \ln x - (x + \ln x + 1)}{e^x} = 0$, 取等条件为 $x + \ln x = 0$, 故答案为 0.
6. 【解析】 $f(x) = \frac{e^{x+2\ln x} - 2\ln x}{x+1} \geq \frac{x+2\ln x + 1 - 2\ln x}{x+1} = 1$, 取等条件为 $x + 2\ln x = 0$, 故答案为 1.
7. 【解析】 $xe^x - x - a(\ln x + 1) = e^{x+\ln x} - x - a(\ln x + 1) \geq x + \ln x + 1 - x - a(\ln x + 1) = (1-a)(\ln x + 1) \geq 0$. 故 $a \leq 1$, 取等条件为 $x + \ln x = 0$, 其实数解在区间 $(\frac{1}{e}, 1)$ 内, 符合要求, 所以 $a \leq 1$, 故答案为 1.
8. 【解析】此题可以转化为 $axe^x - x - \ln x = 0$ 有唯一解, $a \leq 0$ 时显然有唯一零点, 当 $a > 0$ 时, 根据 $e^x \geq ex$ 可知, $axe^x - x - \ln x = ae^{x+\ln x} - x - \ln x \geq (ae-1)(x + \ln x) = 0$, 当且仅当 $a = \frac{1}{e}$ 时等号成立, 此时有唯一零点, 故 $a = \frac{1}{e}$ 或者 $a \leq 0$, 故答案为 $a = \frac{1}{e}$ 或者 $a \leq 0$.
9. 【解析】 $f(x) = e^{x-\ln x} - a(x + \ln x)$. 构造函数 $g(x) = x + \ln x$, 显然该函数单调递增, 对于任意的实数 t , 当 $x > 1$ 且 $x > t$ 时, 有 $g(x) > t$; 当 $0 < x < 1$ 且 $0 < x < e^{t-1}$ 时, 有 $g(x) < t$. 故对任意实数 t , 方程 $f(x) = t$ 都有唯一实数解. (解答题务必说明 $x + \ln x$ 的值与 x 的值一一对应) 从而 $f(x) = e^{x+\ln x} - a(x + \ln x)$ 有两个零点等价于

$h(t) = e^t - at$ 有两个零点, 易知实数 a 的取值范围是 $(e, +\infty)$ (后面是简单的零点问题, 过程略去了), 故答案为 $(e, +\infty)$.

10. ②③

11. 【解析】因为 $e^x \geq ex$, 等号当 $x=1$ 时取得, 又因为 $x \geq \ln x + 1$, 等号当 $x=1$ 时取得; 两边同乘以 $\frac{e}{x}$ 得: $\frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x} \geq e(x-\ln x) \Rightarrow e^{x-1} \geq x^2 - x \ln x$, 当仅当 $x - \ln x = 1$, 即 $x=1$ 时取得, 又 $x > 1$, 故 $e^{x-1} > x^2 - x \ln x$.

12. 【解析】(1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 所以 $f'(x) = 2 - \frac{a}{x} = \frac{2x-a}{x}$, 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 当 $a > 0$, 则当 $0 < x < \frac{a}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{a}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{a}{2})$ 上为减函数, 在 $(\frac{a}{2}, +\infty)$ 上为增函数, 综上可得, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \frac{a}{2})$ 上为减函数, 在 $(\frac{a}{2}, +\infty)$ 上为增函数;

(2) 证明 $a=2$ 时, 令 $h(x) = g(x) - f(x) = \frac{e^x}{x} - 2x + 2\ln x, x > 0$.

解法一: 所以 $h'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} - 2 + \frac{2}{x} = \frac{e^x(x-1) - 2x(x-1)}{x^2} = \frac{(e^x - 2x)(x-1)}{x^2}$, 令 $m(x) = e^x - 2x, (x > 0)$, 得 $m'(x) = e^x - 2$, 当 $0 < x < \ln 2$ 时, $m'(x) < 0$, $m(x)$ 单调递减, 当 $x > \ln 2$ 时, $m'(x) > 0$, $m(x)$ 单调递增, 所以 $m(x) \geq m(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$, 所以 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减, $x \in (1,$

$+\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增, 所以当 $x=1$ 时, $h(x)$ 的取最小值 $h(1) = e - 2 > 0$, 所以当 $a=2$ 时, $g(x) > f(x)$.

解法二: $h(x) = g(x) - f(x) = \frac{e^x}{x} - 2x + 2\ln x = e^{x-\ln x} - 2(x-\ln x)$, 令 $x - \ln x = t, h(t) = e^t - 2t \geq (e-2)t > 0$, 等号为 $t = x - \ln x = 1$, 当仅当 $x = 1$ 时等号成立.

注意: 构造 $x - \ln x = t$, 一定要说明 x 与 t 是一一对应的关系.

13. 【解析】思路分析: (1) 求出 $f(x)$ 的导数, 求得切线的斜率, 解方程可得 m ;

(2) 求出函数 $h(x)$ 的表达式, 将函数有两个零点转化为方程有两个根, 构造函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ 转化为两个函数的交点个数问题进行求解即可;

(3) $f(x) > g(x) - x^3$ 即为 $e^{x+m} > \ln(x+1) + 2$. 采用改头换面法, 由函数 $y = e^x - x - 1$, 求得最小值, 可得 $e^x \geq x + 1$, 则 $e^{x+m} > x + m + 1$, 再由 $h(x) = x + m + 1 - \ln(x+1) - 2 = x + m - \ln(x+1) - 1$, 求出导数, 求得最小值, 由条件即可得证.

(1) 因为 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, 所以 $f'(x) = e^{x+m} - 3x^2$. 因为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 1, 所以 $f'(0) = e^m = 1$, 解得 $m = 0$;

(2) 若 $h(x) = g(x-1) - ax - 2 = \ln x + 2 - ax - 2 = \ln x - ax$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个零点, 等价于 $\ln x - ax = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个不同的根, 即 $a = \frac{\ln x}{x}$, 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则函数的导数 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 由 $g'(x) > 0$ 得 $0 < x < e$, 由 $g'(x) < 0$, 得 $x > e$, 即当 $x = e$ 时, 函数 $g(x)$ 取得极大值 $g(e) = \frac{1}{e}$, 又 $g(x)$ 有且只有一个零点 1, 当 x

$\rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$, 则要使 $a = \frac{\ln x}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上有两个不同的根, 则 $0 < a < \frac{1}{e}$;

(3) 证明: $f(x) > g(x) - x^3$ 即为 $e^{x+m} > \ln(x+1) + 2$. 由 $y = e^x - x - 1$ 的导数为 $y' = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $y' > 0$, 函数递增; 当 $x < 0$ 时, $y' < 0$, 函数递减. 即有 $x = 0$ 处取得极小值, 也为最小值 0. 即有 $e^x \geq x + 1$, 则 $e^{x+m} \geq x + m + 1$, 由 $h(x) = x + m + 1 - \ln(x+1) - 2 = x + m - \ln(x+1) - 1$, $h'(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$, 当 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增; $-1 < x < 0$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减. 即有 $x = 0$ 处取得最小值, 且为 $m - 1$, 当 $m \geq 1$ 时, 即有 $h(x) \geq m - 1 \geq 0$, 即 $x + m + 1 \geq \ln(x+1) + 2$, 则有 $f(x) > g(x) - x^3$ 成立.

14. 【解析】(1) 因为 $f'(x) = (x+1)(e^x - a - 1)$,
 ① 当 $a \leq -1$ 时, $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减; ② 当 $-1 < a < \frac{1-e}{e}$ 时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, \ln(a+1))$, $(-1, +\infty)$ 上单调递增; 在 $(\ln(a+1), -1)$ 上单调递减; ③ 当 $a = \frac{1-e}{e}$ 时, $f'(x)$ 在 R 上单调递增; ④ 当 $a > \frac{1-e}{e}$ 时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, -1)$, $(\ln(a+1), +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, \ln(a+1))$ 上单调递减;
 (2) 因为函数 $y = f(x)$ 的图像上存在点在函数 $y = g(x)$ 的图像的下方, 可知 $\exists x > 0$, 使得 $f(x) < g(x)$ 成立, 所以 $xe^x - \frac{1}{2}(a+1)(x^2 + 2x) < \ln x - \frac{1}{2}(a+1)x^2 - ax + a + 1$, 即 $\exists x > 0$, $xe^x - \ln x - x - 1 < a$ 有解, 设 $h(x) = xe^x - \ln x -$

$x - 1$, (常规方法): 所以 $h'(x) = \frac{x+1}{x}(xe^x - 1)$, 令 $\varphi = xe^x - 1$, 则当 $x > 0$ 时, $\varphi'(x) = (x+1)e^x > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 因为 $\varphi(0) = -1$, $\varphi(x) = e - 1$, 所以 $\varphi(x)$ 存在唯一的零点 $t \in (0, 1)$, 且当 $x \in (0, t)$ 时, $\varphi(x) < 0$, 当 $x \in (t, +\infty)$ 时, $\varphi(x) > 0$, 则当 $x \in (0, t)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减, 当 $x \in (t, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$ 单调递增, 故 $h(x) \geq h(t) = te^t - \ln t - t - 1$, 由 $te^t - 1 = 0$, 可得 $\ln t + t = 0$, 所以 $h(t) = 0$, 所以 $h(x) \geq h(t) = 0$, 所以 $a > 0$, 即实数 a 的取值范围是 $a > 0$.

特殊解法: $h(x) = xe^x - \ln x - x - 1 = e^{x+\ln x} - \ln x - x - 1 \geq 0$, 取等条件是 $x + \ln x = 0$, 故 $a > 0$.

15. 【解析】(1) $g'(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 所以当 $x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, 所以当 $x = 1$ 时, $g(x)$ 取得最大值 $g(1) = \frac{1}{e}$. 因为若对任意 $x \in R$, 不等式 $g(x) - b < 0$ 恒成立, 所以 $b > \frac{1}{e}$;
 (2) $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) = \ln x - x + \frac{e^{x-1}}{x} (x > 0)$,
 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 + \frac{e^{x-1}(x-1)}{x^2} = \frac{(x-1)(e^{x-1} - x)}{x^2}$, 令 $h(x) = e^{x-1} - x (x > 0)$, 则 $h'(x) = e^{x-1} - 1$, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $h(x) \geq h(0) = 0$. 所以当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$. $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 + \frac{ae^x(x-1)}{x^2} =$

$\frac{(x-1)(ae^x-x)}{x^2} (x>0)$, ①当 $a \leq 0$ 时, $ae^x -$

$x < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(1) = ae - 1$;

②当 $a > 0$ 时, 令 $m(x) = ae^x - x$, 则 $m'(x) = ae^x - 1$, 令 $m'(x) = 0$ 可得 $x = \ln \frac{1}{a}$.

(i) 若 $\ln \frac{1}{a} \leq 0$, 即 $a \geq 1$, 则当 $x > 0$ 时, $m'(x) > 0$, 故 $m(x)$ 单调递增, 所以 $m(x) > m(0) = a > 0$, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = ae - 1$;

(ii) 若 $0 < \ln \frac{1}{a} < 1$, 即 $\frac{1}{e} < a < 1$, 当 $0 < x < \ln \frac{1}{a}$ 时, $m'(x) < 0$, 当 $x > \ln \frac{1}{a}$ 时, $m'(x) > 0$, 所以 $m(x) \geq m\left(\ln \frac{1}{a}\right) = 1 - \ln \frac{1}{a} > 0$, 由

(i) 可知 $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = ae - 1$;

(iii) 若 $\ln \frac{1}{a} = 1$, 即 $a = \frac{1}{e}$ 时, 由(2)可知 $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = ae - 1$;

(iv) 若 $\ln \frac{1}{a} > 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 由(ii)可知 $m(x)$ 的最小值为 $m\left(\ln \frac{1}{a}\right) = 1 - \ln \frac{1}{a} < 0$, 又当 $x \rightarrow 0$ 时, $m(x) \rightarrow a > 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $m(x) \rightarrow +\infty$, 所以 $m(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两解, 设 $m(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 的极值为 $f(1)$ 和 $f(x_0)$. 由 $m(x_0) = ae^{x_0} - x_0 = 0$, 得 $ae^{x_0} = x_0$, 两边取对数可得 $\ln a + x_0 = \ln x_0$, 故而 $\ln x_0 - x_0 = \ln a$. 所以 $f(x_0) = \ln x_0 - x_0 + \frac{ae^{x_0}}{x_0} = \ln a + 1$.

综上, 当 $a \leq 0$ 或 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 的极值为 $ae -$

1 , 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 的极值为 $ae - 1$ 和 $\ln a$

+ 1.

16. 【解析】(1) 因为函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上是减函数, 所以 $f'(x) \leq 0$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立. 又

$$f'(x) = 2x + a - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + ax - 1}{x}, \text{ 令 } h(x) =$$

$$2x^2 + ax - 1, \text{ 所以 } \begin{cases} h(1) \leq 0 \\ h(2) \leq 0 \end{cases}, \text{ 解得 } a \leq -\frac{7}{2};$$

(2) 因为 $f(x) = x^2 + ax - \ln x$, 所以 $g(x) = f(x) - x^2 = ax - \ln x, x \in (0, e]$. 所以 $g'(x) =$

$$a - \frac{1}{x} = \frac{ax - 1}{x} (0 < x \leq e), \text{ ①当 } a \leq 0 \text{ 时, } g(x)$$

在 $(0, e]$ 上单调递减, $g(x)_{\min} = g(e) = ae - 1 = 3$, 解得 $a = \frac{4}{e}$ (舍去); ②当 $0 < \frac{1}{a} < e$ 时,

$g(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, e\right]$ 上单

调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g\left(\frac{1}{a}\right) = 1 + \ln a = 3$,

解得 $a = e^2$, 满足条件; ③当 $\frac{1}{a} \geq e$ 时, $g(x)$

在 $(0, e]$ 上单调递减, $g(x)_{\min} = g(e) = ae - 1 = 3$, 解得 $a = \frac{4}{e}$ (舍去); 综上, 存在实数 $a = e^2$, 使得当 $x \in (0, e]$ 时, $g(x)$ 有最小值 3;

(3) 证明: 采用分而治之的原理, 令 $F(x) = e^2 x - \ln x$, 由(2)得 $F(x)_{\min} = 3$, 令 $t(x) = \frac{\ln x}{x} +$

$$\frac{5}{2}, t'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \text{ 当 } 0 < x \leq e \text{ 时, } \omega'(x) \geq$$

$0, \omega(x)$ 在 $(0, e]$ 递增, 所以 $\omega(x)_{\max} =$

$$\omega(e) = 3 \text{ 故 } e^2 x - \ln x > \frac{\ln x}{x} + \frac{5}{2}, \text{ 即 } e^2 x^2 - \frac{5}{2} x$$

$$> (x+1) \ln x.$$

17. 【解析】(1) $e^x - x - m > 0$ 恒成立对 $x > 0$ 恒成立, 令 $g(x) = e^x - x$, 则 $g'(x) = e^x - 1$, 当 $x >$

0 时, $g'(x) = e^x - 1 > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 故当 $x > 0$ 时, $g(x) > g(0) = 1$;

故若使 $e^x - x - m > 0$ 恒成立对 $x > 0$ 恒成立，
则只需使 $m \leq 1$ ；

(2) 思路分析：利用分而治之证明，令 $h(x) = x - \ln x$ ， $n(x) = 1 - \frac{x-1}{e^x}$ ，分别利用导数求函数的单调性，从而确定函数的最值，从而证明不等式，过程如下：

证明： $\left(\frac{x - \ln x}{e^x}\right) f(x) = (x - \ln x) \left(1 - \frac{x-1}{e^x}\right)$ ；

令 $h(x) = x - \ln x$ ， $h'(x) = \frac{x-1}{x}$ ；当 $0 < x < 1$ 时， $h'(x) < 0$ ，当 $x > 1$ 时， $h'(x) > 0$ ；即 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为减函数，在 $(1, +\infty)$ 上为增函数，所以 $h(x) \geq h(1) = 1$ ①. 令 $n(x) = 1 - \frac{x-1}{e^x}$ ， $n'(x) = \frac{x-2}{e^x}$ ，故 $n(x) = 1 - \frac{x-1}{e^x}$ 在 $(0, 2)$ 上是减函数，在 $(2, +\infty)$ 上为增函数；故 $n(x) \geq n(2) = 1 - \frac{1}{e^2}$ ②. 故由 ①② 可得，

$$\left(\frac{x - \ln x}{e^x}\right) f(x) > 1 - \frac{1}{e^2}.$$

18. 【解析】解法一：思路分析(1) 求出函数的导数，根据 $f'(0) = 0$ ，求出 m 的值即可；(2) 求出函数的导数，根据导函数的单调性求出函数的最小值，从而求出 k 的范围即可；或者采用切线放缩的改头换面法，利用 $e^x \geq x+1$ 与 $\ln(x+1) \leq xF(x) > 0$ ，且它们取等条件一致，得出 $k \leq 2$ ；(3) 问题转化为 $e^x - \ln(x+m) > 0$ ，设 $F(x) = e^x - \ln(x+m)$ ，即证，求出函数的导数，根据函数的单调性证明即可；或者改头换面，利用 $e^x - \ln(x+m) \geq x+1 - (x+m-1) = 2-m$ ，由于 $m \leq 2$ ，故 $f(x) \geq 0$ ，由于取等条件不一致，故 $f(x) > 0$.

(1) 因为 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+m}$ ， $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，所以 $f'(0) = 1 - \frac{1}{m} = 0$ ，解得： $m=1$.

经检验 $m=1$ 符合题意；

(2) 由(1)可知，函数 $f(x) = e^x - \ln(x+1) + 1$ ，其定义域为 $(-1, +\infty)$. 因为 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1} = \frac{e^x(x+1) - 1}{x+1}$ ，设 $g(x) = e^x(x+1) - 1$ ，则 $g'(x) = e^x(x+1) + e^x > 0$ ，所以 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数，又因为 $g(0) = 0$ ，所以当 $x > 0$ 时， $g(x) > 0$ ，即 $f'(x) > 0$ ；当 $-1 < x < 0$ 时， $g(x) < 0$ ， $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上为减函数；在 $(0, +\infty)$ 上为增函数；因此， $f(x)$ 的最小值为 $f(0) = 2$ ，所以 $f(x) - k \geq 0$ 在定义域内恒成立，即 $k \leq f(x)_{\min} = 2$ ；

(3) 常规法证明：要证 $f(x) = e^x - \ln(x+m) + m > m$ ，即 $e^x - \ln(x+m) > 0$ ，设 $F(x) = e^x - \ln(x+m)$ ，即证 $F(x) > 0$ ，当 $m \leq 2$ ， $x \in (-m, +\infty)$ 时， $\ln(x+m) \leq \ln(x+2)$ ，故只需证明当 $m=2$ 时， $F(x) > 0$ ，当 $m=2$ 时，函数 $F'(x) = e^x - \frac{1}{x+2}$ 在 $(-2, +\infty)$ 上为增函数，且 $F'(-1) < 0$ ， $F'(0) > 0$ ，故 $F'(x) = 0$ 在 $(-2, +\infty)$ 上有唯一实数根 x_0 ，且 $x_0 \in (-1, 0)$. 当 $x \in (-2, x_0)$ 时， $F'(x) < 0$ ，当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时， $F'(x) > 0$ ，从而当 $x = x_0$ 时， $F(x)$ 取得最小值. 由 $F'(x_0) = 0$ ，得 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0+2}$ ， $\ln(x_0+2) = -x_0$ ，故 $F(x) \geq F(x_0) = \frac{1}{x_0+2} + x_0 = \frac{(x_0+1)^2}{x_0+2} > 0$ ，综上，当 $m \leq 2$ 时， $F(x) > 0$ 即 $f(x) > m$.

秒杀法证明：构造 $g(x) = e^x - x - 1$ ，则 $g'(x) = e^x - 1 = 0$ 时， $x = 0$ ， $g(x)_{\min} = 0$ ；再构造 $h(x) = \ln(x+m) - x - m + 1$ ， $h'(x) = \frac{1}{x+m} - 1 = 0$ 时， $x = 1 - m$ ， $h(x)_{\max} = 0$ ； $e^x - \ln(x+m)$

$\geq x+1-(x+m-1)=2-m$, 由于 $m \leq 2$, 故 $f(x) \geq 0$, 由于取等条件不一致, 故 $f(x) > 0$.

19. 【解析】思路分析: (1) 求出函数的导数, 通过讨论 a 的范围, 求出函数的单调区间即可;

(2) 问题转化为 $b-1 \leq e^x - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$ 恒成立, 设

$g(x) = e^x - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, 根据函数的单调性求出

$g(x)$ 的最小值, 从而求出 b 的范围即可. 或者构造 $xe^x - (b-1)x - \ln x - 1 \geq 0$ 式子, 利用 $xe^x = e^{x+\ln x} \geq x + \ln x + 1$ 来放缩证明.

(1) 由题意知: $f'(x) = \frac{(ax - e^x)(x-1)}{x^2}$, 因为

当 $a < 0, x > 0$ 时, 有 $ax - e^x < 0$, 所以当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减;

(2) 解法一: 由题意当 $a=1$ 时, 不等式 $f(x) + (x + \frac{1}{x})e^x - bx \geq 1$ 恒成立, 即 $xe^x - \ln x + (1 -$

$b)x \geq 1$ 恒成立, 即 $b-1 \leq e^x - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$ 恒成立,

设 $g(x) = e^x - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{x^2 e^x + \ln x}{x^2}$,

设 $h(x) = x^2 e^x + \ln x$, 则 $h'(x) = (x^2 + 2x)e^x + \frac{1}{x}$, 当 $x > 0$ 时, 有 $h'(x) > 0$, 故 $h(x)$ 在 $(0,$

$+\infty)$ 递增, 且 $h(1) = e > 0$, $h(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{e}}{4} - \ln 2$

< 0 , 故函数 $h(x)$ 有唯一零点 x_0 , 且 $\frac{1}{2} < x_0 <$

1 , 故当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0, g'(x) < 0$, $g(x)$ 递减, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0, g'(x) > 0, g(x)$ 递增, 即 $g(x_0)$ 为 $g(x)$ 在定义

域内的最小值, 故 $b-1 \leq e^{x_0} - \frac{\ln x_0}{x_0} - \frac{1}{x_0}$,

因为 $h(x_0) = 0$, 得 $x_0 e^{x_0} = -\frac{\ln x_0}{x_0}, \frac{1}{2} < x_0 < 1$,

$\dots (*)$

令 $k(x) = xe^x, \frac{1}{2} < x < 1$, 故方程 $(*)$ 等价于

$k(x) = k(-\ln x), \frac{1}{2} < x < 1$, 而 $k(x) =$

$k(-\ln x)$ 等价于 $x = -\ln x, \frac{1}{2} < x < 1$, 设函数

$m(x) = x + \ln x, \frac{1}{2} < x < 1$, 易知 $m(x)$ 单调递

增, 又 $m(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \ln 2 < 0, m(1) = 1 > 0$,

故 x_0 是函数的唯一零点, 即 $\ln x_0 = -x_0, e^{x_0} =$

$\frac{1}{x_0}$, 故 $g(x)$ 的最小值 $g(x_0) = 1$, 故 b 的取值

范围是 $(-\infty, 2]$.

秒杀解法: 根据题意可知, $xe^x - (b-1)x - \ln x - 1 \geq 0 \Rightarrow e^{x+\ln x} - \ln x - 1 \geq (b-1)x$ 恒成立, 即 $[1 - (b-1)]x \geq 0$ 恒成立, 故 $b \leq 2$. (一定要说明取等条件和 $t = x + \ln x$ 的一一对应关系)

20. 【解析】思路分析: (1) 先求出 $f'(x) = \frac{1-kx-x\ln x}{xe^x}$,

$x \in (0, +\infty)$, 由 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 得 $f'(1) = 0$, 从而求出 $k=1$;

(2) 由(1)得: $f'(x) = \frac{1}{xe^x}(1-x-x\ln x), x \in$

$(0, +\infty)$, 令 $h(x) = 1-x-x\ln x, x \in (0, +\infty)$, 求出 $h(x)$ 的导数, 从而得 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减;

(3) 分而治之, 加上指数找朋友, 因 $g(x) = \frac{x+1}{e^x}(1-x-x\ln x), x \in (0, +\infty)$, 由(2)

$h(x) = 1-x-x\ln x, x \in (0, +\infty)$, 得 $1-x-x\ln x \leq 1+e^{-2}$, 设 $t(x) = \frac{x+1}{e^x}$, 得 $t(x) <$

$t(0) = 1$, 进而 $g(x) < 1-x-x\ln x \leq 1+e^{-2}$, 问题得以证明.

(1) 因为 $f'(x) = \frac{1-kx-x\ln x}{xe^x}$, 且 $y = f(x)$ 在

(1, $f(1)$)处的切线与 x 轴平行, 所以 $f'(1) = 0$, 所以 $k = 1$;

(2) 由(1)得: $f'(x) = \frac{1}{xe^x}(1 - x - x \ln x)$, 令 $h(x) = 1 - x - x \ln x$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) < 0$, 又 $e^x > 0$, 所以 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减;

(3) 证明: 因为 $g(x) = (x^2 + x)f'(x)$, 所以 $g(x) = \frac{x+1}{e^x}(1 - x - x \ln x)$, $x \in (0, +\infty)$, 设

$t(x) = \frac{x+1}{e^x}$, 所以 $t'(x) = \frac{-x}{e^x}$, 所以 $x \in (0, +\infty)$ 时, $t'(x) < 0$, $t(x)$ 递减, 所以 $t(x) < t(0) = 1$, 所以 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x+1}{e^x} < 1$, 所

以 $\forall x > 0$, $g(x) < 1 + e^{-2} \Leftrightarrow 1 - x - x \ln x < 1 + e^{-2}$, 由(II) $h(x) = 1 - x - x \ln x$, $x \in (0, +\infty)$, 所以 $h'(x) = -(\ln x - \ln e^{-2})$, $x \in (0, +\infty)$, 所以 $x \in (0, e^{-2})$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增, $x \in (e^{-2}, +\infty)$ 时, $h(x) < 0$, $h(x)$ 递减, 所以 $h(x)_{\max} = h(e^{-2}) = 1 + e^{-2}$, 所以 $1 - x - x \ln x \leq 1 + e^{-2}$, 所以 $g(x) < 1 - x - x \ln x \leq 1 + e^{-2}$, 所以 $\forall x > 0$, $g(x) < 1 + e^{-2}$.

21. 【解析】(1) 证明: $f'(x) = (x+1)e^x + \frac{1-\ln x}{x^2}$, 易知 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为正, 因此 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上为增函数, 又 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e^{\frac{1}{e}} - e^2}{e} < 0$, $f(1) = e > 0$, 因此 $f\left(\frac{1}{e}\right)f(1) < 0$, 即 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上恰有一个零点, 由题可知 $f(x) > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 即在 $(1, +\infty)$ 上无零点, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点;

(2) 常规解法: 原不等式可化为 $\frac{xe^x - \ln x - 1}{x} \geq$

k , 令 $g(x) = \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{xe^x + \frac{\ln x}{x}}{x}$,

由(1)可知 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(x_0)$, 设 $f(x)$ 的零点为 x_0 , 即 $x_0 e^{x_0} + \frac{\ln x_0}{x_0} =$

0, 下面分析 $x_0 e^{x_0} + \frac{\ln x_0}{x_0} = 0$, 设 $x_0 e^{x_0} = t$, 则

$\frac{\ln x_0}{x_0} = -t$, 可得 $\begin{cases} \ln x_0 = -tx_0 \\ \ln x_0 + x_0 = \ln t \end{cases}$, 即 $x_0(1-t) =$

$\ln t$, 若 $t > 1$, 等式左负右正不相等, 若 $t < 1$, 等式左正右负不相等, 只能 $t = 1$. 因此

$g(x_0) = \frac{x_0 e^{x_0} - \ln x_0 - 1}{x_0} = -\frac{\ln x_0}{x_0} = 1$, 即 $k \leq 1$ 求

所求. 秒杀解法: $xe^x - \ln x \geq 1 + kx \Rightarrow e^{x+\ln x} \geq \ln x + kx + 1$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 因为 $e^{x+\ln x} \geq x + \ln x + 1$, 当且仅当 $x + \ln x = 0$ 时等号成立, 故 $e^{x+\ln x} \geq \ln x + x + 1 \geq \ln x + kx + 1 \Rightarrow (1-k)x \geq 0$, 即 $k \leq 1$.

22. 【解析】思路分析: (1) 利用导数 $g'(x) = 0$, 求得极值点, 讨论 a 的取值情况, 判断是极大值还是极小值点;

(2) 不等式化为 $f(x) - x - \ln(x-1) \geq m$, 构造 $h(x) = f(x) - x - \ln(x-1)$, $x > 1$; 求 $h(x)$ 的最小值即可求得 m 的取值范围. 或者采用改头换面法, $(x-1)e^x - x - \ln(x-1) = e^{x+\ln(x-1)} - x - \ln(x-1) \geq 1$, 当且仅当 $x + \ln(x-1) = 0$ 时等号成立.

(1) 函数 $f(x) = (x-1)e^x$, 所以函数 $g(x) = f(x) + \frac{1}{2}ax^2 = (x-1)e^x + \frac{1}{2}ax^2$; 所以 $g'(x) = xe^x + ax = x(e^x + a)$, 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = 0$

或 $x = \ln(-a)$; ①当 $a = -1$ 时, $\ln(-a) = 0$, 当 x 在 $\mathbf{R}$ 上变化时, 可得下表:

x	$(-\infty, \ln(-a))$	$\ln(-a)$	$(\ln(-a), 0)$	0	$(0, +\infty)$
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	↗	极小值	↘	极大值	↗

所以由表可知, 此时极大值点为 $x = \ln(-a)$, 极小值点为 $x = 0$; ②同理当 $-1 < a < 0$ 时, 极大值点为 $x = 0$, 极小值点为 $x = \ln(-a)$; ③当 $a = -1$ 时, $g'(x) = x(e^x - 1) \geq 0$ 恒成立, 此时 $g(x) = (x-1)e^x - \frac{1}{2}x^2$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 既无极大值点也无极小值点;

(2) 常规解法: 不等式 $f(x) \geq x + m + \ln(x-1)$ 化为 $f(x) - x - \ln(x-1) \geq m$, 设 $h(x) = f(x) - x - \ln(x-1)$, $x > 1$; 所以 $h(x) = (x-1)e^x - x - \ln(x-1)$, 其中 $x > 1$; 则 $h'(x) = xe^x - 1 - \frac{1}{x-1} = xe^x - \frac{x}{x-1} = x\left(e^x - \frac{1}{x-1}\right)$, 令 $F(x) = e^x - \frac{1}{x-1}$, $x > 1$; 则 $F'(x) = e^x + \frac{1}{(x-1)^2} > 0$ 恒成立, 所以 $F(x)$ 为增函数, 所以 $F(2) = e^2 - 1 > 0$; 取 $x-1 = e^{-2}$, 则 $x = 1 + e^{-2}$, $F(1 + e^{-2}) = e^{1+e^{-2}} - e^2 < 0$; 所以存在唯一 $x_0 \in (1 + e^{-2}, 2)$, 使 $F(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0 - 1}$; 又 $1 < x < x_0$ 时, $F(x) < 0$, 即 $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 为减函数; $x > x_0$ 时, $F(x) > 0$, 即 $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 为增函数; 所以 $h(x)_{\min} = (x_0 - 1)e^{x_0} - x_0 - \ln(x_0 - 1)$, 所以 $h(x)_{\min} \geq x_0 - 1 - x_0 - \frac{1}{x_0 - 1} \ln e^{x_0} \geq 1$ 所以对 $\forall x > 1$, 有 $f(x) \geq x + m + \ln(x-1)$ 成立等价 $f(x) - x - \ln(x-1) \geq 1 \geq m$ 恒成立, 即 $m \leq 1$; 所以 m 的取值范围是 $m \leq 1$.

秒杀解法: $h(x) = (x-1)e^x - x - \ln(x-1) = e^{x+\ln(x-1)} - x - \ln(x-1)$, 令 $t = x + \ln(x-1)$, $t' = 1 + \frac{1}{x-1} > 0$ 对 $x > 1$ 恒成立, 故 $t = x + \ln(x-1)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, $h(t) = e^t - t \geq m$ 恒成立, 则 $h'(t) = e^t - 1$, 当 $t = 0$ 时, $h(t)$ 取得最小值, 此时 $h(0) = 1 \geq m$, 由于 $t = x + \ln(x-1)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 单调递增, 故当且仅当 $t = x + \ln(x-1) = 0$ 时, 等号成立.

23. 【解析】思路分析: (1) 求出函数的导数, 解关于导函数的不等式, 求出函数的单调区间即可; (2) 分而治之, 求出 $f(x)$ 的最小值, $g(x)$ 的最大值, 要使 $f(x) > g(x)$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 成立, 只需 $f(x)_{\min} > g(x)_{\max}$, 从而求出 a 的范围.

(1) $f'(x) = (2x-1)\ln x + (x^2-x) \cdot \frac{1}{x} - 3x + 2 = (2x-1)(\ln x - 1)$, $x \in (0, +\infty)$, 令 $f'(x) > 0$, 解得: $x > e$ 或 $x < \frac{1}{2}$, 令 $f'(x) < 0$, 解得 $\frac{1}{2} < x < e$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 和 $(e, +\infty)$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2}, e)$ 上递减;

(2) 由 (1) 得: $f(x)$ 在 $(1, e)$ 上递减, 在 $(e, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(x)_{\min} = f(e) = e - \frac{1}{2}e^2$, 因为 $g'(x) = \frac{(a+1)(\ln x - 1)}{(\ln x)^2}$, 所以 $a + 1 < 0$ 时, $g(x)$ 在 $(1, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 所以 $g(x)_{\max} = g(e) = (a+1)e$, 要使 $f(x) > g(x)$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 成立, 必须 $f(x)_{\min} > g(x)_{\max}$, 即 $f(e) > g(e)$, 所以 $a < -\frac{1}{2}e$, 所以 $a + 1 \geq 0$ 时, $g(x) \geq 0$, 而 $f(x)_{\min} = e - \frac{1}{2}e^2 < 0$, 所以 $f(x) > g(x)$ 对

$\forall x \in (1, +\infty)$ 不可能成立, 综上, $a < -\frac{1}{2}e$.

24. 【解析】(1) $f(x) = e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x}$, $x > 0$, 所以 $f'(x) = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} + \frac{2xe^{x-1} - 2e^{x-1}}{x^2}$, 所以 $f(1) = 2$, $f'(1) = e$, 所以切线方程为 $y = ex + 2 - e$;

(2) 证明: $g(x) = \frac{x}{e} f(x) = x \ln x + \frac{2}{e}$, 所以 $g'(x) = 1 + \ln x$, 由 $g'(x) > 0$ 得 $x > \frac{1}{e}$, $g'(x) < 0$ 得 $0 < x < \frac{1}{e}$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上是减函数, 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上是递增函数, 在 $x = \frac{1}{e}$ 时, $g(x)$ 取到最小值 $g(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e}$; 令 $h(x) = \frac{x}{e^x}$, 则 $h'(x) = \frac{1-x}{e^x}$ 由 $h'(x) > 0$ 得 $0 < x < 1$, 由 $h'(x) < 0$ 得 $x > 1$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上是增函数, 在 $(1, +\infty)$ 上是减函数. 在 $x = 1$ 时, $h(x)$ 取到最大值 $h(1) = \frac{1}{e}$, 所以对任意 $x > 0$, 都有 $g(x) > \frac{x}{e^x}$ 成立.

25. 【解析】思路分析: (1) 求出函数的导数, 根据 $f'(e) = -\frac{1}{e^2}$, 求出 a 的值, 从而求出函数的单调区间, 结合题意得到关于 m 的不等式组, 解出即可; (2) 不等式转化为 $\frac{1}{e+1} \cdot \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x} > \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$, 故采用分而治之, 令 $g(x) = \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x}$, $h(x) = \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$, 证明 $\frac{g(x)}{e+1} > h(x)$.

(1) $f(x) = \frac{a + \ln x}{x}$, 所以 $f'(x) = \frac{1-a-\ln x}{x^2}$,

由题意得: $f'(e) = -\frac{1}{e^2}$, 所以 $-\frac{a}{e^2} = -\frac{1}{e^2}$,

解得: $a = 1$, 所以 $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$, $f'(x) =$

$-\frac{\ln x}{x^2}$, ($x > 0$), $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$,

$f(x)$ 递增, $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减, 故函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 时取得极值, 又函数 $f(x)$ 在 $[m, m+1]$ 上存在极值, 所以 $m \leq 1 \leq m+1$, 所以 $0 \leq m \leq 1$, 故 m 的范围是 $[0, 1]$;

(2) 证明: $x > 1$ 时, $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$,

即为 $\frac{1}{e+1} \cdot \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x} > \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$, 令

$g(x) = \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{x-\ln x}{x^2}$,

令 $t(x) = x - \ln x$, 则 $t'(x) = \frac{x-1}{x}$, 因为 $x > 1$,

所以 $t'(x) > 0$, 所以 $t(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增,

因为 $t(1) = 1$, 所以 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$

在 $(1, +\infty)$ 上递增, 所以 $x > 1$ 时, $g(x) >$

$g(1)$, 又 $g(1) = 2$, 故 $\frac{g(x)}{e+1} > \frac{2}{e+1}$, 令 $h(x) =$

$\frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$, 则 $h'(x) = \frac{2e^{x-1}(1-e^x)}{(xe^x+1)^2}$, 因为 $x > 1$,

所以 $\frac{2e^{x-1}(1-e^x)}{(xe^x+1)^2} < 0$, 所以 $x > 1$ 时, $h'(x) <$

0 , 故函数 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 又 $h(1) =$

$\frac{2}{e+1}$, 所以 $x > 1$ 时, $h(x) < \frac{2}{e+1}$, 所以

$\frac{g(x)}{e+1} > h(x)$, 即 $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$.

专题 7 指对跨阶系列二之同构式构造

达标训练

1. C 【解析】同构式构造, 设 $g(x) = f(x) + x$, 因为 $f'(x) \geq 0$, 所以 $g'(x) = f'(x) + 1 > 0$, 则 $g(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 由 $f(\ln t) + \ln t - 1 \leq$

$f(1)$, 得 $f(\ln t) + \ln t \leq f(1) + 1$, 即 $g(\ln t) \leq g(1)$, 则 $\ln t \leq 1$, 所以 $0 < t \leq e$. 所以满足不等式 $f(\ln t) + \ln t - 1 \leq f(1)$ 的实数 t 的集合是 $(0, e]$, 故选 C.

2. A 【解析】同构式构造, $f(e^x) = ax - 2e^x$, 所以 $f(x+1) > ax - 2e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 等价于 $f(x+1) > f(e^x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 因为 $x \in (0, +\infty)$ 时, $1 < x+1 < e^x$, 所以只需 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 即 $x > 1$, $f'(x) \leq 0$ 恒成立, 即 $x > 1$ 时, $\frac{a}{x} \leq 2$ 恒成立, $a \leq 2x$, 所以 $a \leq 2$, 故选 A.

3. D 【解析】同构式构造, 令 $x = e$, 则有 $e^2 - me^{\frac{m}{e}} \geq 0$, $x^2 \ln x - e \cdot e^{\frac{e}{x}} \geq 0$, 即证: $x \ln x = e^{\ln x} \ln x \geq e^{\frac{e}{x}} \cdot \ln e^{\frac{e}{x}}$, 令 $x \geq e^{\frac{e}{x}}$, 因此 $m_{\max} = e$. 故选 D.

4. C 【解析】 $2x^2 e^{2x} + \ln x = 0 \Rightarrow 2xe^{2x} = -\frac{\ln x}{x} = \frac{1}{x} \ln \frac{1}{x} = e^{\ln \frac{1}{x}} \ln \frac{1}{x} \Rightarrow 2x = \ln \frac{1}{x} \Rightarrow 2x_0 + \ln x_0 = 0$, 故选 C.

5. D 【解析】 $a(e^{ax} + 1) \geq 2\left(x + \frac{1}{x}\right) \ln x \Rightarrow axe^{ax} + ax \geq 2x^2 \ln x + 2 \ln x = x^2 \ln x^2 + \ln x^2 = e^{\ln x^2} \ln x^2 + \ln x^2$, 属于同构式 $f(x) = xe^x + x$, 即 $ax \geq \ln x^2 \Rightarrow a \geq \frac{2 \ln x}{x} = \frac{2}{e}$, 故选 D.

6. 【解析】令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, $x > 0$. 因为对任意的 $x > 0$, $f(x) - x \cdot f'(x) < 0$ 恒成立, 所以 $g'(x) = \frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} > 0$. 所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 关于实数 t 的不等式 $f(\sqrt{t^2 - t - 2}) < \sqrt{t-2} \cdot f(\sqrt{t+1})$, 化为同构式: $\frac{f(\sqrt{t^2 - t - 2})}{\sqrt{t^2 - t - 2}} < \frac{f(\sqrt{t+1})}{\sqrt{t+1}}$, 即 $g(\sqrt{t^2 - t - 2}) < g(\sqrt{t+1})$, $t^2 - t - 2 > 0$, $t+1 > 0$, 解得 $t > 2$. 所以 $\sqrt{t^2 - t - 2} < \sqrt{t+1}$, 化为: $t^2 - t - 2 < t+1$, 即

$t^2 - 2t - 3 < 0$, 解得 $-1 < t < 3$. 又 $t > 2$, 所以 $2 < t < 3$, 故答案为 $2 < t < 3$.

7. 【解析】(1) 由题设知, $f'(2) = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2e^2}$,

经检验 $a = \frac{1}{2e^2}$ 符合题意, 从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2} e^x - \ln x$

-1 , $g(x) = \frac{1}{2e^2} e^x - 1 - \frac{x}{e^2}$, $g'(x) = \frac{e^x}{2e^2} - \frac{1}{e^2} =$

$\frac{1}{2e^2}(e^x - 2)$, 当 $x > \ln 2$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $0 < x$

$< \ln 2$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \ln 2)$ 上单调递减, 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 因为 $ae^x - \ln x - 1 \geq 0$ 恒成立, 即 $ae^x \geq \ln ex$ 恒成立, 即 $a \cdot exe^x \geq ex \ln ex = e^{\ln ex} \cdot \ln ex$ 恒成立,

设 $g(t) = te^t$, 则 $g'(t) = e^t(t+1)$, 显然当 $t > 0$ 时, $g(t)$ 单调递增, 故 $a \cdot exe^x \geq ex \ln ex =$

$e^{\ln ex} \cdot \ln ex \Rightarrow aeg(x) \geq g(\ln ex)$ 恒成立, 则需满足

$\begin{cases} ae \geq 1 \\ x \geq \ln ex \end{cases}$, 令 $h(x) = x - \ln ex = x - \ln x - 1$,

$h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 显然 $h(x)_{\min} = h(1) = 0$, 故只

需 $ae \geq 1$, 所以 $a \geq \frac{1}{e}$.

8. 【解析】(1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 因为 $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, 所以 $x \in (-\infty,$

$0)$, $(0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (1, +\infty)$ 时,

$f'(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $(1, +\infty)$, 减区间为 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$;

(2) $a f(x) > \ln x \Leftrightarrow \frac{ae^x}{x} - \ln x > 0$. 当 $a \geq \frac{2}{e^2}$, 令

$F(x) = \frac{ae^x}{x} - \ln x$, $F'(x) = \frac{1}{x^2}[a(x-1)e^x - x]$.

$(x > 0)$. ① 当 $x \in (0, 1]$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减, $F(x) \geq F(1) = ae > 0$; ② 当 $x > 1$ 时,

$F(x) = \frac{ae^x}{x} - \ln x > \frac{2e^x}{e^2 x} - \ln x$, 令 $g(x) = \ln x - \frac{x}{e}$,

$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = 0$, 当 $x = e$ 时 $g(x)_{\max} = \ln e -$

$\frac{c}{e} = 0$, 即 $\ln x \leq \frac{x}{e}$, 故只需证 $\frac{2e^x}{e^2x} - \frac{x}{e} > 0$, 只

需证 $\frac{e^{2x}}{e^x} < 2$ 令 $h(x) = \frac{e^{2x}}{e^x}$, $h'(x) = \frac{e^{2x}(2-x)}{e^x}$,

故 $h(x)$ 在 $(0, 2) \uparrow$, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减. 当

$x=2$ 时, $h(x)_{\min} = h(2) = \frac{e^2}{4} < 2$, 综上所述,

当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $af(x) > \ln x$ 成立.

9. 【解析】(1) $f'(x) = e^x + m$, ① $m \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 R 递增, ② $m < 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 解得: $x > \ln(-m)$, 令 $f'(x) < 0$, 解得: $x < \ln(-m)$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(-m))$ 递减, 在 $(\ln(-m), +\infty)$ 递增;

(2) 分析思路: 由 $f'(0) = 1 + m = 1$, 解得: $m = 0$, 故 $f(x) = e^x - 1$, 要证明 $x > 0$ 时, $f(x) - 2\ln x > 3 - 2\ln 2$, 即证明 $x > 0$ 时, $e^x - 2\ln x > 4 - 2\ln 2 \Rightarrow \frac{e^x}{2} > \ln \frac{x}{2} + 2$, 根据“放对再放指, 常数是关键” $\ln x \leq x - 1 \Rightarrow \ln x \leq ex - 1 \Rightarrow \ln x \leq ex - 2$, 故构造 $\ln \frac{x}{2} \leq \frac{e}{2}x - 2$ (取等条件为 $x = \frac{2}{e}$), 如此便可以消去常数项, 即只需证明 $\frac{e^x}{2} > \frac{ex}{2}$, 显然成立.

10. 【解析】(1) 只需证明 $e^{x-1} \geq x$ (当且仅当 $x=1$ 时取等号). $x \geq \ln x + 1$ (当且仅当 $x=1$ 时取等号), 即可证明 $f'(x) \geq 0$;

(2) 同构式构造, 若 $f(x)$ 有两个极值点, 即

$$f'(x) = e^{x-m} - \ln x - m = 0 \Rightarrow \frac{e^x}{e^m} = \ln x e^m \Rightarrow x e^x = x e^m \ln x e^m = e^{\ln x e^m} \ln x e^m$$

有两个变号零点. $x = \ln(xe^m)$ 有两根, 即 $\frac{x}{\ln x} = e^m \in (e, +\infty)$ 有两

根; $m > 1$.

11. 【解析】(1) 函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$. 所以 $x >$

0 , $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$, 因为 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值

点, 所以 $f'(2) = ae^2 - \frac{1}{2} = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2e^2}$,

所以 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x$

$-\frac{1}{x}$, 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时,

$f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 即

只需要证明 $\frac{e^x}{e} \geq \ln x + 1 = \ln ex \Leftrightarrow xe^x \geq ex \ln ex =$

$e^{\ln ex} \ln ex$, 设 $g(x) = xe^x$, 则 $g'(x) = e^x(x+1) >$

0 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 故只需证 $x \geq \ln ex$

$= \ln x + 1$ 恒成立, 所以当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

12. 【解析】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = ae^x \ln x + \frac{a}{x} \cdot e^x - \frac{b}{x^2} \cdot e^{x-1} + \frac{b}{x} \cdot e^{x-1},$$

由题意可得 $f(1) = 2$, $f'(1) = e$, 故 $a = 1$, $b = 2$;

(2) 由 (1) 知, $f(x) = e^x \ln x + \frac{2}{x} \cdot e^{x-1}$, 要证

$f(x) > 1$, 只需 $x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e} \Rightarrow x \ln x + \frac{1}{e} >$

$xe^{-x} - \frac{1}{e}$, 只需 $x \ln x + \frac{1}{e} > -\left(-xe^{-x} + \frac{1}{e}\right) =$

$-\left(e^{-x} \ln e^{-x} + \frac{1}{e}\right)$, 构造函数 $g(x) = x \ln x +$

$\frac{1}{e}$, 显然 $g(x) \geq 0$, 当且仅当 $x = \frac{1}{e}$ 时等号成立,

由于两同构式 $g(x) + g(e^{-x}) \geq 0$ 时, 取等条件

为 $x = e^{-x} = \frac{1}{e}$, 显然不存在, 故 $g(x) +$

$g(e^{-x}) > 0$, 即 $f(x) > 1$.

专题 8 对数平均不等式的应用

达标训练

1. 【解析】证明: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{2}{x_1} + \ln x_1 = \frac{2}{x_2} +$

$$\ln x_2 \Rightarrow \frac{2}{x_1 x_2} = \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} < \frac{1}{\sqrt{x_1 x_2}} \Rightarrow x_1 x_2 > 4, x_1 +$$

$$x_2 > 2\sqrt{x_1 x_2} > 4.$$

2. 【解析】(1) $f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2a}}$ ($a >$

0), 若 $f(x)$ 有两个零点, 则 $f\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) > 0$, 所以

$$0 < a < \frac{1}{2e};$$

$$(2) f\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{2}, \begin{cases} \ln x_1 = \frac{1}{2}x_1^2 + m \text{ ①} \\ \ln x_2 = \frac{1}{2}x_2^2 + m \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得 } \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = \frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{2}{x_1 + x_2} \Rightarrow x_1 + x_2 > 2.$$

3. 【解析】证明: $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, 当 $a > 0$ 时,

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{a}, f(x)_{\min} = f\left(\frac{1}{a}\right) = \ln \frac{1}{a} - 1 <$$

$$0, \text{ 所以 } a > \frac{1}{e}; \begin{cases} \ln x_1 = ax_1 \text{ ①} \\ \ln x_2 = ax_2 \text{ ②} \end{cases}, \text{ ①} - \text{②} \text{ 得 } a(x_1 - x_2) = \ln x_1 - \ln x_2 \text{ ③}; \text{ ①} - \text{②} \text{ 得 } a(x_1 + x_2) = \ln x_1 x_2$$

$$\text{④}, \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = a = \frac{\ln x_1 x_2}{x_1 + x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}, \text{ 所以 } x_1 x_2 > e^2.$$

4. 【解析】证明: $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{(x+1)(x-a)}{x}, \text{ 显然 } a \leq 0 \text{ 时, 不符合}$$

题意, $a > 0$ 时, 当 $x \in (0, a)$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (a, +\infty)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 所以 $f(x)$ 有极小值 $f(a) < 0 \Rightarrow \ln a >$

$$1 - \frac{1}{2}a \Rightarrow 1 < a < 2, \text{ 令 } 0 < x_1 < x_2,$$

$$\begin{cases} a \ln x_1 = \frac{1}{2}x_1^2 - (1-a)x_1 \text{ ①} \\ a \ln x_2 = \frac{1}{2}x_2^2 - (1-a)x_2 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = \frac{2 - 2a + (x_1 + x_2)}{2a} >$$

$$\frac{2}{x_1 + x_2} (x_1 + x_2)^2 + 2(1-a)(x_1 + x_2) - 4a > 0 (x_1$$

$$+ x_2 + 2)(x_1 + x_2 - 2a) > 0 \Rightarrow x_1 + x_2 > 2a > 2.$$

5. 【解析】(1) $a < 1$; 求导或者切线放缩可得;

(2) 设 $t = e^x$ 所以 $x = \ln t$ 则原函数有两个零点可转化为 $\ln t - at + 1 = 0$ 有两个根 t_1, t_2 ($t_1 < t_2$), 要证明 $e^{t_1} + e^{t_2} > 2$, 只要 $t_1 + t_2 > 2$ 即可;

$$\begin{cases} \ln t_1 = at_1 - 1 \text{ ①} \\ \ln t_2 = at_2 - 1 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{\ln t_1 - \ln t_2}{t_1 - t_2} = a > \frac{2}{t_1 + t_2} \Rightarrow t_1 + t_2 > \frac{2}{a} > 2.$$

6. 【解析】 $f'(x) = 2x - 2 + ae^x = 0$ 有两个根, 则

$$f''(x) = 2 + ae^x = 0 \Rightarrow x = \ln\left(-\frac{2}{a}\right) (a < 0), \text{ 此时}$$

$$\begin{cases} f'(x_1) = 2x_1 - 2 + ae^{x_1} = 0 \\ f'(x_2) = 2x_2 - 2 + ae^{x_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = \ln \frac{2}{-a} + \ln(x_1 - 1) \text{ ①} \\ x_2 = \ln \frac{2}{-a} + \ln(x_2 - 1) \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{\ln(x_1 - 1) - \ln(x_2 - 1)}{(x_1 - 1) - (x_2 - 1)} = 1 > \frac{2}{x_1 + x_2 - 2},$$

所以 $x_1 + x_2 > 4$.

7. 【解析】证明: $f'(x) = e^x - a$, 当 $f'(x) = 0$ 时,

$x = \ln a$, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(\ln a) < 0$, $a > e^2$;

$$\begin{cases} f(x_1) = e^{x_1} - ax_1 + a = 0 \\ f(x_2) = e^{x_2} - ax_2 + a = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = \ln a + \ln(x_1 - 1) \text{ ①} \\ x_2 = \ln a + \ln(x_2 - 1) \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得: } \frac{\ln(x_1 - 1) - \ln(x_2 - 1)}{(x_1 - 1) - (x_2 - 1)} = 1 <$$

$$\frac{1}{\sqrt{(x_1 - 1)(x_2 - 1)}}, \text{ 即 } 1 > \sqrt{(x_1 - 1)(x_2 - 1)}$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 < x_1 + x_2;$$

$$\text{①} + \text{②} \text{ 得: } x_1 + x_2 = 2\ln a + \ln(x_1 - 1)(x_2 - 1) <$$

$$2\ln a, \text{ 所以 } \sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2} < \ln a \Rightarrow f'(\sqrt{x_1 x_2}) =$$

$$e^{\sqrt{x_1}} - a < e^{\ln a} - a = 0.$$

$$8. \text{【解析】}(1) f'(x) = \frac{1}{x(x+a)} - \ln x, f'(1) = 1$$

所以 $a = 0$. 所以 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 所以 $f'(x) =$

$\frac{1 - \ln x}{x^2}$. 当 $f'(x) = 0$ 时, $x = e$, 故 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上

单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减. 所以

$\frac{\ln 2016}{2016} > \frac{\ln 2017}{2017}$. 所以 $e^{\frac{\ln 2016}{2016}} > e^{\frac{\ln 2017}{2017}}$, 即 $2016^{\frac{1}{2016}} >$

$2017^{\frac{1}{2017}}$, 所以 $2016^{2017} > 2017^{2016}$;

(2) 由 (1) 得, $f(x)_{\max} = f(e) = \frac{1}{e}$, 所以 $g(x) =$

$f(x) - k = 0$, 所以 $k = \frac{1}{e}$.

$$\text{即} \begin{cases} \frac{\ln x_1}{x_1} = k \\ \frac{\ln x_2}{x_2} = k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ln x_1 = kx_1 \text{ ①} \\ \ln x_2 = kx_2 \text{ ②} \end{cases}, \text{ ①} - \text{②} \text{得: } k(x_1 -$$

$x_2) = \ln x_1 - \ln x_2 \text{ ③}; \text{ ①} + \text{②} \text{得: } k(x_1 + x_2) =$

$\ln x_1 x_2 \text{ ④}; \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = k = \frac{\ln x_1 x_2}{x_1 + x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}$, 所以

$x_1 x_2 > e^2$.

$$9. \text{【解析】}(1) f'(x) = \frac{a(\ln x - 1)}{\ln^2 x}, \text{ 所以 } f'(e^2) =$$

$\frac{a}{4} = \frac{1}{4}$, 得: $a = 1$, 所以令 $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} < 0$,

得: $x \in (0, 1) \cup (1, e)$, 即 $f(x)$ 的单调区间为 $(0, 1)$ 和 $(1, e)$;

$$(2) \text{ 由} \begin{cases} \ln x_2 = ax_2 \\ \ln x_1 = ax_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ln x_1 - \ln x_2 = a(x_1 - x_2) \\ \ln x_1 + \ln x_2 = a(x_1 + x_2) \end{cases},$$

所以 $\frac{2}{x_1 + x_2} < a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = \frac{\ln x_1 x_2}{x_1 + x_2} \Rightarrow \ln x_1 x_2 >$

$2x_1 x_2 > e^2$; 因为 $x_1 + x_2 > 2\sqrt{x_1 \cdot x_2}$, 所以 $x_1 +$

$x_2 > 2\sqrt{x_1 \cdot x_2} > 2e$.

$$10. \text{【解析】证明: } f'(x) = \frac{a}{x} - 2bx, \text{ 当 } a = 2 \text{ 时,}$$

$$f'(2) = -3 \Rightarrow b = 1, g(x) = 2\ln x - x^2 - kx;$$

$$\begin{cases} g(x_1) = 2\ln x_1 - x_1^2 - kx_1 = 0 \text{ ①} \\ g(x_2) = 2\ln x_2 - x_2^2 - kx_2 = 0 \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{得: } 2(\ln x_1 - \ln x_2) - (x_1^2 - x_2^2) -$$

$$k(x_1 - x_2) = 0;$$

同除以 $(x_1 - x_2)$ 得: $\frac{2(\ln x_1 - \ln x_2)}{x_1 - x_2} - (x_1 + x_2) -$

$$-k = 0; g'(x_0) = \frac{2}{x_0} - 2x_0 - k = \frac{4}{x_1 + x_2} - (x_1 +$$

$x_2) - k$, 要证 $g'(x_0) < 0$, 只需证 $\frac{4}{x_1 + x_2} <$

$\frac{2(\ln x_1 - \ln x_2)}{x_1 - x_2}$, 此正好为对数平均不等式, 命

题得证.

$$11. \text{【解析】}(1) \text{ 欲证 } x + 1 - \frac{2(x-1)}{f(x)} > 0, \text{ 令}$$

$$K(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1} > 0, \text{ 因为 } K'(x) =$$

$\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$, 所以 $K(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递

增, 所以 $K(x) > K(1) = 0$;

(2) 因为 $x > 1, \ln x > \frac{2(x-1)}{x+1}$, 取 $x = \frac{x_2}{x_1} \Rightarrow$

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

$$\begin{cases} \ln x_1 + x_1 - ax_1^2 = 0 \\ \ln x_2 + x_2 - ax_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = \frac{1}{a(x_1 + x_2) - 1}$$

$$< \frac{x_1 + x_2}{2} \Rightarrow \frac{2}{x_1 + x_2} - [a(x_1 + x_2) - 1] < 0.$$

$$g'(x) = \frac{1}{x} + 1 - 2ax, g'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{2}{x_1 + x_2} -$$

$$[a(x_1 + x_2) - 1] < 0, g''(x) = -\frac{1}{x^2} - 2a < 0,$$

$g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 因为 $\frac{x_1 + 2x_2}{3} >$

$$\frac{x_1 + x_2}{2}, \text{ 所以 } g'\left(\frac{x_1 + 2x_2}{3}\right) < g'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < 0.$$

$$12. \text{【解析】证明: } g(x) = x \ln x - \frac{a}{2} x^2 - x, (x > 0),$$

$$g'(x) = \ln x - ax \text{ 设, } h(x) = \ln x - ax, (x > 0),$$

$h'(x) = \frac{1-ax}{x}$; ①当 $a \leq 0$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调 x 递增, 不符合题意; ②当 $a > 0$ 时, 若 $x \in (0, \frac{1}{a})$, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增, 若 $x \in (\frac{1}{a}, +\infty)$, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 单调递减, 所以 $h(x) \leq h(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - 1$, 依题意 $h(x)$ 有两根不同的零点 x_1, x_2 , 不妨设 $0 < x_1 < x_2$. 所以 $\ln \frac{1}{a} - 1 > 0$, 所以 $a < \frac{1}{e}$. 所以 $2ae < 2$ 要证明 $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} > 2ae$, 只要证明 $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} > 2$ 即可, 由上可知: $\begin{cases} \ln x_1 = ax_1 \text{ ①} \\ \ln x_2 = ax_2 \text{ ②} \end{cases}$ ① + ② 得: $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$, 且 ① - ② 得: $\ln x_1 - \ln x_2 = a(x_1 - x_2)$, 所以 $\frac{1}{a} = \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}} + \frac{1}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}}}{\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)}$, 所以 $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) = \frac{1}{\ln \frac{x_1}{x_2}} \cdot \left(\frac{x_1}{x_2} - \frac{x_2}{x_1} \right)$, 设 $t = \frac{x_1}{x_2}$, $t \in (0, 1)$, 故只要 $\frac{1}{\ln t} \cdot \left(t - \frac{1}{t} \right) > 2$, 即 $2t \ln t - t^2 + 1 > 0$ 即可, 令 $m(t) = 2t \ln t - t^2 + 1$, $t \in (0, 1)$. $m'(t) = 2(\ln t - t + 1)$ 易知 $m'(t)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增; 所以 $m'(t) < m(1) = 0$, $m(t)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 所以 $m(t) > m(1) = 0$ 即 $2t \ln t - t^2 + 1 > 0$, 所以原结论得证.

13. 【解析】思路分析: 先证明 $f(x) = 0$ 有两个零点时, $a > 1$, 由于和对均的符号属于反向, 故需要先作差求出 $x_1 + x_2 > 2a$, 再求和构造出含有

$$\ln x_1 x_2 + \frac{2x_1 x_2}{a} = \frac{(x_1 + x_2)^2 + (1-2a)(x_1 + x_2)}{a}$$

的式子, 再构造函数和放缩得出 $x_1 x_2 > 1$;

$$\text{证明: } f'(x) = 2x + 1 - 2a - \frac{a}{x} = \frac{2x^2 + (1-2a)x - a}{x} =$$

$$\frac{(2x+1)(x-a)}{x} = 0 \text{ 时, } x = -\frac{1}{2} \text{ (舍) 或 } x = a,$$

①当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故不存在两个零点; ②当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $-a \ln x \rightarrow +\infty$, 此时 $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x < x - 1$, $f(x) > x^2 + (1-3a)x + a$ 此时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 故 $f(x)_{\min} = f(a) < 0 \Rightarrow a - a^2 - a \ln a < 0 \Rightarrow 1 - a < \ln a \Rightarrow a > 1$, 存在两个零点; 根据题意可知 $x_1 > 1 > x_2 >$

$$0, \begin{cases} x_1^2 + (1-2a)x_1 - a \ln x_1 = 0 \text{ ①} \\ x_2^2 + (1-2a)x_2 - a \ln x_2 = 0 \text{ ②} \end{cases}$$

① - ② 得: $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) + (1-2a)(x_1 - x_2) - a(\ln x_1 - \ln x_2) = 0$, 同时除以 $(x_1 - x_2)$ 可得:

$$\text{解法一: (整体代换)} 0 = (x_1 + x_2) + (1-2a) -$$

$$a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < (x_1 + x_2) + (1-2a) - a \cdot \frac{2}{x_1 + x_2},$$

$$\text{所以 } (x_1 + x_2)^2 + (1-2a)(x_1 + x_2) > 2a,$$

① + ② 得:

$$\ln x_1 x_2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + (1-2a)(x_1 + x_2)}{a},$$

$$\text{所以 } \ln x_1 x_2 + \frac{2x_1 x_2}{a} = \frac{(x_1 + x_2)^2 + (1-2a)(x_1 + x_2)}{a}$$

$$> \frac{2a}{a} = 2; \text{ 因为 } a > 1, \text{ 所以 } \ln x_1 x_2 + 2x_1 x_2 >$$

$$\ln x_1 x_2 + \frac{2x_1 x_2}{a} > 2, \text{ 构造 } h(x) = \ln x + 2x - 2, \text{ 易}$$

知 $h(x) > h(1) > 0$, 所以 $x_1 x_2 > 1$.

$$\text{解法二: } 0 = (x_1 + x_2) + (1-2a) -$$

$$a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < (x_1 + x_2) + (1-2a) - a \cdot \frac{2}{x_1 + x_2}$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 > 2a; \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ 得: } \ln x_1 x_2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + (1 - 2a)(x_1 + x_2)}{a},$$

$$\text{所以 } \ln x_1 x_2 + \frac{2x_1 x_2}{a} = \frac{(x_1 + x_2)^2 + (1 - 2a)(x_1 + x_2)}{a},$$

由于 $x_1 + x_2 > 2a$, 故构造 $g(x) = x^2 + (1 - 2a)x$,

当 $x > -\frac{1 - 2a}{2} = a - \frac{1}{2}$ 时, $g(x)$ 单调递增,

故 $g(x_1 + x_2) > g(2a) = 2a$, 所以 $\ln x_1 x_2 + \frac{2x_1 x_2}{a}$

> 2 , 因为 $a > 1$, 所以 $\ln x_1 x_2 + 2x_1 x_2 > \ln x_1 x_2 +$

$\frac{2x_1 x_2}{a} > 2$, 构造 $h(x) = \ln x + 2x - 2$, 易知 $h(x)$

$> h(1) > 0$, 所以 $x_1 x_2 > 1$.

专题9 数形结合破解公切线问题

◀◀◀ 达标训练

1. D 【解析】由已知, $f(1) = b = 2$, $g(1) = 1 + c = 2$, 所以 $c = 1$. 由 $f'(x) = \frac{a}{x}$ 得 $f'(1) = a$, 由 $g'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2} + 1$, 得 $g'(1) = 1$, 所以 $a = 1$, 所以 $a + b + c = 1 + 2 + 1 = 4$, 故选 D.

2. D 【解析】由题意得, $f(x) = \ln x$ 的导数为 $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx + \frac{7}{2}$ ($m < 0$) 的导数为 $g'(x) = x + m$, 所以与 $f(x)$ 图像的切点为 $(1, f(1))$ 的切线 l 的斜率 $k = f'(1) = 1$, 且 $f(1) = \ln 1 = 0$, 所以切点为 $(1, 0)$, 所以直线 l 的方程为: $y = x - 1$, 因为直线 l 与 $g(x)$ 的图像也相切, 所以 $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = \frac{1}{2}x^2 + mx + \frac{7}{2} \end{cases}$, 此方程组只有一解, 即 $\frac{1}{2}x^2 + (m - 1)x + \frac{9}{2} = 0$ 只有一解, 所以 $\Delta = (m - 1)^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} = 0$, 解得 $m = -2$ 或 $m = 4$ (舍去), 故选 D.

3. C 【解析】 $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g'(x) = 2ax$ 因为函数

$f(x) = \ln x$ 与函数 $g(x) = ax^2 - a$ 的图像在点 $(1, 0)$ 的切线相同, 所以 $1 = 2a$, 所以 $a = \frac{1}{2}$, 故选 C.

4. D 【解析】设切线方程是: $y = kx + b$, 切线与 $y = \ln x + 2$ 和 $y = \ln(x + 1)$ 的切点分别为 $(x_1, kx_1 + b)$ 、 $(x_2, kx_2 + b)$; 由导数的几何意义可得 $k = \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2 + 1}$, 得 $x_1 = x_2 + 1$, 再由切点也在各

自的曲线上, 得 $\begin{cases} kx_1 + b = \ln x_1 + 2 \\ kx_2 + b = \ln(x_2 + 1) \end{cases}$, 联立上述

式子解得 $k = 2$, 故选 D.

5. C 【解析】设直线 $l: y = kx$. 因为 $y' = 3x^2 - 6x + 2$, 所以 $y'|_{x=0} = 2$, 又因为直线与曲线均过原点, 于是直线 $y = kx$ 与曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 相切于原点时, $k = 2$. 直线 l 的方程为 $2x - y = 0$, 若直线与曲线 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 切于点 (x_0, y_0) ($x_0 \neq 0$), 则 $k = \frac{y_0}{x_0}$, 因为 $y_0 = x_0^3 - 3x_0^2 + 2x_0$, 所以 $\frac{y_0}{x_0} = x_0^2 - 3x_0 + 2$, 又因为 $k = y'|_{x=x_0} = 2x_0 = 3x_0^2 - 6x_0 + 2$, 所以 $x_0^2 - 3x_0 + 2 = 3x_0^2 - 6x_0 + 2$, 所以 $2x_0^2 - 3x_0 = 0$, 因为 $x_0 \neq 0$, 所以 $x_0 = \frac{3}{2}$, 所以 $k = x_0^2 - 3x_0 + 2 = -\frac{1}{4}$, 直线 l 的方程为 $x + 4y = 0$. 直线 l 的方程为 $2x - y = 0$ 与 $y = x^2 + a$ 联立, 可得 $x^2 - 2x + a = 0$, 其中 $\Delta = 0$, 即 $(-2)^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 1$; 直线 l 的方程为 $x + 4y = 0$ 与 $y = x^2 + a$ 联立, 可得 $x^2 + \frac{1}{4}x + a = 0$, 其中 $\Delta = 0$, 即 $(\frac{1}{4})^2 - 4a = 0$, 解得 $a = \frac{1}{64}$, 故选 C.

6. A 【解析】 $f'(x) = 6x - 4a$, $g'(x) = \frac{2a^2}{x}$,

由题意 $\begin{cases} f'(x_0) = g'(x_0) \\ f(x_0) = g(x_0) \end{cases}$,

$$\text{可得} \begin{cases} 6x_0 - 4a = \frac{2a^2}{x_0} \text{①} \\ 3x_0^2 - 4ax_0 = 2a^2 \ln x_0 + b \text{②} \end{cases}$$

由①得 $3x_0^2 - 2ax_0 - a^2 = 0$, 解得 $x_0 = a$ 或 $x_0 = -$

$\frac{1}{3}a$ (舍去), 代入②得, $-b = 2a^2 \ln a + a^2$, 构造

$h(x) = 2x^2 \ln x + x^2 (x > 0)$, $h'(x) = 4x(\ln x +$

$1)$, 则 $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上单调递减, 在

$(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增, 即 $-b = h(x)$ 的最小

值为 $h(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e^2}$, 所以 b 的最大值为 $\frac{1}{e^2}$, 故

选 A.

7. D 【解析】将此题转化为 $y = e^a \cdot e^x$ 与 $y = x^2$ 的交点问题, 由于两个函数都是凹函数, 且位于递增区间, 故类比两相交圆外公切线原理, 则当它们有共点公切线时, 仅存在一条公切线, 此时 $e^a \cdot e^{x_0} = 2x_0 = x_0^2 \Rightarrow x_0 = 2, a = 2\ln 2 - 2$, 当 $a < 2\ln 2 - 2$ 时, 指数函数 $y = \frac{4}{e^2} \cdot e^x$ 函数向右平移, 在二次函数递增区间一定有两个交点, 所以答案为 D.

8. C 【解析】解法一: 因为 $f(x) = \ln x$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 所以 $x = x_0, f'(x_0) = \frac{1}{x_0}$, 所以切线 l 的方程为 $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$, 即 $y = \frac{1}{x_0}x + \ln x_0 - 1$ ①, 设直线 l 与曲线 $y = g(x)$ 相切于点 (x_1, e^{x_1}) , 因为 $g'(x) = e^x$, 所以 $e^{x_1} = \frac{1}{x_0}$, 所以 $x_1 = -\ln x_0$. 所以直线 l 也为 $y - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{x_0}(x + \ln x_0)$, 即 $y = \frac{1}{x_0}x + \frac{\ln x_0}{x_0} + \frac{1}{x_0}$ ②, 由①②得 $\ln x_0 = \frac{x_0 + 1}{x_0 - 1}$, 作出 $y = \ln x$ 和 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 的图像, 如图所示, 图像有两个交点, 方程有两解, 故选 C.

解法二: 如图所示, 作出 $y = e^x$ 和 $y = \ln x$ 图像, 可知属于一凹一凸型的, 且均位于单调增区间, 故两曲线没有交点时类比两圆的相离时内公切线模型, 一定有两条公切线, 故选 C.

9. D

10. B 【解析】设 l 是曲线 C_1 和曲线 C_2 的公共切线, 切点分别是 $(t, t^2), (m, \ln m)$, 则 $2t = \frac{1}{m} = \frac{\ln m - t^2}{m - t}$, $\ln(2t) - t^2 + 1 = 0 (0 < t < \frac{\sqrt{2}}{2})$, 令 $f(x) = \ln 2x - x^2 + 1, f'(x) = \frac{1 - 2x^2}{x}$, 所以当 $x \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $f'(x) > 0, f(x)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 增函数, 当 $x \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$, $f'(x) < 0, f(x)$ 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 减函数, $f(\frac{1}{2e}) = -1 - \frac{1}{4e^2} + 1 < 0, f(\frac{1}{2}) > 0, f(x) = \ln 2x - x^2 + 1$, 在 $(\frac{1}{2e}, \frac{1}{2})$ 存在唯一零点, 故选 B.

11. B 【解析】设直线 l 与曲线 $y = e^x$ 切点为 $(m, n), y = e^x$ 的导数为 $y' = e^x, y = e^{2x} - 2$ 的导数为 $y' = 2e^{2x}$, 曲线 $y = e^x$ 在 (m, n) 的切线的方

程为 $y - e^m = e^m(x - m)$, 可得 $y = e^m(x - m + 1)$, 曲线 $y = e^{2x} - 2$ 在点 (a, b) 处的切线方程为 $y - (e^{2a} - 2) = 2e^{2a}(x - a)$, 即 $y = 2e^{2a}x + e^{2a}(1 - 2a) - 2$, 可得 $e^m = 2e^{2a}$, $e^m(-m + 1) = e^{2a}(1 - 2a) - 2$, 则 $m = 2a + \ln 2$, 即有 $2e^{2a}[1 - 2a - \ln 2] = e^{2a}(1 - 2a) - 2$, 即 $e^{2a}(2a + 2\ln 2 - 1) - 2 = 0$, 即有 $f(x) = e^{2x}(2x + 2\ln 2 - 1) - 2$, 故选 B.

12. D 【解析】由 $f(x) = -e^x - x$, 得 $f'(x) = -e^x - 1$, 因为 $e^x + 1 > 1$, 所以 $\frac{1}{1+e^x} \in (0, 1)$, 由 $g(x) = (x - 1)a + 2\cos x$, 得 $g'(x) = a - 2\sin x$, 又 $-2\sin x \in [-2, 2]$, 所以 $a - 2\sin x \in [-2 + a, 2 + a]$, 要使过曲线 $f(x) = -e^x - x + 3a$ 上任意一点的切线为 l_1 , 总存在过曲线 $g(x) = a(x - 1) + 2\cos x$ 上一点处的切线 l_2 , 使得 $l_1 \perp l_2$, 则 $\begin{cases} a - 2 \leq 0 \\ a + 2 \geq 1 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 2$. 即 a 的取值范围为 $[-1, 2]$, 故选 D.

13. A 【解析】常规解法: $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g'(x) = 2x + 2$, 设与 $g(x) = x^2 + 2x + a$ 相切的切点为 (s, t) , $s < 0$, 与曲线 $f(x) = \ln x$ 相切的切点为 (m, n) , $m > 0$, 则有公共切线斜率为 $2s + 2 = \frac{1}{m} = \frac{n-t}{m-s}$, 又 $t = s^2 + 2s + a$, $n = \ln m$, 即有 $a = s^2 - 1 + \ln(2s + 2)$, 设 $f(s) = s^2 - 1 - \ln(2s + 2)$ ($-1 < s < 0$), 所以 $f'(s) = \frac{2s^2 + 2s - 1}{s + 1} < 0$, 所以 $f(s) > f(0) = -\ln 2 - 1$, 所以 $a > -\ln 2 - 1$, 因为 $s \in (-1, 0)$, 且趋近与 1 时, $f(s)$ 无限增大, 所以 $a > -\ln 2 - 1$, 故选 A.

图 1

图 2

秒杀解法: 由于 $f(x)$, $g(x)$ 为一凹一凸, 类比如于两圆的内公切线, 根据图 1, 图 2 可得, 切线切 $g(x)$ 于区间 $(-1, 0)$, 而 $g'(x) = 2x + 2$ 在区间 $(-1, 0) \uparrow$, 则切线斜率越来越大, 故当 $x = 0$ 时, $k = g'(0) = 2 = f'(x_0) = \frac{1}{x_0} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{2}$, 此时的公切线方程为 $y + \ln 2 = 2(x - \frac{1}{2}) \Rightarrow x = 0$ 时 $y = -1 - \ln 2$, 所以 $a > -\ln 2 - 1$, 故选 A.

14. A 【解析】常规解法: 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^2 + x + a$ 的导数为 $f'(x) = 2x + 1$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 的导数为 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, 设 $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$ 为该函数图像上的两点, 且 $x_1 < x_2$, 当 $x_1 < x_2 < 0$, 或 $0 < x_1 < x_2$ 时, $f'(x_1) \neq f'(x_2)$, 故 $x_1 < 0 < x_2$, 当 $x_1 < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 $A(x_1, f(x_1))$ 处的切线方程为: $y - (x_1^2 + x_1 + a) = (2x_1 + 1)(x - x_1)$; 当 $x_2 > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 $B(x_2, f(x_2))$ 处的切线方程为: $y - \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{x_2^2}(x - x_2)$. 两直线重合的充要

条件是 $-\frac{1}{x_2} = 2x_1 + 1$ ①, $\frac{2}{x_2} = -x_1^2 + a$ ②, 两直线重合的充要条件是 $-\frac{1}{x_2} = 2x_1 + 1$ ①, $\frac{2}{x_2} = a - x_1^2$ ②, 由①②令 $t = \frac{1}{x_2}$, 则 $t > 0$, 且 $a = \frac{1}{4}(t^4 + 2t^2 + 8t + 1)$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数, 所以 $a > \frac{1}{4}$, 故选 A.

秒杀解法: 如图 1 所示, 无公切线, 由于 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 上单调递增, 根据公切线导数值相等的原理, 公切线只会出现在单调性一致的区间, 故只能出现在区间 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 和 $(0, +\infty)$, 由于函数在这两个区间属于凹函数, 故可类比两圆相离的外公切线, 在 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 时取得最小值时, 也能作得切线与 $y = \frac{1}{x}$ 部分相切, 由于 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow 0$ 则 $f(-\frac{1}{2}) > 0$, 如图 2, 则 $a > \frac{1}{4}$, 故选 A.

图 1

图 2

15. B 【解析】求出两曲线在公共点的切线, 两凹函数类比两圆外公切线定理, 设它们相切时公

共切点的横坐标为 x_0 , 则 $e^{x_0+a} = 2(x_0 - 1) = (x_0 - 1)^2 \Rightarrow x_0 = 3, a = 2\ln 2 - 3$, 故根据图像, $y = 4e^{x-3}$ 往右平移时, 一定会和函数 $y = (x-1)^2$ 在区间 $(1, +\infty)$ 有两个交点, 故选 B.

16. 【解析】设公共点的坐标为 $(m, \frac{1}{2}\ln m)$, 则函

数 $y = f(x) = a\sqrt{x} (a > 0)$ 的导数 $f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{x}}$,

曲线 $y = g(x) = \frac{1}{2}\ln x$ 的导数 $g'(x) = \frac{1}{2x}$, 则

$f'(m) = \frac{a}{2\sqrt{m}}, g'(m) = \frac{1}{2m}$, 则由 $f'(m) =$

$g'(m)$, 得 $\frac{a}{2\sqrt{m}} = \frac{1}{2m} (m > 0)$, 则 $a = \frac{1}{\sqrt{m}}$, 又

$a\sqrt{m} = \ln \sqrt{m}$, 即 $\ln \sqrt{m} = a\sqrt{m} = a\sqrt{m} \times \frac{1}{\sqrt{m}} =$

1 , 得 $\sqrt{m} = e$, 则 $a = \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{1}{e}$, 故答案为 $\frac{1}{e}$.

17. 【解析】根据题意, 函数 $f(x) = \ln x + \frac{mx}{x+1}$ 与

$g(x) = x^2 + 1$ 有公切线 $y = ax (a > 0)$, 设切点

分别为 $F(x_1, y_1), G(x_2, y_2), f'(x) =$

$\frac{1}{x} + \frac{m}{(x+1)^2}, g'(x) = 2x$; 所以 $a = 2x_2 > 0$ 且

$\frac{x_2^2 + 1}{x_2} = 2x_2 \Rightarrow x_2 = 1, a = 2$, 所以公切线为 $y =$

$$2x, \text{ 则有 } \begin{cases} \ln x_1 + \frac{mx_1}{x_1+1} = 2x_1 \\ \frac{1}{x_1} + \frac{m}{(x_1+1)^2} = 2 \end{cases} \Rightarrow \ln x_1 + 2x_1^2 - x_1 - 1 = 0$$

$-1 = 0$, 设 $h(x) = \ln x + 2x^2 - x - 1 (x > 0) \Rightarrow$

$h'(x) = \frac{1}{x} + 4x - 1 > 0 \Rightarrow h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 增,

又 $h(1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, m = 4$, 故答案为 4.

获取更多资料加qq群698274639

获取更多资料加qq群698274639